Pathology
علم الأمراض

LECTURE 7 · المحاضرة 7

أورام التجويف الفموي — بنك الأسئلة
Oral Cavity Tumors — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC 7

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Benign salivary tumors — أورام الغدد اللعابية الحميدة

Q1 EN The most common benign tumor of the salivary glands is:

AR س1. أشيع ورم حميد في الغدد اللعابية:

- A Mucoepidermoid carcinoma — المخاطية البشروية
- B Warthin tumor — ورم وارثين
- C Pleomorphic adenoma — الورم الغدّي متعدّد الأشكال
- D Oncocytoma — الخلوي الحمضي

Q2 EN Pleomorphic adenoma is also called:

AR س2. يسمّى الورم الغدّي متعدّد الأشكال أيضًا:

- A Adenolymphoma — الورم الغدّي اللمفاوي
- B Cystadenoma — الورم الغدّي الكيسي
- C Hamartoma — الورم العابي
- D Mixed tumor — الورم المختلط

Q3 EN In pleomorphic adenoma, “pleomorphic” refers to:

AR س3. في الورم الغدّي متعدّد الأشكال، “متعدّد الأشكال” يشير إلى:

- A Nuclear atypia — لانموذجية الأنوية
- B Variable cell types — تنوّع أنواع الخلايا
- C Many mitoses — انقسامات كثيرة
- D Malignancy — الخباثة

Q4 EN Pleomorphic adenoma is most frequent in:

AR س4. الورم الغدّي متعدّد الأشكال أكثر شيوعًا في:

- A Females, 3rd–5th decade — الإناث، العقد 3–5
- B Elderly males — الذكور المسنّين
- C Smokers — المدخّنين
- D Children — الأطفال

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Pleomorphic adenoma constitutes about what percentage of parotid tumors?** Q5

AR س5. يشكّل الورم الغدّي متعدّد الأشكال حوالي كم نسبة من أورام النكفية؟

A 15%
B 60%
C 80%
D 5%

EN **A known risk factor for pleomorphic adenoma is:** Q6

AR س6. عامل خطورة معروف للورم الغدّي متعدّد الأشكال:

A Smoking التدخين
B Alcohol الكحول
C Radiation exposure التعرّض للإشعاع
D HPV فيروس الورم الحليمي

EN **Warthin tumor is the:** Q7

AR س7. ورم وارثين هو:

A Second most common salivary gland neoplasm ثاني أشيع ورم في الغدد اللعابية
B Most common benign tumor أشيع ورم حميد
C Most common malignant salivary tumor أشيع ورم لعابي خبيث
D Rarest salivary tumor أندر ورم لعابي

EN **Warthin tumor almost exclusively arises in the:** Q8

AR س8. ينشأ ورم وارثين حصرًا تقريبًا في:

A Sublingual gland الغدة تحت اللسان
B Submandibular gland الغدة تحت الفكية
C Minor salivary glands الغدد الصغيرة
D Parotid gland الغدة النكفية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The only salivary gland tumor more common in males is:** Q9

AR س9. الورم اللعابي الوحيد الأشيع في الذكور:

A	Adenoid cystic carcinoma الغدّانية الكيسية	B	Pleomorphic adenoma متعدّد الأشكال
C	Mucoepidermoid carcinoma المخاطية البشروية	D	Warthin tumor ورم وارثين

EN **Smokers have what risk of Warthin tumor compared to nonsmokers?** Q10

AR س10. ما خطر ورم وارثين عند المدخّنين مقارنةً بغيرهم؟

A	Twice الضعف	B	Sixty times ستون ضعفًا
C	Eight times ثمانية أضعاف	D	Same نفسه

Malignant oral tumors الأورام الفموية الخبيثة

EN **The majority of oral cancers are:** Q11

AR س11. أغلب سرطانات الفم:

A	Squamous cell carcinomas كارسينومات حرشفية	B	Lymphomas لمفومات
C	Adenocarcinomas كارسينومات غدّية	D	Sarcomas ساركومات

EN **Oral SCC is usually seen in:** Q12

AR س12. تُرى SCC الفموية عادةً في:

A	Children الأطفال	B	Middle-aged men رجال منتصف العمر
C	Infants الرضّع	D	Young women الشابات

EN **Inactivation of which gene occurs in about 80% of oral SCC?** Q13

AR س13. تعطيل أيّ جين يحدث في حوالي 80% من SCC الفموية؟

A	RB only RB فقط	B	KRAS
C	BRCA1	D	p16

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **p53 mutation in oral SCC is associated with progression of:** Q14

AR س14. ترتبط طفرة p53 في SCC الفموية بتطوّر:

A Dysplasia to normal — خلل التنسّج للطبيعي

B Cancer to benign — السرطان للحميد

C Hyperplasia/hyperkeratosis to dysplasia — فرط التنسّج/التقرّن إلى خلل التنسّج

D Metastasis only — النقيلة فقط

EN **Amplification of cyclin D1 in oral SCC:** Q15

AR س15. تضخيم cyclin D1 في SCC الفموية:

A Constitutively activates cell cycle progression — ينشّط تقدّم دورة الخلية دائمًا

B Inactivates p16 — يعطّل p16

C Stops the cell cycle — يوقف دورة الخلية

D Causes apoptosis — يسبّب الموت المبرمج

EN **The more anterior the oral tumor, the more it spreads to the:** Q16

AR س16. كلما كان الورم الفموي أماميًا أكثر زاد انتشاره إلى:

A Liver — الكبد

B Cervical nodes — العقد العنقية

C Bones — العظام

D Retropharyngeal nodes — العقد خلف البلعوم

EN **Carcinomas of the base of the tongue metastasize to the:** Q17

AR س17. تنتقل كارسينومات قاعدة اللسان إلى:

A Axillary nodes — العقد الإبطية

B Deep retropharyngeal lymph nodes — العقد خلف البلعوم العميقة

C Inguinal nodes — العقد الأربية

D Brain only — الدماغ فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Blood spread of oral SCC is to:** Q18

AR س18. الانتشار الدموي لـ SCC الفموية إلى:

A Kidney and spleen الكلية والطحال
B Skin only الجلد فقط
C Lungs, liver, and bones الرئتين والكبد والعظام
D Heart القلب

EN **The most common primary malignant tumor of the salivary glands is:** Q19

AR س19. أشيع ورم خبيث أولي في الغدد اللعابية:

A Warthin tumor ورم وارثين
B Pleomorphic adenoma متعدّد الأشكال
C SCC
D Mucoepidermoid carcinoma الكارسينوما المخاطية البشروية

EN **Mucoepidermoid carcinoma constitutes about what percentage of salivary gland tumors?** Q20

AR س20. تشكّل المخاطية البشروية حوالي كم نسبة من أورام الغدد اللعابية؟

A 15%
B 80%
C 5%
D 60%

Reflux esophagitis التهاب المريء الارتجاعي

EN **The esophageal squamous epithelium is sensitive to:** Q21

AR س21. الظهارة الحرشفية للمريء حسّاسة لـ:

A Acid الحامض
B Food abrasion احتكاك الطعام
C Bicarbonate البيكاربونات
D Mucin المخاط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The most frequent cause of esophagitis is:** Q22

AR س22. أشيع سبب لالتهاب المريء:

A Candida المبيضّات

B Reflux of gastric contents (GERD) ارتجاع محتويات المعدة (GERD)

C Herpes virus فيروس الهربس

D Radiation الإشعاع

EN **With more significant GERD, the first cells recruited into the mucosa are:** Q23

AR س23. مع GERD الأشد، أول خلايا تُستدعى للمخاطية:

A Lymphocytes اللمفاويات

B Neutrophils العدلات

C Eosinophils الحمضات

D Plasma cells خلايا البلازما

EN **Basal zone hyperplasia in GERD exceeds what proportion of epithelial thickness?** Q24

AR س24. يتجاوز فرط تنسّج المنطقة القاعدية في GERD أيّ نسبة من سمك الظهارة؟

A 5%

B 50%

C 80%

D 20%

EN **GERD is most common in adults older than:** Q25

AR س25. GERD أشيع في البالغين فوق:

A 10 years 10 سنوات

B 20 years 20 سنة

C 70 years 70 سنة

D 40 years 40 سنة

EN **Symptomatic relief of GERD is typically provided by:** Q26

AR س26. يخفّف أعراض GERD عادةً:

A Proton pump inhibitors مثبّطات مضخّة البروتون

B Antibiotics المضادات الحيوية

C Steroids الستيرويدات

D Surgery always الجراحة دائمًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a complication of reflux esophagitis?** Q27


AR س27. أيّ مما يأتي من مضاعفات التهاب المريء الارتجاعي؟

A Warthin tumor ورم وارثين
B Pleomorphic adenoma متعدّد الأشكال
C Barrett esophagus مريء باريت
D Wilms tumor ورم ويلمز

Picture questions أسئلة الصور

EN **This parotid swelling with MRI (A, B) is most likely:** Q28

AR س28. تورّم النكفية هذا مع الرنين (A، B) على الأرجح:



A Reflux esophagitis التهاب المريء الارتجاعي
B Pleomorphic adenoma الورم الغدّي متعدّد الأشكال
C Wilms tumor ورم ويلمز
D Oral SCC of the tongue SCC اللسان

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This intraoral swelling of the right maxilla with this histology is:** Q29

AR س29. هذا التورّم داخل الفم في الفك العلوي الأيمن مع هذا النسيج:



Figure 1: Intraoral examination showed swelling on right maxilla extending

A Hamartoma الورم العابي

B Warthin tumor ورم وارثين

C Mucoepidermoid carcinoma الكارسينوما المخاطية البشروية

D Barrett esophagus مريء باريت

2 True / False صح أو خطأ

EN Pleomorphic adenoma contains epithelial and stromal elements. 1

AR يحتوي الورم الغدّي متعدّد الأشكال عناصر ظهارية وسدوية. True · صح False · خطأ

EN Pleomorphic adenoma usually arises in the deep lobe of the parotid. 2

AR ينشأ الورم الغدّي متعدّد الأشكال عادةً في الفص العميق للنكفية. True · صح False · خطأ

EN Pleomorphic adenoma is very rare in the sublingual gland. 3

AR الورم الغدّي متعدّد الأشكال نادر جدًا في الغدة تحت اللسان. True · صح False · خطأ

EN Warthin tumor is malignant. 4

AR ورم وارثين خبيث. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN Warthin tumor usually occurs between the 5th and 7th decades.
AR يحدث ورم وارثين عادةً بين العقد الخامس والسابع.
True · صح False · خطأ

6
EN Oral SCC is a multifactorial disease.
AR SCC الفموية مرض متعدّد العوامل.
True · صح False · خطأ

7
EN The development of SCC is a single-step process.
AR نشوء SCC عملية من خطوة واحدة.
True · صح False · خطأ

8
EN Mucoepidermoid carcinoma accounts for a major fraction of minor salivary gland tumors.
AR تشكّل المخاطية البشروية جزءًا كبيرًا من أورام الغدد اللعابية الصغيرة.
True · صح False · خطأ

9
EN Mucoepidermoid carcinoma occurs mainly in the submandibular gland.
AR تحدث المخاطية البشروية أساسًا في الغدة تحت الفكية.
True · صح False · خطأ

10
EN Submucosal esophageal glands secrete mucin and bicarbonate.
AR تفرز الغدد المريئية تحت المخاطية المخاط والبيكاربونات.
True · صح False · خطأ

11
EN In mild GERD the mucosal histology is often unremarkable.
AR في GERD الخفيف يكون النسيج المخاطي غالبًا غير لافت.
True · صح False · خطأ

12
EN GERD never occurs in infants.
AR لا يحدث GERD أبدًا في الرضّع.
True · صح False · خطأ

13
EN Severity of GERD symptoms is closely related to the degree of histologic damage.
AR ترتبط شدّة أعراض GERD بشدّة بدرجة الضرر النسيجي.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Chronic GERD chest pain may be mistaken for heart disease. 14

AR قد يُخلط ألم الصدر في GERD المزمن بمرض القلب. False · خطأ True · صح

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Most common benign vs most common malignant salivary tumor? 1

AR أشيع حميد مقابل أشيع خبيث لعابي؟

EN Female or male? 2

AR أنثى أم ذكر؟

EN Radiation or smoking? 3

AR الإشعاع أم التدخين؟

EN “Pleomorphic” — nuclear atypia? 4

AR “متعدّد الأشكال” — لانموذجية الأنوية؟

EN p16, p53, cyclin D1 — which does what? 5

AR p16 وp53 وcyclin D1 — أيّها يفعل ماذا؟

EN Eosinophils or neutrophils first in GERD? 6

AR الحمضات أم العدلات أولًا في GERD؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Write about pleomorphic adenoma.

AR اكتب عن الورم الغدّي متعدّد الأشكال.

2 EN Write about Warthin tumor.

AR اكتب عن ورم وارثين.

3 EN Explain the pathogenesis of oral squamous cell carcinoma.

AR اشرح إمراضية كارسينوما الخلايا الحرشفية الفموية.

4 EN Describe the methods of spread of oral SCC.

AR صف طرق انتشار SCC الفموية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Write about mucoepidermoid carcinoma. 5

AR اكتب عن الكارسينوما المخاطية البشروية.

EN Describe reflux esophagitis: morphology and clinical features. 6

AR صف التهاب المريء الارتجاعي: الشكل النسيجي والمظاهر السريرية.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 D	3 B	4 A	5 B	6 C	7 A	8 D
9 D	10 C	11 A	12 B	13 D	14 C	15 A	16 B
17 B	18 C	19 D	20 A	21 A	22 B	23 C	24 D
25 D	26 A	27 C	28 B	29 C			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 True	12 False
13 False	14 True				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1

EN **Most common benign vs most common malignant salivary tumor?**

Benign: pleomorphic adenoma (Warthin is 2nd); malignant: mucoepidermoid carcinoma.

AR **أشيع حميد مقابل أشيع خبيث لعابي؟**

الحميد: الورم الغدّي متعدّد الأشكال (ووارثين الثاني)؛ الخبيث: الكارسينوما المخاطية البشروية.

2

EN **Female or male?**

Pleomorphic adenoma → females; Warthin tumor → the only salivary tumor commoner in males; oral SCC → middle-aged men.

AR **أنثى أم ذكر؟**

متعدّد الأشكال ← الإناث؛ وارثين ← الوحيد الأشيع في الذكور؛ SCC الفموية ← رجال منتصف العمر.

3

EN **Radiation or smoking?**

Radiation ↑ risk of pleomorphic adenoma; smoking ×8 risk of Warthin tumor.

AR **الإشعاع أم التدخين؟**

الإشعاع ↑ خطر متعدّد الأشكال؛ والتدخين 8× خطر وارثين.

4

EN **"Pleomorphic" — nuclear atypia?**

No — in pleomorphic adenoma it means variable cell types (the general pathology meaning is nuclear variation).

AR **"متعدّد الأشكال" — لانموذجية الأنوية؟**

لا — في هذا الورم يعني تنوّع أنواع الخلايا (والمعنى العام بعلم الأمراض تباين الأنوية).

5

EN **p16, p53, cyclin D1 — which does what?**

p16 inactivation in ~80%; p53 mutation → hyperplasia/hyperkeratosis to dysplasia; cyclin D1 amplification → constant cell-cycle activation.

AR **p16 وp53 وcyclin D1 — أيّها يفعل ماذا؟**

تعطيل p16 في ~80%؛ طفرة p53 ← فرط تنسّج/تقرّن إلى خلل تنسّج؛ تضخيم cyclin D1 ← تنشيط دائم لدورة الخلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Eosinophils or neutrophils first in GERD?** 6

Eosinophils first; neutrophils follow and indicate more severe injury.

AR **الحمضات أم العدلات أولًا في GERD؟**

الحمضات أولًا؛ ثم العدلات وتدل على أذى أشد.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Write about pleomorphic adenoma.** 1

The most common benign salivary gland tumor, an admixture of epithelial and stromal elements (mixed tumor); named for its variable cell types. Age 3rd–5th decade; more frequent in females. Site: parotid (~60% of parotid tumors, superficial lobe), less in submandibular, very rare in sublingual; minor glands relatively rare. Etiology unknown; radiation increases risk.

AR **اكتب عن الورم الغدّي متعدّد الأشكال.**

أشيع ورم حميد في الغدد اللعابية، خليط من عناصر ظهارية وسدوية (ورم مختلط)؛ سُمّي لتنوّع خلاياه. العمر العقد 3–5؛ أشيع في الإناث. الموقع: النكفية (~60% من أورامها، الفص السطحي)، أقل في تحت الفكية، نادر جدًا في تحت اللسان؛ والغدد الصغيرة نادرة نسبيًا. السبب غير معروف؛ والإشعاع يزيد الخطر.

EN **Write about Warthin tumor.** 2

Papillary cystadenoma lymphomatosum (adenolymphoma); benign, second most common salivary neoplasm; almost exclusively in the parotid; the only salivary tumor commoner in males; 5th–7th decade; smokers have eight times the risk.

AR **اكتب عن ورم وارثين.**

الورم الغدّي الكيسي الحليمي اللمفاوي (الورم الغدّي اللمفاوي)؛ حميد، ثاني أشيع ورم لعابي؛ حصرًا تقريبًا في النكفية؛ الوحيد الأشيع في الذكور؛ العقد 5–7؛ وللمدخّنين ثمانية أضعاف الخطر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain the pathogenesis of oral squamous cell carcinoma.** 3

A multistep process of sequential activation of oncogenes and inactivation of tumor suppressor genes in a clonal population: p16 inactivation (~80%); p53 mutation with progression of hyperplasia/hyperkeratosis to dysplasia; amplification and overexpression of cyclin D1 constitutively activating the cell cycle.

AR **اشرح إمراضية كارسينوما الخلايا الحرشفية الفموية.**

عملية متعدّدة الخطوات من تنشيط متسلسل للجينات الورمية وتعطيل للكابتة في مجموعة نسيلية: تعطيل p16 (~80%)؛ طفرة p53 مع تطوّر فرط التنسّج/التقرّن إلى خلل التنسّج؛ تضخيم cyclin D1 وفرط التعبير عنه ينشّط دورة الخلية دائمًا.

EN **Describe the methods of spread of oral SCC.** 4

Local: depends on the primary site. Lymph node: depends on tumor location — the more anterior, the more cervical node spread; base of tongue and oropharynx → deep retropharyngeal nodes. Blood: lungs, liver and bones.

AR **صف طرق انتشار SCC الفموية.**

الموضعي: يعتمد على الموقع الأولي. العقد: تعتمد على موقع الورم — كلما كان أماميًا زاد انتشاره للعقد العنقية؛ قاعدة اللسان والبلعوم الفموي ← العقد خلف البلعوم العميقة. الدموي: الرئتان والكبد والعظام.

EN **Write about mucoepidermoid carcinoma.** 5

The most common primary malignant tumor of the salivary glands; about 15% of all salivary gland tumors; mainly (60–70%) in the parotids; a major fraction of minor salivary gland tumors.

AR **اكتب عن الكارسينوما المخاطية البشروية.**

أشيع ورم خبيث أولي في الغدد اللعابية؛ حوالي 15% من كل أورامها؛ أساسًا (60–70%) في النكفيتين؛ وجزء كبير من أورام الغدد اللعابية الصغيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe reflux esophagitis: morphology and clinical features.** 6

Gastric reflux is the commonest cause of esophagitis (GERD). Morphology: hyperemia; often unremarkable in mild cases; eosinophils then neutrophils with more severe disease; basal zone hyperplasia > 20% of thickness and lamina propria papillae reaching the upper third. Clinical: adults > 40 (also infants, children); heartburn, dysphagia, sour regurgitation; rarely severe chest pain mimicking heart disease; PPIs relieve symptoms; damage increases with duration; complications: ulceration, hematemesis, melena, stricture, Barrett esophagus.

AR **صف التهاب المريء الارتجاعي: الشكل النسيجي والمظاهر السريرية.**

ارتجاع المعدة أشيع سبب لالتهاب المريء (GERD). النسيج: احتقان، غالبًا غير لافت في الخفيف؛ حمضات ثم عدلات مع المرض الأشد؛ فرط تنسّج قاعدي > 20% وحليمات الصفيحة المخصوصة تصل الثلث العلوي. السريري: بالغون > 40 (وأيضًا رضّع وأطفال)؛ حرقة، عسر بلع، ارتجاع حامض؛ نادرًا ألم صدري شديد يشبه القلب؛ مثبّطات مضخّة البروتون تخفّف الأعراض؛ الضرر يزيد مع المدّة؛ المضاعفات: تقرّح، قيء دم، melena، تضيّق، مريء باريت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t