Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 5 · المحاضرة 5

داء بهجت
Behcet's Disease

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 5

Behcet's Disease — داء بهجت

1 Behcet's Disease — داء بهجت

EN Behcet's disease is a **rare, chronic, lifelong disorder** that involves **inflammation of blood vessels** throughout the body.

AR داء بهجت **اضطراب نادر مزمن يدوم مدى الحياة** يتضمّن **التهاب الأوعية الدموية** في أنحاء الجسم.

It is a form of **vasculitis** that can lead to ulceration and other lesions, slightly affecting **more men than woman**.

وهو شكل من **التهاب الأوعية** قد يؤدي إلى تقرّحات وآفات أخرى، ويصيب **الرجال أكثر قليلًا من النساء**.

It is characterized by a triad of symptoms, including — **ويتميّز بـثالوث من الأعراض يشمل:**

aphthous ulceration of the oral mucous membranes تقرّح قلاعي للأغشية المخاطية الفموية → **and genitalia** والأعضاء التناسلية → **and uveitis** والتهاب العنبية

EN **Rare manifestations** include **oligoarthritis** of the lower extremities, **vasculitis of the pulmonary vessels**, **cerebrovascular symptoms**.

AR ومن **المظاهر النادرة**: **التهاب قلّة المفاصل** في الأطراف السفلية، **والتهاب الأوعية الرئوية**، **وأعراض وعائية دماغية**.

EN The etiology of the Behcet's disease is **unkown**.

AR سبب داء بهجت **مجهول**.

It is believed to be **partly genetic**, an association with **HLA-B51** has been found.

ويُعتقد أنه **وراثي جزئيًا**، وقد وُجد ارتباط بـHLA-B51.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t




Figure 1. Pathogencity of Behcet's disease

الشكل 1. إمراضية داء بهجت

Label (from the figure) التسمية في الشكل	Meaning المعنى
Genetic Susceptibility الاستعداد الوراثي	+ Epigenetic Changes + تغيّرات فوق جينية
Immune System الجهاز المناعي	Nonspecific Inflammation; Self-reactive autoinflammation التهاب غير نوعي؛ التهاب ذاتي متفاعل مع الذات
Inflammatory cytokines السيتوكينات الالتهابية	Secretion of inflammatory cytokines (IL8, TNF-α) إفراز السيتوكينات الالتهابية (IL8 وTNF-α)
T and B cells الخلايا التائية والبائية	Activation of cytotoxic T-Cells; Production of autoantibodies from B-Cells تنشيط الخلايا التائية السامّة؛ إنتاج أضداد ذاتية من الخلايا البائية
Result النتيجة	Vasculitis/tissue damage "Behcet's syndrome" التهاب الأوعية/تلف الأنسجة «متلازمة بهجت»
Sign and Symptoms العلامات والأعراض	inflamed eyes, mouth ulcers, genital ulcers, joint pain, skin problems التهاب العينين، تقرّحات الفم، تقرّحات تناسلية، ألم المفاصل، مشكلات جلدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Risk factors عوامل الخطورة

1

EN **Age.** Behcet's disease most commonly affects men and women in their **20s, 30s and 40s**, though children and older adults also can develop the condition.

AR **العمر.** يصيب داء بهجت غالبًا الرجال والنساء في **العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات**، وقد يصيب الأطفال وكبار السن أيضًا.

When the condition occurs at an **earlier age**, it tends to be **more severe**.

وعندما يحدث **في سن مبكرة** يميل إلى أن يكون **أشد**.

2

EN **Geography.** Although the disease occurs worldwide, people from countries in the **Middle East and Asia**, including **Turkey, Iran, Iraq, Japan and China**, are more likely to develop Behcet's.

AR **الجغرافيا.** مع أن المرض يحدث في أنحاء العالم، فإن سكان بلدان **الشرق الأوسط وآسيا**، ومنها **تركيا وإيران والعراق واليابان والصين**، أكثر عرضة للإصابة به.

3

EN **Sex.** While Behcet's disease occurs in both men and women, the disease is usually **more severe in men**.

AR **الجنس.** يحدث داء بهجت لدى الرجال والنساء، لكنه عادةً **أشد عند الرجال**.

4

EN **Genes.** Having certain genes **HLA-B51** is associated with a higher risk of developing Behcet's.

AR **الجينات.** امتلاك جينات معيّنة HLA-B51 يرتبط بخطر أعلى للإصابة بداء بهجت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Risk factors at a glance عوامل الخطورة باختصار

Risk factor عامل الخطورة	Remember للحفظ
Age العمر	20s–40s; earlier age = more severe العشرينيات إلى الأربعينيات؛ كلما كان أبكر كان أشد
Geography الجغرافيا	Middle East and Asia (Turkey, Iran, Iraq, Japan, China) الشرق الأوسط وآسيا (تركيا، إيران، العراق، اليابان، الصين)
Sex الجنس	Both; more severe in men الجنسان؛ أشد عند الرجال
Genes الجينات	HLA-B51 HLA-B51

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Clinical features المظاهر السريرية

Site الموضع	Feature المظهر
Mouth الفم	Painful mouth sores, identical to canker sores, are the most common sign of Behcet's disease. Sores begin as raised, round lesions in the mouth that quickly turn into painful ulcers. The sores heal usually in seven to 21 days, though they do recur. قرح فموية مؤلمة مطابقة لقرح القلاع، وهي أكثر علامات داء بهجت شيوعًا. تبدأ القرح آفاتٍ مرتفعة مستديرة في الفم تتحوّل سريعًا إلى قرح مؤلمة. وتلتئم عادةً خلال 7 إلى 21 يومًا لكنها تتكرّر.
Skin الجلد	Skin lesions may occur. Skin problems can vary. Some people may develop acne-like sores on their bodies. Others may develop nodules on the lower legs. قد تحدث آفات جلدية. وتتنوّع المشكلات الجلدية. فقد يصاب بعضهم بقرح شبيهة بحب الشباب على الجسم. ويصاب آخرون بعقيدات على الساقين.
Genitals الأعضاء التناسلية	Sores on the genitals, most commonly on the scrotum or the vulva. قرح على الأعضاء التناسلية، أكثرها على الصفن أو الفرج.
Eyes العينان	Inflammation in the eye — uveitis — causes redness, pain and blurred vision in one or both eyes. التهاب العين — التهاب العنبية — يسبّب الاحمرار والألم وتشوّش الرؤية في عين واحدة أو كلتيهما.
Joints المفاصل	Joint swelling and pain most commonly affect the knee. تورّم المفاصل وألمها يصيبان الركبة غالبًا.
Vascular system الجهاز الوعائي	Inflammation in veins and large arteries, causing redness, pain and swelling in the arms or legs when a blood clot results. التهاب الأوردة والشرايين الكبيرة، يسبّب احمرار الذراعين أو الساقين وألمهما وتورّمهما عند تكوّن خثرة دموية.
Digestive system الجهاز الهضمي	Abdominal pain, diarrhea or bleeding. ألم بطني أو إسهال أو نزف.
Brain الدماغ	Inflammation in the brain and nervous system that leads to headache, fever, disorientation, poor balance or stroke. التهاب الدماغ والجهاز العصبي يؤدي إلى الصداع والحمّى والتوهان وضعف التوازن أو السكتة الدماغية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Diagnosis التشخيص

EN There is **no diagnostic test** and the diagnosis is **entirely clinical**.

AR **لا يوجد فحص تشخيصي**، والتشخيص **سريري بالكامل**.

Laboratory findings are **nonspecific** and reflect the inflammatory state, **C-reactive protein** levels, **erythrocyte sedimentation rate (ESR)**, **leukocyte count**, **complement components**, and **acute-phase reactants** may all be **elevated during an acute attack**.

والموجودات المختبرية **غير نوعية** وتعكس الحالة الالتهابية؛ فقد ترتفع **مستويات CRP** و**سرعة ترسيب الكريات الحمر (ESR)** و**عدد الكريات البيض** و**مكوّنات المتمّمة** و**متفاعلات الطور الحاد** جميعها **خلال النوبة الحادة**.

Internationally accepted diagnosis criteria have been published recently.

ونُشرت حديثًا معايير تشخيص مقبولة دوليًا.

International Clinical Criteria for Behcet's Disease المعايير السريرية الدولية لداء بهجت

EN An international group of physicians has established a set of guidelines to aid in the classification of Behcet's patients.

AR وضعت مجموعة دولية من الأطباء مجموعة إرشادات للمساعدة في تصنيف مرضى بهجت.

The International Clinical Criteria for Behcet's Disease classification states patients must present with:

وتنص المعايير السريرية الدولية لتصنيف داء بهجت على أن المرضى يجب أن يُظهروا:

EN **Recurrent oral ulcerations** (apthous or herpetiform) **at least three times in one year**.

AR **تقرّحات فموية متكرّرة** (قلاعية أو شبيهة بالهربس) **ثلاث مرات على الأقل في السنة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Additionally, patients must present any two of the following:**

AR **إضافةً إلى ذلك يجب أن يُظهر المريض اثنين من الآتي:**

1. **Recurrent genital ulcerations.** **تقرّحات تناسلية متكرّرة.**
2. **Eye lesions** (uveitis or retinal vasculitis) observed by an ophthalmologist.
   آفات عينية (التهاب العنبية أو التهاب أوعية الشبكية) يلاحظها طبيب العيون.
3. **Skin lesions** (a variety of rashes or acne-like sores) may be caused by Behcet's disease.
   آفات جلدية (طفوح متنوعة أو قرح شبيهة بحب الشباب) قد يسبّبها داء بهجت.
   Positive [كلمة «Positive» مكرّرة في المصدر]
4. **Positive pathergy test**, your doctor inserts a **sterile needle** into your skin and then examines the area **two days later**.
   اختبار الباثيرجي (فرط التفاعل) الموجب: يُدخل الطبيب **إبرة معقّمة** في الجلد ثم يفحص المنطقة **بعد يومين.**
   If the pathergy test is positive, a **small red bump** forms under your skin where the needle was inserted.
   فإذا كان الاختبار موجبًا تتكوّن **نتوءة حمراء صغيرة** تحت الجلد مكان الإبرة.
   This indicates your immune system is **overreacting to the minor injury**.
   وهذا يدل على أن الجهاز المناعي **يبالغ في التفاعل مع إصابة بسيطة.**

Diagnosis = 1 + 2 **التشخيص = 1 + 2**

Criterion المعيار	Required المطلوب
Recurrent oral ulcers ≥ 3 times/year قرح فموية متكرّرة 3 مرات على الأقل في السنة	**Must** (1 major) **إلزامي** (معيار رئيس واحد)
Genital ulcers · Eye lesions · Skin lesions · Positive pathergy test قرح تناسلية · آفات عينية · آفات جلدية · اختبار باثيرجي موجب	**Any 2** **أي اثنين**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Quick summary & key terms الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short باختصار

1. Behcet's = rare, chronic, lifelong **vasculitis**; slightly **more men**.
   داء بهجت = **التهاب أوعية** نادر مزمن مدى الحياة؛ **الرجال أكثر قليلًا**.
2. **Triad:** oral aphthous ulcers + genital ulcers + uveitis.
   الثالوث: قرح فموية قلاعية + قرح تناسلية + التهاب العنبية.
3. Cause unknown, partly genetic: **HLA-B51**.
   السبب مجهول ووراثي جزئيًا: **HLA-B51**.
4. Risk: **20s–40s** (earlier = more severe), **Middle East & Asia** (incl. Iraq), **more severe in men**.
   الخطورة: **العشرينيات–الأربعينيات** (الأبكر أشد)، **الشرق الأوسط وآسيا** (ومنها العراق)، **أشد عند الرجال**.

1. Mouth sores = **most common sign**; heal in **7–21 days** and recur.
   قرح الفم = **أشيع علامة**؛ تلتئم خلال **7–21 يومًا** وتتكرّر.
2. **No diagnostic test** — diagnosis is **clinical**; CRP, ESR, WBC, complement rise in attacks (nonspecific).
   لا فحص تشخيصي — التشخيص **سريري**؛ ترتفع CRP وESR والبيض والمتمّمة في النوبات (غير نوعية).
3. Criteria: **oral ulcers ≥ 3/year + any 2** of genital ulcers, eye lesions, skin lesions, positive pathergy.
   المعايير: **قرح فموية 3 مرات سنويًا على الأقل + أي اثنين** من القرح التناسلية والآفات العينية والجلدية والباثيرجي الموجب.
4. **Pathergy test:** sterile needle → read after **2 days** → small red bump = positive.
   اختبار الباثيرجي: إبرة معقّمة ← يُقرأ بعد **يومين** ← نتوءة حمراء صغيرة = موجب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Key terms — more than one translation

أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Behcet's disease	داء بهجت / مرض بهجت / متلازمة بهجت
Vasculitis	التهاب الأوعية الدموية / التهاب وعائي
Aphthous ulcer	قرحة قلاعية / قلاع / تقرّح فموي
Canker sore	قرحة الفم / القلاع البسيط / الحويصلة الفموية
Uveitis	التهاب العنبية / التهاب القزحية والجسم الهدبي
Oligoarthritis	التهاب قلّة المفاصل / التهاب مفاصل قليلة العدد
Pathergy test	اختبار الباثيرجي / اختبار فرط التفاعل الجلدي / اختبار الوخز
Lesion	آفة / إصابة / تلف موضعي
Nodule	عقيدة / عقدة صغيرة
Scrotum	الصفن / كيس الخصية
Vulva	الفرج / الأعضاء التناسلية الخارجية الأنثوية
Acute-phase reactants	متفاعلات الطور الحاد / بروتينات المرحلة الحادة
Complement	المتمّمة / المتمّم / النظام المكمّل
Epigenetic	فوق جيني / فوق وراثي / لا جيني
Cytokine	سيتوكين / حركي خلوي
Disorientation	التوهان / فقدان التوجّه / التشوّش

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t