Pediatric Nursing
تمريض الأطفال

LECTURE 1 · المحاضرة 1

منظور في تمريض الأطفال

Perspective in Pediatric Nursing

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

LEC 1

Perspective in Pediatric Nursing — منظور في تمريض الأطفال

1 Statistical terms — المصطلحات الإحصائية

Two rates معدّلان

Term المصطلح	Definition التعريف
Birth rate **معدّل الولادات**	The number of live births per 1000 population per year. عدد الولادات الحيّة لكل 1000 من السكان في السنة.
Infant mortality rate **معدّل وفيات الرضّع**	The no. of deaths per 1000 live births occurring on the first 12 months of extra uterine life. عدد الوفيات لكل 1000 ولادة حيّة خلال أول 12 شهرًا من الحياة خارج الرحم.

EN **Factors affect the infant mortality rate:**

AR **العوامل المؤثّرة في معدّل وفيات الرضّع:**

1. Birth weight. — وزن الولادة.
2. Gestational age. — عمر الحمل.
3. Maternal age. — عمر الأم.
4. Low level of maternal education. — انخفاض مستوى تعليم الأم.

Why information on mortality and morbidity is important for nurses? — **لماذا تهمّ معلومات الوفيات والمراضة الممرّضين؟**

1. **Health during childhood:** Health is traditionally assessed by observing mortality "death" and morbidity "illness".

   الصحة في الطفولة: تُقيَّم الصحة تقليديًا بملاحظة الوفيات "الموت" والمراضة "المرض".

2. Information concerning mortality and morbidity is important for nurses because this knowledge provides a **rationale for planning and delivering care**.

   ومعلومات الوفيات والمراضة مهمّة للممرّضين لأن هذه المعرفة تقدّم **أساسًا منطقيًا لتخطيط الرعاية وتقديمها.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Such data provide information about:**

AR **توفّر هذه البيانات معلومات عن:**

1	the causes of death and illness	أسباب الوفاة والمرض
2	high - risk age groups for disorders or hazards	الفئات العمرية الأكثر خطورة للاضطرابات أو المخاطر
3	advances in treatment and prevention	التطوّرات في العلاج والوقاية
4	specific areas of health counseling	مجالات محدّدة من الإرشاد الصحي

In short باختصار

Birth rate = live births / **1000 population / year**.

معدّل الولادات = الولادات الحيّة / **1000 من السكان / سنة.**

Infant mortality = deaths / **1000 live births in the first 12 months**.

وفيات الرضّع = الوفيات / **1000 ولادة حيّة في أول 12 شهراً.**

4 factors: **birth weight, gestational age, maternal age, maternal education**.

4 عوامل: **وزن الولادة، وعمر الحمل، وعمر الأم، وتعليم الأم.**

2 Causes of mortality and morbidity أسباب الوفيات والمراضة

EN **leading causes of infant mortality in developed countries:**

AR **الأسباب الرئيسة لوفيات الرضّع في الدول المتقدّمة:**

1	Congenital anomalies.	التشوّهات الخلقية.
2	Disorders related to short gestation.	الاضطرابات المرتبطة بقِصَر مدّة الحمل.
3	Sudden infant death syndrome.	متلازمة موت الرضيع المفاجئ.
4	Respiratory Distress Syndrome (RDS).	متلازمة الضائقة التنفسية (RDS).
5	Accidents	الحوادث
6	Bacterial sepsis of newborn.	الإنتان الجرثومي عند حديث الولادة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7	Diseases of circulatory disorders.	أمراض اضطرابات الدوران.
8	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia.	نقص الأكسجة داخل الرحم واختناق الولادة.
9	Acute lower respiratory infections	التهابات الجهاز التنفسي السفلي الحادّة
10	Diarrheal diseases	أمراض الإسهال
11	Malnutrition diseases	أمراض سوء التغذية
12	Congenital heart diseases	أمراض القلب الخلقية

BIOS note ملاحظة BIOS

"Accidents" is written twice in the lecture list; it is shown once here.

كلمة "Accidents" مكرّرة مرّتين في قائمة المحاضرة؛ وذُكرت هنا مرّة واحدة.

Infants الرضّع

Leading causes of death among infant الأسباب الرئيسة لوفاة الرضّع	% النسبة
1. Pneumonia & other respiratory disorders 1. ذات الرئة واضطرابات تنفسية أخرى	39.7%
2. Prematurity and low birth weight 2. الخداج وانخفاض وزن الولادة	16.2%
3. Congenital malformation 3. التشوّهات الخلقية	15.9%
4. Infectious disease (a. Septicemia 15.2% — b. Diarrhea 0.1%) 4. الأمراض المعدية (أ. تسمّم الدم 15.2% — ب. الإسهال 0.1%)	15.3%
5. Sudden infant death 5. موت الرضيع المفاجئ	4.6%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1–4 years 4–1 سنوات

Leading causes of death among age group 1-4 years الأسباب الرئيسة للوفاة بعمر 1–4 سنوات	% النسبة
Pneumonia & other respiratory disorders ذات الرئة واضطرابات تنفسية أخرى	20.1%
Transport accidents حوادث النقل	13.2%
Congenital malformation التشوّهات الخلقية	12.5%
Infectious disease الأمراض المعدية	7.6%
Malnutrition and metabolic disorders سوء التغذية والاضطرابات الأيضية	5.6%

EN **Infant morbidity:** prevalence of a specific illness in a population at a particular time — **Acute illness**, **Chronic disease**, **Disability**

AR **المراضة عند الرضّع:** انتشار مرض معيّن في مجتمع ما في وقت محدّد — مرض حادّ، ومرض مزمن، وإعاقة

Acute vs chronic الحادّ مقابل المزمن

	Acute illness المرض الحادّ	Chronic illness المرض المزمن
Defined **التعريف**	"disease with an abrupt onset and usually a short course"; "illness of short duration, rapidly progressive, and in need of urgent care" "مرض ببداية مفاجئة ومسار قصير عادةً"؛ "مرض قصير المدّة، سريع التقدّم، ويحتاج رعاية عاجلة"	"illnesses that are prolonged, do not resolve spontaneously, and are rarely cured completely"; "a disease or disorder developing slowly and persisting for a long period of time, often for the remainder of the lifetime of the individual" "أمراض طويلة الأمد لا تزول تلقائيًا ونادرًا ما تُشفى تمامًا"؛ "مرض أو اضطراب يتطوّر ببطء ويستمر مدّة طويلة، غالبًا بقيّة حياة الفرد"

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Acute vs chronic (continued) الحادّ مقابل المزمن (تكملة)

	Acute illness المرض الحادّ	Chronic illness المرض المزمن
Defining characteristics **الصفات المميّزة**	Starts suddenly and are short lived; "Runs its course" regardless of drug intervention يبدأ فجأة وقصير الأمد؛ "يأخذ مساره" بغضّ النظر عن التدخّل الدوائي	–

In short باختصار

Infants die most from **pneumonia (39.7%)**, then prematurity and malformations.

يموت الرضّع أكثر من **ذات الرئة (39.7%)**، ثم الخداج والتشوّهات.

Age 1–4: pneumonia (20.1%) then **transport accidents (13.2%)**.

عمر 1–4: ذات الرئة (20.1%) ثم **حوادث النقل (13.2%)**.

Acute = sudden, short; chronic = slow, long, rarely cured.

الحادّ = مفاجئ وقصير، والمزمن = بطيء وطويل ونادرًا ما يُشفى.

3 Pediatric Nursing تمريض الأطفال

EN **Introduction:**

AR **المقدّمة:**

1. **Nurse** is one of the important components of the health team in caring for children.

   الممرّض أحد المكوّنات المهمة للفريق الصحي في رعاية الأطفال.

2. **The pediatric nurse** given direct bedside care to sick children, guide families in their care for their children during health and illness, in hospitals and at homes.

   ويقدّم **ممرّض الأطفال** رعاية مباشرة بجانب السرير للأطفال المرضى، ويرشد العائلات في رعاية أطفالها في الصحة والمرض، في المستشفيات والبيوت.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Pediatric Nursing:** It is the **art and science** of giving nursing care to children from **birth through adolescent** with emphasis on the physical growth, mental, emotional, and psychosocial development.

AR **تمريض الأطفال:** هو **فنّ وعلم** تقديم الرعاية التمريضية للأطفال من **الولادة حتى المراهقة**، مع التركيز على النمو الجسدي والتطوّر العقلي والعاطفي والنفسي الاجتماعي.

Scope of pediatric nursing practices — نطاق ممارسات تمريض الأطفال

1. Nurses have the responsibility in providing nursing interventions either in **ambulatory or institution setting**.

   يتحمّل الممرّضون مسؤولية تقديم التدخّلات التمريضية إمّا في **البيئة الخارجية (الإسعافية) أو المؤسّسية**.

2. **Ambulatory setting** such as home, school, and or physician's clinic where children and their parents have health or counseling needs.

   البيئة الخارجية مثل البيت والمدرسة وعيادة الطبيب، حيث تكون للأطفال وآبائهم احتياجات صحية أو إرشادية.

3. While **institutional settings** are mainly hospitals (general or specialized hospitals) where care is provided to sick children and their parents.

   بينما **البيئات المؤسّسية** هي أساسًا المستشفيات (العامّة أو التخصّصية) حيث تُقدَّم الرعاية للأطفال المرضى وآبائهم.

Roles and qualities — الأدوار والصفات

Role of a Pediatric Nurse دور ممرّض الأطفال	The good pediatric nurse must be (Qualified): يجب أن يكون ممرّض الأطفال الجيد (مؤهّلًا):
Direct مقدّم رعاية مباشرة	1. Good observer. 1. ملاحظ جيد.
Educator مثقِّف	2. Honest and truthful 2. أمين وصادق
Counselor مرشد	3. Sympathetic, kind, patient and cheerful 3. متعاطف ولطيف وصبور ومبتهج
Consultant مستشار	4. Love to work with children. 4. يحبّ العمل مع الأطفال.
Advocate مدافع عن حقوق الطفل	5. Interested in family care 5. مهتمّ برعاية العائلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Roles and qualities (continued) **الأدوار والصفات (تكملة)**

Role of a Pediatric Nurse دور ممرّض الأطفال	The good pediatric nurse must be (Qualified): يجب أن يكون ممرّض الأطفال الجيد (مؤهّلًا):
Care Coordinator, or health systems manager منسّق رعاية أو مدير أنظمة صحية	6. Able to provide teaching to children and their families 6. قادر على تعليم الأطفال وعائلاتهم
Researcher باحث	

In short **باختصار**

Pediatric nursing = **art and science**, birth → adolescence.

تمريض الأطفال = **فنّ وعلم**، من الولادة ← المراهقة.

Settings: **ambulatory** (home, school, clinic) vs **institutional** (hospitals).

البيئات: **خارجية** (البيت والمدرسة والعيادة) مقابل **مؤسّسية** (المستشفيات).

7 roles and 6 qualities — first quality: **good observer**.

7 أدوار و6 صفات — أوّل صفة: **ملاحظ جيد**.

4 Goals and role at the three levels — الأهداف والدور في المستويات الثلاثة

EN **The goals of nursing care of children** Based on primary health care are :

AR **أهداف الرعاية التمريضية للأطفال** المبنية على الرعاية الصحية الأولية:

1

EN Promote the healthy maturation of the child as a physical, intellectual, and emotional being within the context of his family and communities (**primary level**)

AR تعزيز النضج الصحي للطفل جسديًا وفكريًا وعاطفيًا ضمن عائلته ومجتمعه (**المستوى الأولي**)

2

EN Provide health care for the child who requires treatment from diseases (**secondary Level**).

AR تقديم الرعاية الصحية للطفل الذي يحتاج علاجًا من الأمراض (**المستوى الثانوي**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN Dealing with the child's disabilities (**tertiary level**).

AR التعامل مع إعاقات الطفل (**المستوى الثالثي**).

Three levels ثلاثة مستويات

Level المستوى	The Role of the Pediatric Nursing includes: يشمل دور تمريض الأطفال:
In primary level المستوى الأولي	Though health education to child and his parents and providing child's basic needs and immunization. It can: a) Maintain child's health. b) Help the child achieves his optimal growth and development. c) Prevent diseases and their complications. عبر التثقيف الصحي للطفل ووالديه وتوفير احتياجات الطفل الأساسية والتلقيح. ويمكنه: أ) الحفاظ على صحة الطفل. ب) مساعدة الطفل على بلوغ أمثل نمو وتطوّر. ج) الوقاية من الأمراض ومضاعفاتها.
In secondary level المستوى الثانوي	a) Assessing their needs. b) Nursing diagnosis. c) Planning for their care. d) Implementing the plan. e) Evaluation children's condition. f) Providing health teaching to children and their parents. أ) تقييم احتياجاتهم. ب) التشخيص التمريضي. ج) التخطيط لرعايتهم. د) تنفيذ الخطّة. هـ) تقييم حالة الأطفال. و) تقديم التثقيف الصحي للأطفال وآبائهم.
In tertiary level المستوى الثالثي	a) Assist children to return to their maximal level of functioning following illness and/ or disabilities. أ) مساعدة الأطفال على العودة إلى أقصى مستوى من الأداء بعد المرض و/أو الإعاقة.

In short باختصار

Primary = **prevention** (education, basic needs, immunization).

الأولي = **الوقاية** (التثقيف، والاحتياجات الأساسية، والتلقيح).

Secondary = **treatment** through the nursing process (assess → diagnose → plan → implement → evaluate).

الثانوي = **العلاج** عبر العملية التمريضية (تقييم ← تشخيص ← تخطيط ← تنفيذ ← تقويم).

Tertiary = **rehabilitation** of disabilities.

الثالثي = **تأهيل** الإعاقات.

5 Current trends in pediatric nursing الاتجاهات الحالية في تمريض الأطفال

1. Family centered care — الرعاية المتمركزة حول العائلة
2. High technology care — الرعاية عالية التقنية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3	Primary nursing	التمريض الأولي
4	Case management	إدارة الحالة
5	Cost containment	احتواء التكاليف
6	A traumatic care	الرعاية غير المؤلمة (اللاصدمية)
7	Nursing process application	تطبيق العملية التمريضية

EN **Factors influencing trends**

AR **العوامل المؤثّرة في الاتجاهات**

1	Changing needs of society .	تغيّر احتياجات المجتمع.
2	Medical and technological advances .	التقدّم الطبي والتقني.
3	Political interests .	المصالح السياسية.
4	Increased public awareness .	زيادة الوعي العام.

EN **Family centered care :** It based on philosophy that quality care can be provided in an environment that support **family integrity** and promote psychological and physiological health of the family

AR **الرعاية المتمركزة حول العائلة:** تقوم على فلسفة أن الرعاية الجيدة يمكن تقديمها في بيئة تدعم **تماسك العائلة** وتعزّز صحتها النفسية والجسدية

1. Health team should be flexible and creative in caring for the child within his family as their intervention are based on the needs of parent and child and on their coping resources.

يجب أن يكون الفريق الصحي مرنًا ومبدعًا في رعاية الطفل ضمن عائلته، لأن تدخّلاته تُبنى على احتياجات الوالدين والطفل وموارد تكيّفهم.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

2 Although the family is the **ultimate coordinator of its own care**, the nurse can help establish a positive environment for family members and help them accept and utilize the care provided.

ومع أن العائلة هي **المنسّق النهائي لرعايتها**، يستطيع الممرّض المساعدة في تهيئة بيئة إيجابية لأفراد العائلة ومساعدتهم على تقبّل الرعاية واستعمالها.

He\She can guide family members through the unknown of new experiences in seeking holistic health.

ويستطيع إرشادهم خلال المجهول من التجارب الجديدة سعياً إلى صحة شاملة.

Trends explained شرح الاتجاهات

Trend الاتجاه	Meaning المعنى
Primary Nursing التمريض الأولي	It is system for the distribution of nursing care in which care of one child is managed for the entire 24 hour day by one nurse who directs and coordinates nurses and other personnel, schedules all tests ,proced ures and daily activities for that patient. نظام لتوزيع الرعاية التمريضية تُدار فيه رعاية طفل واحد طوال 24 ساعة بممرّض واحد يوجّه وينسّق الممرّضين والعاملين الآخرين، ويجدول كل الفحوص والإجراءات والأنشطة اليومية لذلك المريض.
Case management إدارة الحالة	Process of coordinating the delivery of health care services in manner that focuses on both quality and cost out come . عملية تنسيق تقديم الخدمات الصحية بطريقة تركّز على الجودة والكلفة معًا.
Cost containment احتواء التكاليف	Is management technique can achieved in many ways in hospital either by cutting nursing position or by improving the process of care and tightening non labour resources . أسلوب إداري يتحقّق في المستشفى بطرق عدّة، إمّا بتقليص الوظائف التمريضية أو بتحسين عملية الرعاية وضبط الموارد غير البشرية.
A traumatic care الرعاية اللاصدمية	Is intended to reduce mental and physical harm and to provide an environment with minimum physical and mental trauma. تهدف إلى تقليل الأذى النفسي والجسدي وتوفير بيئة بأقل صدمة جسدية ونفسية.
Nursing process application تطبيق العملية التمريضية	Assessment , diagnosis , planning , intervention and evaluation التقييم، والتشخيص، والتخطيط، والتدخّل، والتقويم

BIOS note ملاحظة BIOS

"A traumatic care" in the lecture is **atraumatic care** (care without trauma).

"A traumatic care" في المحاضرة تعني **atraumatic care** (الرعاية بلا صدمة).

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

Nursing process **العملية التمريضية**

Assessment التقييم → **Diagnosis** التشخيص → **Planning** التخطيط → **Intervention** التدخّل → **Evaluation** التقويم

In short باختصار

7 trends — remember **family centered** first, **atraumatic** for less harm.

7 اتجاهات — تذكّر **المتمركزة حول العائلة** أولًا، و**اللاصدمية** لتقليل الأذى.

Primary nursing = **one nurse, one child, 24 h**.

التمريض الأولي = **ممرّض واحد لطفل واحد، 24 ساعة**.

Case management = **quality + cost**.

إدارة الحالة = **الجودة + الكلفة**.

6 Parent education and pediatric ethics تثقيف الوالدين وأخلاقيات طب الأطفال

EN Parent education

AR تثقيف الوالدين

1. One of the major roles of the nurses is **teaching both the child** (according to his age) **and his family members** especially his parent.

   من الأدوار الرئيسة للممرّضين **تعليم الطفل** (حسب عمره) **وأفراد عائلته**، ولا سيما والديه.

2. The nurse has many opportunities in providing health education to parents' daily either for child's parent alone or in group (group teaching of parents and children).

   وللممرّض فرص كثيرة لتقديم التثقيف الصحي للوالدين يوميًا، إمّا لوالدي الطفل وحدهما أو ضمن مجموعة (تعليم جماعي للوالدين والأطفال).

3. Many **teaching aids** such as charts, audio-visual materials and equipment for demonstration can be used in educating both parents and their children.

   ويمكن استعمال **وسائل تعليمية** كثيرة مثل المخطّطات والمواد السمعية البصرية والأجهزة للعرض العملي في تثقيف الوالدين وأطفالهم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Their education may be specific to information on:**

AR **قد يتناول تثقيفهم معلومات محدّدة عن:**

1. Growth and development needs . — احتياجات النمو والتطوّر.
2. Child's health promotion and maintenance as nutritional need and hygienic care.
تعزيز صحة الطفل والحفاظ عليها مثل الاحتياجات الغذائية والعناية بالنظافة.
3. Preventive aspects, such as accident prevention, immunization, periodic examination.
الجوانب الوقائية مثل الوقاية من الحوادث والتلقيح والفحص الدوري.
4. Child's illness (nature of illness and care needs).
مرض الطفل (طبيعة المرض واحتياجات الرعاية).
5. Plan for child's discharge such as child's medication, follow up nutrition …ect.
خطّة خروج الطفل مثل أدويته ومتابعة تغذيته... إلخ.

EN **Pediatric Ethics:** is a branch of **bioethics** that analyzes aspect of decision make relating to health care of children Culture child is born as a member of family and society as well as of a certain culture children are affected by culture

AR **أخلاقيات طب الأطفال:** فرع من **أخلاقيات علم الأحياء** يحلّل جوانب اتّخاذ القرار المتعلّقة بالرعاية الصحية للأطفال، فالطفل يولد عضوًا في عائلة ومجتمع وثقافة معيّنة، ويتأثّر الأطفال بالثقافة

EN **General Ethical Principle :**

AR **المبادئ الأخلاقية العامة:**

1. Respect of the individual autonomy — احترام استقلالية الفرد
2. Respect of the individual competence — احترام كفاءة الفرد
3. Respect beneficence — احترام مبدأ الإحسان (فعل الخير)
4. Respect of the truth — احترام الحقيقة
5. Respect of patient confidentiality — احترام سرّية المريض
6. Respect the limitation of medical care — احترام حدود الرعاية الطبية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Teach **child + parents**; use teaching aids.

علّم **الطفل + الوالدين**؛ واستعمل الوسائل التعليمية.

5 topics: **growth, health promotion, prevention, illness, discharge plan**.

5 مواضيع: **النمو، وتعزيز الصحة، والوقاية، والمرض، وخطّة الخروج**.

6 ethical principles: **autonomy, competence, beneficence, truth, confidentiality, limits of care**.

6 مبادئ أخلاقية: **الاستقلالية، والكفاءة، والإحسان، والحقيقة، والسرّية، وحدود الرعاية**.

7 Communication skills (With Children and Their Families) مهارات التواصل (مع الأطفال وعائلاتهم)

1. **Communication :** is a **two-way process** by which information exchanged between individuals with use of language, behaviors, or symbols.

التواصل: عملية ذات اتّجاهين تُتبادل فيها المعلومات بين الأفراد باستعمال اللغة أو السلوك أو الرموز.

2. **Or** it's a complex process that including the perception and judgments of all individuals involved.

أو هو عملية معقّدة تشمل إدراك وأحكام كل الأفراد المشاركين.

3. Communication may be, **verbal** and **nonverbal**.

وقد يكون التواصل **لفظيًا** و**غير لفظي**.

Type النوع	Includes يشمل
Verbal communication **التواصل اللفظي**	may involve language and its expression: vocalization in the form of laughs, moans, and squalls قد يشمل اللغة والتعبير عنها: الأصوات بشكل ضحك وأنين وصراخ
Nonverbal communication **التواصل غير اللفظي**	often called "body language" includes gestures, movements, facial expressions, postures, and reactions. يُسمّى غالبًا "لغة الجسد"، ويشمل الإيماءات والحركات وتعابير الوجه والوضعيات وردود الفعل.

By age حسب العمر

Developmental stage مرحلة التطوّر	Communication according developmental stage التواصل بحسب مرحلة التطوّر
Infancy **الرضاعة**	Because they are unable to use words, primarily use and understand nonverbal communication. لأنهم لا يستطيعون استعمال الكلمات، يستعملون ويفهمون أساسًا التواصل غير اللفظي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

By age (continued) حسب العمر (تكملة)

Developmental stage مرحلة التطوّر	Communication according developmental stage التواصل بحسب مرحلة التطوّر
Early Childhood **الطفولة المبكرة**	Children younger than 5 years old are egocentric. They see things only in relation to themselves and from their point of view. Although they have not yet acquired sufficient language skills to express their feelings and wants, toddlers can effectively use their hands to communicate ideas without words. الأطفال دون 5 سنوات متمركزون حول ذواتهم، يرون الأشياء فقط من علاقتها بهم ومن وجهة نظرهم؛ ومع أنهم لم يكتسبوا بعد مهارات لغوية كافية للتعبير عن مشاعرهم ورغباتهم، يستطيع الدارجون استعمال أيديهم بفعالية لإيصال الأفكار بلا كلمات.
School-Age Years **سنّ المدرسة**	They want explanations and reasons for everything but require no verification beyond that. يريدون تفسيرات وأسبابًا لكل شيء، لكنهم لا يحتاجون تحقّقًا أبعد من ذلك.
Adolescence **المراهقة**	The Art of Listening فنّ الإصغاء

Do's and barriers الواجبات والمعوّقات

Communicate Effectively التواصل الفعّال	Barriers to communication معوّقات التواصل
1. Give individual attention. 1. أعطِ اهتمامًا فرديًا.	1. Language . 2. Values and beliefs . 1. اللغة. 2. القيم والمعتقدات.
2. Listen, listen, listen. 2. أصغِ، أصغِ، أصغِ.	3. Child age. 4. Economic status for family . 3. عمر الطفل. 4. الوضع الاقتصادي للعائلة.
3. Be courteous, calm, and open minded 3. كن مهذّبًا وهادئًا ومنفتحًا	5. Child Educational level . 6. Physical barriers (mental disorder, learning disorder.(5. المستوى التعليمي للطفل. 6. الحواجز الجسدية (الاضطراب العقلي، واضطراب التعلّم)
4. Try to not overreact 4. حاول ألّا تبالغ في ردّ الفعل	7. Attitude. 8. Timing.. 7. الموقف. 8. التوقيت.
5. Avoid judging or criticizing 5. تجنّب الحكم أو الانتقاد	9. Understanding of message . 10.Trust. 9. فهم الرسالة. 10. الثقة.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

In short باختصار

Communication = **two-way**: verbal + nonverbal (body language).

التواصل = **باتّجاهين**: لفظي + غير لفظي (لغة الجسد).

Infant: **nonverbal**; under 5: **egocentric**; school age: **wants reasons**; adolescent: **listen**.

الرضيع: **غير لفظي**؛ دون 5: **متمركز حول ذاته**؛ سنّ المدرسة: **يريد أسبابًا**؛ المراهق: **الإصغاء**.

10 barriers, starting with **language** and ending with **trust**.

10 معوّقات، أوّلها **اللغة** وآخرها **الثقة**.

8 Communicating with Children التواصل مع الأطفال

Key المفتاح

Effective listening is the key to successful communication.

الإصغاء الفعّال هو مفتاح التواصل الناجح.

1. Allow children time to feel comfortable. امنح الأطفال وقتًا ليشعروا بالراحة.
2. Avoid sudden or rapid advances, broad smiles, extended eye contact, or other gestures.
   تجنّب الاقتراب المفاجئ أو السريع، والابتسامات العريضة، والتحديق الطويل، أو الإيماءات الأخرى.
3. Talk to the parent if child is initially shy.
   تحدّث إلى الوالد إذا كان الطفل خجولًا في البداية.
4. Communicate through transition objects such as dolls, and stuffed animals.
   تواصل عبر أشياء انتقالية مثل الدمى والحيوانات المحشوّة.
5. Give older children the opportunity to talk without the parents present.
   امنح الأطفال الأكبر فرصة الكلام دون حضور الوالدين.
6. Assume a position that is at eye level with child.
   اتّخذ وضعية بمستوى عين الطفل.
7. Speak in a quiet, unhurried, and confident voice.
   تكلّم بصوت هادئ غير مستعجل وواثق.
8. Speak clearly, be specific, and use simple words and short sentences.
   تكلّم بوضوح وكن محدّدًا واستعمل كلمات بسيطة وجملًا قصيرة.
9. State directions and suggestions positively.
   صِغ التوجيهات والاقتراحات بشكل إيجابي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 Offer a choice only when one exists.

قدّم خيارًا فقط عندما يكون موجودًا فعلًا.

11 Be honest with children. كن صادقًا مع الأطفال.

12 Allow them to express their concerns and fears.

اسمح لهم بالتعبير عن مخاوفهم وقلقهم.

13 Use a variety of communication techniques استعمل تقنيات تواصل متنوّعة

EN **Communication techniques for children**

AR **تقنيات التواصل مع الأطفال**

1 Play. اللعب.

2 Draw, paint, and sculpt. الرسم والتلوين والنحت.

3 games. word Storytelling, الألعاب، ورواية القصص بالكلمات،

4 videos. movies, watch books; Read الفيديوهات والأفلام ومشاهدة الكتب؛ القراءة

5 Write. الكتابة.

1 **Play is a universal language of children.** **اللعب لغة الأطفال العالمية.**

It is one of the most important forms of communication and can be an effective technique in relating to them.

وهو من أهم أشكال التواصل، ويمكن أن يكون تقنية فعّالة للتواصل معهم.

2 The nurse can often pick up on clues about physical, intellectual, and social developmental progress from the form and complexity of child's play behaviors.

وكثيرًا ما يلتقط الممرّض مؤشّرات عن التقدّم الجسدي والفكري والاجتماعي من شكل سلوك لعب الطفل وتعقيده.

3 Through play, children reveal their perceptions of interpersonal relationships with their family, friends, or hospital personnel.

ومن خلال اللعب يكشف الأطفال تصوّراتهم عن علاقاتهم بعائلاتهم وأصدقائهم أو العاملين في المستشفى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Children may also reveal the wide scope of knowledge they have acquired from listening to others around them.

وقد يكشفون أيضًا سعة المعرفة التي اكتسبوها من الإصغاء لمن حولهم.

12 basics 12 أساسًا

Basic for Nursing communicating with children أساسيات تواصل الممرّض مع الأطفال	
1. Introduce yourself and explain your role 1. عرّف بنفسك واشرح دورك	7. Use family terms 7. استعمل مصطلحات العائلة
2. Position should be at level of child 2. تكون وضعيتك بمستوى الطفل	8. Speak calm ,quit and confident 8. تكلّم بهدوء وسكون وثقة
3. Allow to parents stay with child if need 3. اسمح للوالدين بالبقاء مع الطفل عند الحاجة	9. Use positive statement 9. استعمل عبارات إيجابية
4. Smile and eye contact with child 4. ابتسم وتواصل بالعين مع الطفل	10.Encourage child to express his feeling. 10. شجّع الطفل على التعبير عن مشاعره.
5. All question direct and explanation if need 5. اجعل كل الأسئلة مباشرة مع الشرح عند الحاجة	11.Observe nonverbal cues 11. لاحظ الإشارات غير اللفظية
6. Good listening and pause 6. إصغاء جيد مع التوقّف	12.Older children need privacy 12. الأطفال الأكبر يحتاجون خصوصية

In short باختصار

Listening is the **key**; get down to **eye level**; be **honest**.

الإصغاء هو **المفتاح**؛ انزل إلى **مستوى العين**؛ وكن **صادقًا**.

Play = the universal language of children.

اللعب = لغة الأطفال العالمية.

Shy child → talk to the **parent** first; older child → **privacy**.

الطفل الخجول ← كلّم **الوالد** أولًا؛ والطفل الأكبر ← **الخصوصية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 Immunity and immunization for children المناعة والتلقيح للأطفال

1. Infants and children are susceptible to infectious diseases because their **immune systems are immature**.

الرضّع والأطفال معرّضون للأمراض المعدية لأن **أجهزتهم المناعية غير ناضجة.**

2. As children mature and grow, their exposure to infectious agents increases and they develop antibodies naturally.

ومع نضج الأطفال ونموّهم يزداد تعرّضهم للعوامل المعدية فيكوّنون الأضداد بشكل طبيعي.

1. **Immunization:** The process of inducing or providing active or passive immunity artificially by administering an immunobiologic.

التلقيح (التمنيع): عملية إحداث أو توفير مناعة فاعلة أو منفعلة صناعيًا بإعطاء مادة مناعية حيوية.

2. **Immunity:** is the ability of the body to protect against all types of foreign bodies that enter the body.

المناعة: قدرة الجسم على الحماية من كل أنواع الأجسام الغريبة التي تدخله.

Immunity also called **disease resistance**. وتُسمّى المناعة أيضًا **مقاومة المرض.**

3. **Immune protection:** Children receive protection from infectious diseases naturally and artificially.

الحماية المناعية: يحصل الأطفال على الحماية من الأمراض المعدية طبيعيًا وصناعيًا.

1. Immunization is the **key disease prevention**.

التلقيح هو **مفتاح الوقاية من الأمراض.**

2. The development of effective vaccines, beginning in the 1940s, revolutionized children's health care .

وقد أحدث تطوير لقاحات فعّالة، منذ أربعينيات القرن العشرين، ثورة في الرعاية الصحية للأطفال.

3. Immunization shift care from **disease treatment to disease prevention** .

ونقل التلقيحُ الرعايةَ من **علاج المرض إلى الوقاية منه.**

4. The nurse needs to understand the principles of immunizations, the proper use of vaccines, and barriers to immunization.

ويحتاج الممرّض إلى فهم مبادئ التلقيح والاستعمال الصحيح للقاحات ومعوّقات التلقيح.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

Methods of obtaining immune protection — طرق الحصول على الحماية المناعية

EN Immune protection can obtained in **five different methods:**

AR يمكن الحصول على الحماية المناعية **بخمس طرق مختلفة:**

1

EN **Natural (innate) immunity:** Innate immunity is a combination of natural and nonspecific immunity that can protect the human body from pathogens and foreign agents (For example, the phagocytic action of white blood cells (macrophages)

AR **المناعة الطبيعية (الفطرية):** مزيج من المناعة الطبيعية وغير النوعية يحمي جسم الإنسان من الممرضات والعوامل الغريبة (مثل الفعل البلعمي للكريات البيض (البلاعم))

2

EN **Naturally acquired active immunity:** is obtained when the body's immune system responds to a specific pathogen.

AR **المناعة الفاعلة المكتسبة طبيعياً:** تُكتسب حين يستجيب الجهاز المناعي لممرض معيّن.

Antibodies and memory cells prevent or reduce the severity of infection with that specific pathogen.

فتمنع الأضداد وخلايا الذاكرة العدوى بذلك الممرض أو تخفّف شدّتها.

It **persists for many years**.

وتدوم سنوات كثيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Naturally acquired passive immunity:** involves **mother-to-fetus** transmission of maternal antibodies (**immunoglobulin G crosses the placenta**).

AR **المناعة المنفعلة المكتسبة طبيعيًا:** تنتقل فيها أضداد الأم **من الأم إلى الجنين** (**الغلوبولين المناعي G يعبر المشيمة**).

After birth, the infant can receive passive immunity through maternal antibodies in **breast milk**.

وبعد الولادة يمكن أن يحصل الرضيع على مناعة منفعلة عبر أضداد الأم في **حليب الثدي**.

It lasts only as long as the antibodies remain in the blood (usually from a few weeks to about 2 months).

وتدوم فقط ما دامت الأضداد في الدم (عادةً من بضعة أسابيع إلى نحو شهرين).

Some antibodies remain up to age 1 year, such measles.

وتبقى بعض الأضداد حتى عمر سنة، مثل أضداد الحصبة.

4

EN **Artificially acquired active immunity:** is achieved by administration of a **vaccine or toxoid**.

AR **المناعة الفاعلة المكتسبة صناعيًا:** تتحقّق بإعطاء **لقاح أو ذوفان**.

The vaccine or toxoid stimulates the immune system's production of antibodies against a specific antigen, but symptoms of the disease aren't produced.

فيحفّز اللقاح أو الذوفان الجهاز المناعي على إنتاج أضداد ضد مستضد معيّن، لكن دون ظهور أعراض المرض.

5

EN **Artificially acquired passive immunity:** administration of a specific **immunoglobulin** (when antibodies developed in another person or animal donor are injected into an individual usually intravenous)

AR **المناعة المنفعلة المكتسبة صناعيًا:** إعطاء **غلوبولين مناعي** نوعي (حين تُحقن في الفرد أضداد تكوّنت في شخص آخر أو حيوان متبرّع، عادةً في الوريد)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t




Figure 1. Types of Immunity: active (natural: infection; artificial: vaccination) and passive (natural: maternal antibodies; artificial: monoclonal antibodies)

الشكل 1. أنواع المناعة: الفاعلة (الطبيعية: العدوى؛ الصناعية: التلقيح) والمنفعلة (الطبيعية: أضداد الأم؛ الصناعية: الأضداد وحيدة النسيلة)

4 acquired types **4 أنواع مكتسبة**

	Active (body makes antibodies) فاعلة (الجسم يصنع الأضداد)	Passive (ready antibodies) منفعلة (أضداد جاهزة)
Natural **طبيعية**	Infection — lasts many years العدوى — تدوم سنوات	Mother → fetus (IgG) + breast milk — weeks to 2 months الأم ← الجنين (IgG) + الحليب — أسابيع إلى شهرين
Artificial **صناعية**	Vaccine or toxoid لقاح أو ذوفان	Immunoglobulin / monoclonal antibodies غلوبولين مناعي / أضداد وحيدة النسيلة

In short **باختصار**

5 methods: **innate** + natural/artificial × active/passive.

5 طرق: **الفطرية** + طبيعية/صناعية × فاعلة/منفعلة.

IgG crosses the placenta; breast milk gives passive immunity.

IgG يعبر المشيمة؛ وحليب الثدي يعطي مناعة منفعلة.

Vaccine = artificial **active**; immunoglobulin = artificial **passive**.

اللقاح = صناعية **فاعلة**؛ والغلوبولين المناعي = صناعية **منفعلة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 Terms المصطلحات

Terms 1 المصطلحات 1

Term المصطلح	Definition التعريف
Immunity المناعة	An inherited or acquired state, in which the individual resistant to the infectious agent حالة موروثة أو مكتسبة يقاوم فيها الفرد العامل المعدي
Antibody الضد (الجسم المضاد)	A protein, found mostly in serum, formed in response to antigen exposure بروتين يوجد غالبًا في المصل، يتكوّن استجابةً للتعرّض لمستضد
Antigen المستضد	A variety of foreign substances, including bacteria, viruses, toxins, and foreign proteins, that stimulate the formation of antibodies. مجموعة من المواد الغريبة، منها البكتيريا والفيروسات والسموم والبروتينات الغريبة، تحفّز تكوين الأضداد.
Immunization التمنيع	process of inducing (active or passive immunity) artificially (response of vaccination) عملية إحداث مناعة (فاعلة أو منفعلة) صناعيًا (استجابة التلقيح)
Vaccination التلقيح	administer of vaccine to individual إعطاء اللقاح للفرد
Vaccine اللقاح	A suspension of (attenuated or inactivated microorganisms or fractions of microorganism) administered to stimulate immunity معلّق من (أحياء مجهرية موهَنة أو معطّلة أو أجزاء منها) يُعطى لتحفيز المناعة
Attenuate الإيهان (التوهين)	Reduce the virulence of microorganism by heat or chemicals تقليل ضراوة الحي المجهري بالحرارة أو المواد الكيميائية
Immunobiologic المادة المناعية الحيوية	antigenic substance (e.g., vaccines and toxoids) or antibody containing preparations (e.g., globulins and antitoxins) from human or animal donors, used for active or passive immunization or therapy. مادة مستضدية (مثل اللقاحات والذوفانات) أو مستحضرات تحتوي أضدادًا (مثل الغلوبولينات ومضادات السموم) من متبرّعين بشر أو حيوانات، تُستعمل للتمنيع الفاعل أو المنفعل أو العلاج.
Toxoids الذوفانات	a modified bacterial toxin that has been made nontoxic but retains the ability to stimulate the formation of antitoxin. سمّ بكتيري معدّل جُعل غير سام لكنه يحتفظ بقدرته على تحفيز تكوين مضاد السم.
Antitoxin مضاد السم (الترياق)	a solution of antibodies (e.g., diphtheria antitoxin and botulinum antitoxin) derived from the serum of animals immunized with specific antigens and used to confer passive immunity and for treatment. محلول أضداد (مثل مضاد سم الخناق ومضاد سم البوتولينوم) مشتقّ من مصل حيوانات مُنّعت بمستضدات معيّنة، يُستعمل لإعطاء مناعة منفعلة وللعلاج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Terms 2 المصطلحات 2

Term المصطلح	Definition التعريف
Immune globulin (IG): or intravenous immune globulin (IVIG) **الغلوبولين المناعي (IG) أو الغلوبولين المناعي الوريدي (IVIG)**	a sterile solution containing antibodies from large pools of human blood plasma; primarily indicated for routine maintenance of immunity of certain immunodeficient persons and for passive immunization against measles and hepatitis A. محلول معقّم يحتوي أضدادًا من مجمّعات كبيرة من بلازما الدم البشرية؛ يُستطبّ أساسًا للحفاظ الروتيني على مناعة بعض ناقصي المناعة وللتمنيع المنفعل ضد الحصبة والتهاب الكبد A.
Specific immune globulins **الغلوبولينات المناعية النوعية**	special preparations obtained from blood plasma from donor pools preselected for a high antibody content against a specific antigen (e.g., hepatitis B immune globulin, varicella zoster immune globulin, rabies immune globulin, tetanus immune globulin, vaccinia immune globulin, and cytomegalovirus immune globulin); as with IG and IVIG, do not transmit hepatitis B virus, human immunodeficiency virus (HIV) or other infectious disease. مستحضرات خاصّة من بلازما متبرّعين مختارين مسبقًا لاحتوائها نسبة أضداد عالية ضد مستضد معيّن (مثل غلوبولين التهاب الكبد B، وغلوبولين الحماق النطاقي، وغلوبولين داء الكلب، وغلوبولين الكزاز، وغلوبولين الوقس، وغلوبولين الفيروس المضخّم للخلايا)؛ ومثل IG وIVIG لا تنقل فيروس التهاب الكبد B ولا فيروس نقص المناعة البشري ولا أمراضًا معدية أخرى.

In short باختصار

Vaccine → **active**; antitoxin and immune globulins → **passive**.

اللقاح ← **فاعلة**؛ ومضاد السم والغلوبولينات المناعية ← **منفعلة**.

Toxoid = toxin made **nontoxic** but still makes antitoxin.

الذوفان = سمّ جُعل **غير سام** لكنه ما زال يكوّن مضاد السم.

IG/IVIG used for **measles and hepatitis A**.

IG/IVIG يُستعمل لـ**الحصبة والتهاب الكبد A**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 Types and indications of vaccines أنواع اللقاحات ودواعي التلقيح

4 vaccine types 4 أنواع لقاحات

Type of vaccine نوع اللقاح	Description and example الوصف والمثال
Attenuated (weakened) الموهَن (المضعَّف)	live viruses are used in some vaccines such as in the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. تُستعمل فيروسات حيّة في بعض اللقاحات مثل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).
Killed (inactivated) المقتول (المعطّل)	viruses or bacteria are used in some vaccines, such as in IPV. تُستعمل فيروسات أو بكتيريا مقتولة في بعض اللقاحات مثل IPV.
Toxoid vaccines لقاحات الذوفان	contain an inactivated toxin produced by the bacterium. For example, the diphtheria and tetanus vaccines. تحتوي سمًّا معطّلًا تنتجه البكتيريا. مثل لقاحي الخناق والكزاز.
Conjugate vaccines اللقاحات المقترنة	(such as Haemophilus influenza type B HIB) contain parts of bacteria combined with proteins. (مثل المستدمية النزلية نوع HIB B) تحتوي أجزاء من البكتيريا مقترنة ببروتينات.

EN Indication of Immunization

AR دواعي التلقيح

1. Immunizations **protect you or your child** from dangerous diseases.
   يحميك التلقيح **أنت أو طفلك** من الأمراض الخطيرة.
2. Immunizations help **reduce the spread** of disease to others.
   ويساعد التلقيح في **تقليل انتشار** المرض للآخرين.
3. Vaccines protect not only yourself but also **others around you**
   واللقاحات لا تحميك وحدك بل **تحمي من حولك** أيضًا
4. Getting immunized **costs less** than getting treated for the diseases that the shots protect you from.
   والتلقيح **أقلّ كلفة** من علاج الأمراض التي تحميك منها الحقن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Live attenuated = **MMR**; killed = **IPV**; toxoid = **diphtheria, tetanus**; conjugate = **HIB**.

الحي الموهَن = MMR؛ والمقتول = IPV؛ والذوفان = الخناق والكزاز؛ والمقترن = HIB.

12 Summary of immunization by dose, route, and age جدول التلقيح بحسب الجرعة والطريق والعمر

EN Iraqi immunization schedule according to the child's age

AR جدول التلقيح في العراق بحسب عمر الطفل

Iraq schedule جدول العراق

Age العمر	Vaccines اللقاحات	Route الطريق
First 24 hr أول 24 ساعة	Hepatitis B virus HBV. التهاب الكبد B (HBV).	IM
1 W – 1 M أسبوع – شهر	Oral Polio vaccine OPV-0. / BCG (Bacillus Calmette Guerin vaccine). شلل الأطفال الفموي OPV-0. / لقاح BCG (عصيّة كالميت-غيران).	Oral / I.D
2 months شهران	Oral Polio vaccine OPV-1. / Pentavalent vaccine 1st dose DPT (Diphtheria + Tetanus + Pertussis + Hemophilus + Influenza b virus + Hepatitis B virus). / Rota virus 1st dose. / Pneumococcal conjugate vaccine شلل الأطفال الفموي OPV-1. / اللقاح الخماسي الجرعة 1 DPT (الخناق + الكزاز + السعال الديكي + المستدمية النزلية b + التهاب الكبد B). / الروتا الجرعة 1. / لقاح المكوّرات الرئوية المقترن	Oral / IM / Oral / IM
4 months 4 أشهر	Oral Polio vaccine OPV-2. / Pentavalent vaccine DPT 2nd dose. / Rota virus 2nd dose. / Pneumococcal conjugate vaccine. / Injectable Polio vaccine IPV. شلل الأطفال الفموي OPV-2. / الخماسي الجرعة 2. / الروتا الجرعة 2. / المكوّرات الرئوية المقترن. / شلل الأطفال المحقون IPV.	Oral / IM / Oral / IM / IM
6 months 6 أشهر	Oral Polio vaccine OPV-3 / Pentavalent vaccine DPT 3rd dose. / Rota virus 3rd dose. / Pneumococcal conjugate vaccine. / Injectable Polio vaccine IPV. شلل الأطفال الفموي OPV-3 / الخماسي الجرعة 3. / الروتا الجرعة 3. / المكوّرات الرئوية المقترن. / شلل الأطفال المحقون IPV.	Oral / IM / Oral / IM / IM
9 months 9 أشهر	Measles. / Vitamin A (100,000 IU) الحصبة. / فيتامين A (100,000 وحدة دولية)	S.C / Oral

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Iraq schedule (continued) **جدول العراق (تكملة)**

Age العمر	Vaccines اللقاحات	Route الطريق
12 to 15 mo **15–12 شهرًا**	MMR 1st dose (measles, mumps, rubella). MMR الجرعة 1 (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية).	S.C
18 months **18 شهرًا**	Oral Polio vaccine (OPV) 1st booster dose. / First booster dose (Diphtheria + Tetanus + Pertussis DTP). / MMR (measles, mumps, rubella) 2nd dose. / Vitamin A (200, 000 IU). الجرعة المنشّطة الأولى لشلل الأطفال الفموي. / الجرعة المنشّطة الأولى (الخناق + الكزاز + السعال الديكي DTP). / MMR الجرعة 2. / فيتامين A (200,000 وحدة).	Oral / IM / S.C / Oral
4–6 years **6–4 سنوات**	Oral Polio vaccine OPV 2nd booster dose. / Second booster dose (Diphtheria + Tetanus Pertussis DTP). / Vitamin A (200, 000 IU). الجرعة المنشّطة الثانية لشلل الأطفال الفموي. / الجرعة المنشّطة الثانية (DTP). / فيتامين A (200,000 وحدة).	Oral / IM / Oral

BIOS note **ملاحظة BIOS**

Routes: **IM** = intramuscular (عضلي)، **I.D** = intradermal (داخل الأدمة)، **S.C** = subcutaneous (تحت الجلد)، **Oral** = by mouth (فموي).

الطرق: IM عضلي، وI.D داخل الأدمة، وS.C تحت الجلد، وOral فموي.

In short **باختصار**

Birth: **HBV**; first month: **OPV-0 + BCG (I.D)**.

الولادة: HBV، والشهر الأول: OPV-0 + BCG (داخل الأدمة).

2, 4, 6 months: **OPV + pentavalent + rota + pneumococcal** (+ IPV at 4 and 6).

2 و4 و6 أشهر: OPV + الخماسي + الروتا + المكوّرات الرئوية (+ IPV في 4 و6).

9 m: **measles + vit A**; 12–15 m: **MMR 1**; 18 m and 4–6 y: **boosters**.

9 أشهر: الحصبة + فيتامين A، و12–15 شهرًا: MMR 1، و18 شهرًا و4–6 سنوات: الجرعات المنشّطة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

13 Contraindications, side effects and nursing care — موانع التلقيح وأعراضه الجانبية والرعاية التمريضية

EN

Contraindications to vaccine administration

AR

موانع إعطاء اللقاح

1. Mild illnesses and low-grade fevers that are common in children are **not contraindications** .

الأمراض الخفيفة والحمّى البسيطة الشائعة عند الأطفال **ليست موانع**.

2. However, there are several reasons to withhold or delay vaccine administration :

لكن هناك أسبابًا عدّة لحجب اللقاح أو تأجيله:

3. Child with moderate to severe illness or a history of allergic response or anaphylaxis to vaccine .

طفل بمرض متوسط إلى شديد أو بتاريخ تحسّس أو صدمة تأقية من لقاح.

4. Vaccination with containing live or attenuated viruses not given to child with immunodeficiency disease (leukemic), or receiving immunosuppressive therapy .

اللقاحات الحاوية على فيروسات حيّة أو موهَنة لا تُعطى لطفل بمرض نقص المناعة (ابيضاض الدم) أو يتلقّى علاجًا مثبّطًا للمناعة.

5. The DTAP vaccine not given to a child who has a progressive and active central nervous system (CNS) problem.

لقاح DTaP لا يُعطى لطفل لديه مشكلة متقدّمة ونشطة في الجهاز العصبي المركزي.

However, a child with cerebral palsy can receive immunizations .

لكن الطفل المصاب بالشلل الدماغي يمكنه تلقّي اللقاحات.

6. Feverish child — طفل محموم

7. past history of intussusceptions — تاريخ سابق من الانغلاف المعوي

Side effects and checks — الأعراض والفحوص

Side Effects of Vaccines الأعراض الجانبية للقاحات	Nursing observation before giving the Vaccines ملاحظات الممرّض قبل إعطاء اللقاح
1. Fever 1. الحمّى	1. Is the child sick today? 1. هل الطفل مريض اليوم؟
2. Soreness 2. الألم	2. Does the child have allergies reaction before or after a vaccination? 2. هل لدى الطفل تفاعل تحسّسي قبل اللقاح أو بعده؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Side effects and checks (continued) **الأعراض والفحوص (تكملة)**

Side Effects of Vaccines الأعراض الجانبية للقاحات	Nursing observation before giving the Vaccines ملاحظات الممرّض قبل إعطاء اللقاح
3. Lump under the skin where the shot was given. 3. كتلة تحت الجلد مكان الحقنة.	3. Does the child have problem with immune system due to disease or medication? 3. هل لدى الطفل مشكلة في المناعة بسبب مرض أو دواء؟
4. Redness at the injection site 4. احمرار مكان الحقن	4. If the child gotten a transfusion, or any other blood product, recently? 4. هل تلقّى الطفل مؤخرًا نقل دم أو أي منتج دموي آخر؟
	5. Does the child have problem with nervous system such as convulsions? 5. هل لدى الطفل مشكلة في الجهاز العصبي مثل التشنّجات؟

EN

Nursing care before giving immunization

AR

الرعاية التمريضية قبل إعطاء التلقيح

1. Hand washing. — غسل اليدين.
2. Check vital signs — فحص العلامات الحيوية
3. Address Gloves. — ارتداء القفّازات.
4. Proper equipment and 1means of needle disposal.

   أدوات مناسبة ووسيلة للتخلّص من الإبر.

   1or 3 mL syringe with 22-25 g needle. — محقنة 1 أو 3 مل بإبرة قياس 22–25.
5. Needle safety device. — أداة أمان الإبرة.
6. Check expiration date. — فحص تاريخ الانتهاء.
7. Document lot number on chart nursing consideration during immunization asks about previous reaction to immunization.

   توثيق رقم التشغيلة في الملف؛ ومن الاعتبارات التمريضية أثناء التلقيح السؤال عن تفاعل سابق للقاح.
8. Use caution in pregnancy. — الحذر في الحمل.
9. Defer administration in case of acute infection.

   تأجيل الإعطاء عند وجود عدوى حادّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

Nursing care before giving immunization (continued)

AR

الرعاية التمريضية قبل إعطاء التلقيح (تكملة)

10 Provide comfort measures to help the patient cope with the discomforts of the injection: analgesics.

توفير وسائل الراحة لمساعدة المريض على تحمّل انزعاج الحقنة: المسكّنات.

11 Provide patient with written record of immunization and timing for booster immunization

إعطاء المريض سجلًّا مكتوبًا بالتلقيح وموعد الجرعة المنشّطة

12 Following administration of vaccines, nurses should strongly consider observing patients for **syncope and other immediate allergic reactions for a period of 15-20 minutes**.

بعد إعطاء اللقاح يجب على الممرّضين بقوّة مراقبة المرضى **للإغماء والتفاعلات التحسّسية الفورية مدّة 15–20 دقيقة.**

13 Another key aspect of safety is proper storage, handling, and administration of vaccines.

ومن جوانب السلامة المهمّة أيضًا الخزن والتداول والإعطاء الصحيح للقاحات.

Storage temperatures and expiration dates.

ودرجات حرارة الخزن وتواريخ الانتهاء.

14 Screening all vaccine recipients for contraindications and precautions prior to administering immunizations.

وفحص كل متلقّي اللقاح للموانع والاحتياطات قبل إعطاء اللقاح.




Figure 2. Nursing Responsibilities: review the schedule, storage and handling, action, routes/doses/sites/technique, aspirate with each injection, multiple injections in separate sites

الشكل 2. مسؤوليات الممرّض: مراجعة الجدول، والخزن والتداول، وعمل اللقاح، والطرق والجرعات والمواقع والتقنية، والسحب مع كل حقنة، والحقن المتعدّدة في مواقع منفصلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Label in the figure التسمية في الشكل	Arabic بالعربي
Review immunization schedule for updates	راجع جدول التلقيح للتحديثات
Know storing and handling requirements for all vaccines	اعرف متطلّبات خزن كل اللقاحات وتداولها
Know the action of the vaccine	اعرف عمل اللقاح
Know administration routes, dosages, sites and technique	اعرف طرق الإعطاء والجرعات والمواقع والتقنية
Aspirate with each injection	اسحب (تأكّد من عدم دخول وعاء) مع كل حقنة
May have multiple injections on same day, just be sure to give in separate sites	قد تُعطى حقن متعدّدة في اليوم نفسه، بشرط إعطائها في مواقع منفصلة

In short باختصار

Mild illness/low fever is **not** a contraindication; moderate–severe illness, anaphylaxis, immunodeficiency (no live vaccines) are.

المرض الخفيف/الحمّى البسيطة **ليست** مانعًا؛ أمّا المرض المتوسط–الشديد والصدمة التأقية ونقص المناعة (لا لقاحات حيّة) فموانع.

Side effects: **fever, soreness, lump, redness**.

الأعراض: **الحمّى، والألم، والكتلة، والاحمرار**.

Watch **15–20 min** after the vaccine for syncope/allergy.

راقب **15–20 دقيقة** بعد اللقاح للإغماء/التحسّس.

14 Polio, BCG and hepatitis B vaccines — لقاحات شلل الأطفال وBCG والتهاب الكبد B

Three vaccines ثلاثة لقاحات

Disease المرض	Vaccine facts معلومات اللقاح
Poliomyelitis (Virus) **شلل الأطفال** (فيروس)	Polio vaccine (oral, injectable) • Orally 2 drops (special technique) • Keep in temperature (2–8) c لقاح شلل الأطفال (فموي، محقون) • قطرتان بالفم (تقنية خاصّة) • يُحفظ بدرجة (2–8) مئوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Three vaccines (continued) **ثلاثة لقاحات (تكملة)**

Disease المرض	Vaccine facts معلومات اللقاح
Tuberculosis (Bacteria) **التدرّن** (بكتيريا)	BCG vaccine (Bacillus–Calmette–Guirine) • Intradermal (0.05 cc) in left upper arm • Used the soluble vaccine until 6 hr • develop a raised bubble at the site of the injection; About 2 to 6 weeks a small spot may appear, then turn into a blister, which sometimes oozes before becoming a crusty scab • If no (red swollen) after (8–12 weeks) revaccination • keep in temperature (2–8) c لقاح BCG • داخل الأدمة (0.05 سم^3) في أعلى الذراع الأيسر • يُستعمل اللقاح المحلول خلال 6 ساعات • تتكوّن فقاعة مرتفعة مكان الحقن، وبعد 2–6 أسابيع قد تظهر بقعة صغيرة تتحوّل إلى بثرة تنزّ أحيانًا ثم تصبح قشرة • إذا لم يظهر (احمرار وانتفاخ) بعد 8–12 أسبوعًا يُعاد اللقاح • يُحفظ بدرجة (2–8) مئوية
Hepatitis B virus (Virus) **التهاب الكبد B** (فيروس)	Intramuscular in right upper thigh deeply (0.5 cc) • Given after 24 hr of delivery • Delay vaccine if newborn less (2 kg) or premature given after 1 month • Keep at (2–8) c عضليًا عميقًا في أعلى الفخذ الأيمن (0.5 سم^3) • يُعطى خلال 24 ساعة من الولادة • يؤجَّل إذا كان الوليد أقل من 2 كغم أو خديجًا ويُعطى بعد شهر • يُحفظ بدرجة (2–8) مئوية



Figure 3. Oral polio vaccine: 2 drops

الشكل 3. لقاح شلل الأطفال الفموي: قطرتان




Figure 4. Hepatitis B vaccine: IM, right upper thigh

الشكل 4. لقاح التهاب الكبد B: عضلي في أعلى الفخذ الأيمن




Figure 5. BCG vaccine: intradermal in the left upper arm and the site reaction

الشكل 5. لقاح BCG: داخل الأدمة في أعلى الذراع الأيسر وتفاعل مكان الحقن

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"Guirine" is **Guérin** (Bacillus Calmette–Guérin); "Given after 24 hr" means within the first 24 hours, as in the schedule.

"Guirine" هي **Guérin** (عصيّة كالميت–غيران)؛ و"Given after 24 hr" المقصود خلال أول 24 ساعة كما في الجدول.

In short باختصار

All three are kept at **2–8 °C**.

الثلاثة تُحفظ بدرجة **2–8 مئوية**.

Polio: **2 oral drops**; BCG: **0.05 cc intradermal, left arm**; HBV: **0.5 cc IM, right thigh**.

شلل الأطفال: **قطرتان بالفم**؛ و**0.05** :BCG **سم³ داخل الأدمة بالذراع الأيسر**؛ و**0.5** :HBV **سم³ عضلي بالفخذ الأيمن**.

No BCG reaction after **8–12 weeks** → revaccinate.

لا تفاعل لـBCG بعد **8–12 أسبوعًا** ← يُعاد اللقاح.

15 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Infant mortality rate	معدّل وفيات الرضّع
Morbidity	المراضة / معدّل الإصابة بالمرض
Gestational age	عمر الحمل
Sudden infant death syndrome	متلازمة موت الرضيع المفاجئ / موت المهد
Respiratory Distress Syndrome	متلازمة الضائقة التنفسية
Ambulatory setting	البيئة الخارجية / الرعاية الإسعافية غير المقيمة
Advocate	مدافع / مناصر
Family centered care	الرعاية المتمركزة حول العائلة
Atraumatic care	الرعاية اللاصدمية / الرعاية بلا ألم
Case management	إدارة الحالة
Cost containment	احتواء التكاليف
Bioethics	أخلاقيات علم الأحياء / الأخلاقيات الحيوية
Beneficence	الإحسان / فعل الخير
Egocentric	متمركز حول الذات
Immunization / Vaccination	التمنيع / التلقيح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Attenuated	موهَن / مضعَّف
Toxoid	ذوفان / سمّ معطّل
Antitoxin	مضاد السم / الترياق
Immune globulin (IG / IVIG)	الغلوبولين المناعي (الوريدي)
Conjugate vaccine	لقاح مقترن
Pentavalent vaccine	اللقاح الخماسي
Intussusception	الانغلاف المعوي / انغلاف الأمعاء
Anaphylaxis	الصدمة التأقية / التحسّس المفرط
Syncope	الإغماء

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LEC 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Statistics and causes — الإحصاءات والأسباب

Q1 EN **Birth rate is the number of live births per:**

AR س1. معدّل الولادات هو عدد الولادات الحيّة لكل:

- A. 100 population per year — 100 من السكان سنويًا
- B. 1000 live births — 1000 ولادة حيّة
- C. 1000 population per year — 1000 من السكان سنويًا
- D. 10,000 women — 10,000 امرأة

Q2 EN **Infant mortality rate counts deaths during:**

AR س2. يحسب معدّل وفيات الرضّع الوفيات خلال:

- A. Pregnancy — الحمل
- B. The first week — الأسبوع الأول
- C. The first 5 years — أول 5 سنوات
- D. The first 12 months of extra uterine life — أول 12 شهرًا من الحياة خارج الرحم

Q3 EN **Which is NOT a factor affecting infant mortality rate in the lecture?**

AR س3. أي مما يأتي ليس من العوامل المؤثّرة في وفيات الرضّع في المحاضرة؟

- A. Birth weight — وزن الولادة
- B. Father's height — طول الأب
- C. Maternal age — عمر الأم
- D. Low maternal education — انخفاض تعليم الأم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The leading cause of death among infants is:** Q4

AR س4. السبب الأول لوفاة الرضّع:

A Pneumonia & other respiratory disorders (39.7%) ذات الرئة واضطرابات تنفسية أخرى (39.7%)

B Sudden infant death موت الرضيع المفاجئ

C Diarrhea الإسهال

D Congenital malformation التشوّهات الخلقية

EN **The second leading cause of death in children 1-4 years is:** Q5

AR س5. السبب الثاني لوفاة الأطفال بعمر 1–4 سنوات:

A Malnutrition سوء التغذية

B Transport accidents حوادث النقل

C Infectious disease الأمراض المعدية

D Prematurity الخداج

EN **An illness that runs its course regardless of drug intervention is:** Q6

AR س6. المرض الذي يأخذ مساره بغضّ النظر عن التدخّل الدوائي:

A Chronic مزمن

B Disability إعاقة

C Acute حادّ

D Congenital خلقي

Pediatric nursing, roles and trends — تمريض الأطفال والأدوار والاتجاهات

EN **Pediatric nursing covers children from:** Q7

AR س7. يشمل تمريض الأطفال الأطفال من:

A Birth through adolescent الولادة حتى المراهقة

B 1 to 12 years 1 إلى 12 سنة

C Birth to 5 years الولادة إلى 5 سنوات

D School age only سنّ المدرسة فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A school or physician's clinic is an example of:** Q8

AR س8. المدرسة أو عيادة الطبيب مثال على:

A Institutional setting بيئة مؤسّسية
B Tertiary hospital مستشفى ثالثي
C Intensive care عناية مركّزة
D Ambulatory setting بيئة خارجية

EN **The first quality of a good pediatric nurse in the lecture is:** Q9

AR س9. أوّل صفة لممرّض الأطفال الجيد في المحاضرة:

A Fast سريع
B Researcher باحث
C Strict صارم
D Good observer ملاحظ جيد

EN **Dealing with the child's disabilities belongs to the:** Q10

AR س10. التعامل مع إعاقات الطفل يتبع:

A Primary level المستوى الأولي
B Secondary level المستوى الثانوي
C Tertiary level المستوى الثالثي
D No level لا مستوى

EN **Health education and immunization belong to the:** Q11

AR س11. التثقيف الصحي والتلقيح يتبعان:

A Primary level المستوى الأولي
B Secondary level المستوى الثانوي
C Tertiary level المستوى الثالثي
D Rehabilitation التأهيل

EN **A system in which one nurse manages the care of one child for 24 hours is:** Q12

AR س12. النظام الذي يدير فيه ممرّض واحد رعاية طفل واحد 24 ساعة:

A Case management إدارة الحالة
B Primary nursing التمريض الأولي
C Family centered care الرعاية المتمركزة حول العائلة
D Cost containment احتواء التكاليف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Atraumatic care aims to:** Q13

AR س13. تهدف الرعاية اللاصدمية إلى:

A Replace the family — استبدال العائلة

B Cut nursing positions — تقليص الوظائف التمريضية

C Increase cost — زيادة الكلفة

D Reduce mental and physical harm — تقليل الأذى النفسي والجسدي

EN **Case management focuses on:** Q14

AR س14. تركّز إدارة الحالة على:

A Only cost — الكلفة فقط

B Only research — البحث فقط

C Both quality and cost outcome — الجودة والكلفة معًا

D Only education — التثقيف فقط

EN **Which is NOT a general ethical principle in the lecture?** Q15

AR س15. أي مما يأتي ليس من المبادئ الأخلاقية العامة في المحاضرة؟

A Profit — الربح

B Confidentiality — السرّية

C Autonomy — الاستقلالية

D Beneficence — الإحسان

Communication — التواصل

EN **Communication is described as a:** Q16

AR س16. يوصف التواصل بأنه:

A One-way process — عملية باتّجاه واحد

B Two-way process — عملية باتّجاهين

C Verbal process only — عملية لفظية فقط

D Written process only — عملية مكتوبة فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **"Body language" is:** Q17

AR س17. "لغة الجسد" هي:

A	Verbal communication التواصل اللفظي	B	Nonverbal communication التواصل غير اللفظي
C	Written communication التواصل المكتوب	D	A barrier معوّق

EN **Infants primarily communicate:** Q18

AR س18. يتواصل الرضّع أساسًا:

A	With words بالكلمات	B	In writing بالكتابة
C	Nonverbally بشكل غير لفظي	D	By reasoning بالتفسير

EN **Children younger than 5 years are described as:** Q19

AR س19. يوصف الأطفال دون 5 سنوات بأنهم:

A	Logical منطقيون	B	Independent مستقلّون
C	Private يحتاجون خصوصية	D	Egocentric متمركزون حول ذواتهم

EN **With adolescents, the key communication skill is:** Q20

AR س20. مع المراهقين، مهارة التواصل الأساسية:

A	The art of listening فنّ الإصغاء	B	Drawing الرسم
C	Dolls الدمى	D	Play اللعب

EN **The key to successful communication is:** Q21

AR س21. مفتاح التواصل الناجح:

A	Effective listening الإصغاء الفعّال	B	Talking fast الكلام السريع
C	Broad smiles الابتسامات العريضة	D	Extended eye contact التحديق الطويل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The universal language of children is:** Q22

AR س22. اللغة العالمية للأطفال:

A Writing الكتابة
B Play اللعب
C Reading القراءة
D Silence الصمت

EN **When communicating with a child, the nurse should:** Q23

AR س23. عند التواصل مع الطفل يجب على الممرّض:

A Stand above the child الوقوف فوق الطفل
B Offer a choice even when none exists تقديم خيار حتى إن لم يوجد
C Assume a position at eye level with the child اتّخاذ وضعية بمستوى عين الطفل
D Avoid the parents تجنّب الوالدين

Immunity and vaccines المناعة واللقاحات

EN **Infants are susceptible to infections because their immune systems are:** Q24

AR س24. الرضّع معرّضون للعدوى لأن أجهزتهم المناعية:

A Overactive مفرطة النشاط
B Absent غائبة
C Mature ناضجة
D Immature غير ناضجة

EN **The antibody that crosses the placenta is:** Q25

AR س25. الضد الذي يعبر المشيمة:

A IgE
B IgM
C IgA
D Immunoglobulin G الغلوبولين المناعي G

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Vaccination produces which type of immunity?** Q26

AR س26. ينتج التلقيح أي نوع من المناعة؟

A Artificially acquired active — فاعلة مكتسبة صناعيًا

B Naturally acquired passive — منفعلة مكتسبة طبيعيًا

C Artificially acquired passive — منفعلة مكتسبة صناعيًا

D Innate — فطرية

EN **Injection of a specific immunoglobulin gives:** Q27

AR س27. حقن غلوبولين مناعي نوعي يعطي:

A Naturally acquired active immunity — مناعة فاعلة مكتسبة طبيعيًا

B Innate immunity — مناعة فطرية

C Artificially acquired passive immunity — مناعة منفعلة مكتسبة صناعيًا

D Artificially acquired active immunity — مناعة فاعلة مكتسبة صناعيًا

EN **A toxoid is:** Q28

AR س28. الذوفان هو:

A A live virus — فيروس حي

B A bacterial toxin made nontoxic that still stimulates antitoxin
سمّ بكتيري جُعل غير سام ويحفّز مضاد السم

C A blood product — منتج دموي

D An antibody — ضد

EN **MMR is an example of a:** Q29

AR س29. لقاح MMR مثال على لقاح:

A Toxoid — ذوفان

B Killed vaccine — مقتول

C Live attenuated vaccine — حي موهَن

D Conjugate vaccine — مقترن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **HIB is an example of a:** Q30

AR س30. HIB مثال على لقاح:

A	Toxoid vaccine ذوفان	B	Conjugate vaccine مقترن
C	Live attenuated vaccine حي موهَن	D	Killed vaccine مقتول

EN **In the Iraqi schedule, the vaccine given in the first 24 hours is:** Q31

AR س31. في جدول العراق، اللقاح الذي يُعطى في أول 24 ساعة:

A	BCG	B	MMR
C	Measles الحصبة	D	Hepatitis B (HBV) التهاب الكبد B (HBV)

EN **BCG is given by the route:** Q32

AR س32. يُعطى لقاح BCG بطريق:

A	Intradermal داخل الأدمة	B	IM عضلي
C	S.C تحت الجلد	D	Oral فموي

EN **Measles vaccine is given at the age of:** Q33

AR س33. يُعطى لقاح الحصبة بعمر:

A	2 months شهرين	B	9 months 9 أشهر
C	Birth الولادة	D	6 months 6 أشهر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT a contraindication to vaccination?** Q34

AR س34. أي مما يأتي ليس مانعًا للتلقيح؟

A History of anaphylaxis to the vaccine — تاريخ صدمة تأقية من اللقاح

B Past history of intussusception — تاريخ انغلاف معوي

C Immunodeficiency for live vaccines — نقص المناعة للقاحات الحيّة

D Mild illness with low-grade fever — مرض خفيف بحمّى بسيطة

EN **After vaccination, patients should be observed for allergic reactions for:** Q35

AR س35. بعد التلقيح يُراقب المرضى للتفاعلات التحسّسية مدّة:

A 15-20 minutes — 15–20 دقيقة

B 2 hours — ساعتين

C 1-2 minutes — 1–2 دقيقة

D 24 hours — 24 ساعة

EN **Hepatitis B vaccine for the newborn is given:** Q36

AR س36. يُعطى لقاح التهاب الكبد B للوليد:

A Orally 2 drops — قطرتين بالفم

B Intradermal in the left arm — داخل الأدمة بالذراع الأيسر

C IM deeply in the right upper thigh (0.5 cc) — عضليًا عميقًا في أعلى الفخذ الأيمن (0.5 سم³)

D Subcutaneous in the abdomen — تحت الجلد في البطن

EN **Vaccines in the lecture are stored at:** Q37

AR س37. تُخزن اللقاحات في المحاضرة بدرجة:

A 2–8 °C — 2–8 مئوية

B −20 °C — 20− مئوية

C Room temperature — حرارة الغرفة


D 37 °C — 37 مئوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions — أسئلة الصور

EN **In this figure, maternal antibodies are an example of:** Q38

AR س38. في هذا الشكل، أضداد الأم مثال على:



A Natural active immunity — مناعة فاعلة طبيعية

B Artificial passive immunity — مناعة منفعلة صناعية

C Artificial active immunity — مناعة فاعلة صناعية

D Natural passive immunity — مناعة منفعلة طبيعية

EN **This vaccine given as 2 oral drops protects against:** Q39

AR س39. هذا اللقاح الذي يُعطى قطرتين بالفم يحمي من:



A Tuberculosis — التدرّن

B Poliomyelitis — شلل الأطفال

C Hepatitis B — التهاب الكبد B

D Measles — الحصبة

2 True / False — صح أو خطأ

EN Infant mortality rate is the number of deaths per 1000 live births in the first 12 months. 1

AR معدّل وفيات الرضّع هو عدد الوفيات لكل 1000 ولادة حيّة في أول 12 شهرًا.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Chronic illnesses usually resolve spontaneously.
AR الأمراض المزمنة تزول عادةً تلقائيًا.
True · صح False · خطأ

3
EN Hospitals are ambulatory settings.
AR المستشفيات بيئات خارجية.
True · صح False · خطأ

4
EN The family is the ultimate coordinator of its own care.
AR العائلة هي المنسّق النهائي لرعايتها.
True · صح False · خطأ

5
EN Infants primarily use nonverbal communication.
AR يستعمل الرضّع أساسًا التواصل غير اللفظي.
True · صح False · خطأ

6
EN Older children need privacy.
AR الأطفال الأكبر يحتاجون خصوصية.
True · صح False · خطأ

7
EN Naturally acquired passive immunity lasts many years.
AR المناعة المنفعلة المكتسبة طبيعيًا تدوم سنوات كثيرة.
True · صح False · خطأ

8
EN An antitoxin confers passive immunity.
AR يعطي مضاد السم مناعة منفعلة.
True · صح False · خطأ

9
EN IPV is a live attenuated vaccine.
AR IPV لقاح حي موهَن.
True · صح False · خطأ

10
EN Live vaccines should not be given to children receiving immunosuppressive therapy.
AR لا تُعطى اللقاحات الحيّة لأطفال يتلقّون علاجًا مثبّطًا للمناعة.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN A child with cerebral palsy cannot receive immunizations.

AR لا يمكن للطفل المصاب بالشلل الدماغي تلقّي اللقاحات. خطأ · False صح · True

12 EN BCG is given intradermally in the left upper arm.

AR يُعطى BCG داخل الأدمة في أعلى الذراع الأيسر. خطأ · False صح · True

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Active vs passive immunity

AR الفاعلة مقابل المنفعلة

2 EN Three levels of care

AR مستويات الرعاية الثلاثة

3 EN Primary nursing vs primary level

AR التمريض الأولي مقابل المستوى الأولي

4 EN Routes of the vaccines

AR طرق إعطاء اللقاحات

5 EN Mild fever is not a contraindication

AR الحمّى البسيطة ليست مانعًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Why is information on mortality and morbidity important for nurses?

AR لماذا تهمّ معلومات الوفيات والمراضة الممرّضين؟

2 EN List the roles and the qualities of a good pediatric nurse.

AR عدّد أدوار ممرّض الأطفال وصفاته الجيدة.

3 EN List the current trends in pediatric nursing and the factors influencing them.

AR عدّد الاتجاهات الحالية في تمريض الأطفال والعوامل المؤثّرة فيها.

4 EN Explain communication according to the developmental stage.

AR اشرح التواصل بحسب مرحلة التطوّر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the five methods of obtaining immune protection. 5

AR صف الطرق الخمس للحصول على الحماية المناعية.

EN List the contraindications of vaccines and the nursing observations before giving them. 6

AR عدّد موانع اللقاحات وملاحظات الممرّض قبل إعطائها.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 D	3 B	4 A	5 B	6 C	7 A	8 D
9 D	10 C	11 A	12 B	13 D	14 C	15 A	16 B
17 B	18 C	19 D	20 A	21 A	22 B	23 C	24 D
25 D	26 A	27 C	28 B	29 C	30 B	31 D	32 A
33 B	34 D	35 A	36 C	37 A	38 D	39 B	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1 EN **Active vs passive immunity**

Active: the body makes its own antibodies (infection, vaccine) and lasts long. Passive: ready antibodies (maternal IgG, breast milk, immune globulin) and lasts weeks to months.

AR **الفاعلة مقابل المنفعلة**

الفاعلة: الجسم يصنع أضداده (عدوى، لقاح) وتدوم طويلًا. المنفعلة: أضداد جاهزة (IgG الأم، الحليب، الغلوبولين المناعي) وتدوم أسابيع إلى أشهر.

2 EN **Three levels of care**

Primary = prevention/education; secondary = treatment by the nursing process; tertiary = disabilities.

AR **مستويات الرعاية الثلاثة**

الأولي = الوقاية/التثقيف؛ الثانوي = العلاج بالعملية التمريضية؛ الثالثي = الإعاقات.

3 EN **Primary nursing vs primary level**

Primary nursing = one nurse manages one child 24 h (a trend). Primary level = prevention (a goal).

AR **التمريض الأولي مقابل المستوى الأولي**

التمريض الأولي = ممرّض واحد يدير طفلًا 24 ساعة (اتجاه). المستوى الأولي = الوقاية (هدف).

4 EN **Routes of the vaccines**

HBV, pentavalent, pneumococcal, IPV: IM; BCG: intradermal; measles, MMR: S.C; OPV, rota, vit A: oral.

AR **طرق إعطاء اللقاحات**

HBV والخماسي والمكوّرات الرئوية وIPV: عضلي؛ BCG: داخل الأدمة؛ الحصبة وMMR: تحت الجلد؛ OPV والروتا وفيتامين A: فموي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **Mild fever is not a contraindication**

Mild illness/low-grade fever: give the vaccine. Moderate–severe illness, anaphylaxis history, immunodeficiency (live vaccines), active CNS problem (DTaP): withhold or delay.

AR **الحمّى البسيطة ليست مانعًا**

المرض الخفيف/الحمّى البسيطة: يُعطى اللقاح. المرض المتوسط–الشديد، وتاريخ الصدمة التأقية، ونقص المناعة (اللقاحات الحيّة)، ومشكلة الجهاز العصبي النشطة (DTaP): يُحجب أو يؤجَّل.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Why is information on mortality and morbidity important for nurses?**

It provides a rationale for planning and delivering care, and gives information about the causes of death and illness, high-risk age groups, advances in treatment and prevention, and specific areas of health counseling.

AR **لماذا تهمّ معلومات الوفيات والمراضة الممرّضين؟**

لأنها تقدّم أساسًا لتخطيط الرعاية وتقديمها، وتعطي معلومات عن أسباب الوفاة والمرض، والفئات العمرية الأكثر خطورة، والتطوّرات في العلاج والوقاية، ومجالات الإرشاد الصحي.

2

EN **List the roles and the qualities of a good pediatric nurse.**

Roles: direct care, educator, counselor, consultant, advocate, care coordinator/health systems manager, researcher. Qualities: good observer, honest, sympathetic/kind/patient/cheerful, loves children, interested in family care, able to teach children and families.

AR **عدّد أدوار ممرّض الأطفال وصفاته الجيدة.**

الأدوار: الرعاية المباشرة، والتثقيف، والإرشاد، والاستشارة، والدفاع، والتنسيق/إدارة الأنظمة الصحية، والبحث. الصفات: ملاحظ جيد، وصادق، ومتعاطف ولطيف وصبور ومبتهج، ويحبّ الأطفال، ومهتمّ برعاية العائلة، وقادر على التعليم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **List the current trends in pediatric nursing and the factors influencing them.**

Family centered care, high technology care, primary nursing, case management, cost containment, atraumatic care, nursing process application. Factors: changing needs of society, medical and technological advances, political interests, increased public awareness.

AR **عدّد الاتجاهات الحالية في تمريض الأطفال والعوامل المؤثّرة فيها.**

الرعاية المتمركزة حول العائلة، والرعاية عالية التقنية، والتمريض الأولي، وإدارة الحالة، واحتواء التكاليف، والرعاية اللاصدمية، وتطبيق العملية التمريضية. العوامل: تغيّر احتياجات المجتمع، والتقدّم الطبي والتقني، والمصالح السياسية، وزيادة الوعي العام.

4

EN **Explain communication according to the developmental stage.**

Infancy: nonverbal. Early childhood (<5 y): egocentric, use their hands to communicate. School age: want explanations and reasons. Adolescence: the art of listening.

AR **اشرح التواصل بحسب مرحلة التطوّر.**

الرضاعة: غير لفظي. الطفولة المبكرة (دون 5 سنوات): متمركزون حول ذواتهم ويستعملون أيديهم. سنّ المدرسة: يريدون تفسيرات وأسبابًا. المراهقة: فنّ الإصغاء.

5

EN **Describe the five methods of obtaining immune protection.**

Innate (nonspecific, e.g. phagocytosis); naturally acquired active (infection, lasts years); naturally acquired passive (maternal IgG across the placenta and breast milk, weeks to 2 months); artificially acquired active (vaccine or toxoid); artificially acquired passive (specific immunoglobulin).

AR **صف الطرق الخمس للحصول على الحماية المناعية.**

الفطرية (غير نوعية، مثل البلعمة)؛ الفاعلة المكتسبة طبيعيًا (العدوى، تدوم سنوات)؛ المنفعلة المكتسبة طبيعيًا (IgG الأم عبر المشيمة والحليب، أسابيع إلى شهرين)؛ الفاعلة المكتسبة صناعيًا (لقاح أو ذوفان)؛ المنفعلة المكتسبة صناعيًا (غلوبولين مناعي نوعي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the contraindications of vaccines and the nursing observations before giving them.** 6

Moderate–severe illness or anaphylaxis to a vaccine; live vaccines in immunodeficiency/immunosuppression; DTaP with active CNS problem; feverish child; past intussusception. Ask: is the child sick today, any allergy to vaccines, immune problems, recent blood products, nervous system problems such as convulsions.

AR **عدّد موانع اللقاحات وملاحظات الممرّض قبل إعطائها.**

المرض المتوسط–الشديد أو الصدمة التأقية من لقاح؛ اللقاحات الحيّة في نقص المناعة أو تثبيطها؛ DTaP مع مشكلة نشطة في الجهاز العصبي؛ الطفل المحموم؛ تاريخ الانغلاف. واسأل: هل الطفل مريض اليوم، وهل لديه تحسّس من اللقاحات، أو مشكلة مناعية، أو نقل دم حديث، أو مشكلة عصبية كالتشنّجات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t