




Pathology علم الأمراض

المحاضرة 3 • 3 LECTURE 3

التهاب القصبات المزمن والربو — بنك الأسئلة

Chronic Bronchitis & Asthma — Exam & Questions

نظري • Theory

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. حامد خليل التميمي

LEC
3

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Chronic bronchitis

التهاب القصبات المزمن

EN Some studies indicate that chronic bronchitis affects what percentage of men aged 40–65 years? Q1

س1. تشير بعض الدراسات إلى أن التهاب القصبات المزمن يصيب أي نسبة من الرجال بعمر 40 إلى 65 سنة؟ AR

- | | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| A 5% to 10% | 5% إلى 10% | B 20% to 25% | 20% إلى 25% |
| C 40% to 50% | 40% إلى 50% | D 60% to 65% | 60% إلى 65% |

EN The distinctive feature of chronic bronchitis is: Q2

س2. السمة المميزة لالتهاب القصبات المزمن هي: AR

- | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| A Hypersecretion of mucus | فرط إفراز المخاط | B Destruction of alveolar walls | تخرّب جدران الأسناخ |
| C Eosinophilic infiltration | ارتشاح الحمضات | D Loss of lung volume | فقدان حجم الرئة |

EN Mucus hypersecretion in chronic bronchitis begins in the: Q3

س3. يبدأ فرط إفراز المخاط في التهاب القصبات المزمن في: AR

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| A Alveoli | الأسناخ | B Terminal bronchioles | القصيبات الانتهاية |
| C Large airways | المجري الهوائية الكبيرة | D Pleura | الجنبنة |

EN The single most important cause of chronic bronchitis is:

Q4

س4. السبب الأهم منفرداً لالتهاب القصبات المزمن هو:

AR

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| A Sulfur dioxide | ثاني أوكسيد الكبريت | B Viral infection | العدوى الفيروسية |
| C Nitrogen dioxide | ثاني أوكسيد النيتروجين | D Cigarette smoking | تدخين السجائر |

EN Environmental irritants induce hypertrophy of mucous glands in the:

Q5

س5. تُحدث المهيجات البيئية تضخم الغدد المخاطية في:

AR

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| A Trachea and main bronchi | الرغامى والقصبات الرئيسة |
| B Alveolar ducts | القنوات السنخية |
| C Pleural cavity | التجويف الجنبي |
| D Pulmonary arteries | الشرايين الرئوية |

EN The inflammation in chronic bronchitis includes infiltration of all EXCEPT:

Q6

س6. يشمل الالتهاب في التهاب القصبات المزمن ارتشاح كل مما يأتي عدا:

AR

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| A CD8+ lymphocytes | الخلايا اللمفاوية +CD8 | B Macrophages | البلاعم |
| C Platelets | الصفائح | D Neutrophils | العدلات |

EN The morphologic basis of airflow obstruction in chronic bronchitis is:

Q7

س7. الأساس الشكلي لانسداد جريان الهواء في التهاب القصبات المزمن هو:

AR

- | | |
|--|--|
| A Large bronchial involvement only | إصابة القصبات الكبيرة فقط |
| B Small airway disease and coexistent emphysema | مرض المجاري الهوائية الصغيرة والنفاخ المرافق |
| C Pleural effusion | الانصباب الجنبي |
| D Surfactant deficiency | نقص المادة الفاعلة بالسطح |

EN Complete obliteration of the lumen as a consequence of fibrosis is called: Q8

AR س8. يُسمّى الانسداد التام للمعة نتيجة التليف:

- (A) Bronchiectasis توسّع القصبات
(B) Atelectasis انخماص الرئة
(C) Emphysema النفاخ
(D) Bronchiolitis obliterans التهاب القصيبات المسدّ

EN Luminal narrowing and airway obstruction in chronic bronchiolitis is caused by: Q9

AR س9. تضيق المعة وانسداد المجرى الهوائي في التهاب القصيبات المزمن سببهما:

- (A) Submucosal fibrosis التليف تحت المخاطي
(B) Smooth muscle atrophy ضمور العضلات الملساء
(C) Alveolar collapse انهيار الأسناخ
(D) Cartilage loss فقدان الغضروف

EN On histology, the diagnostic feature of chronic bronchitis in the trachea and larger bronchi is: Q10

AR س10. نسيجياً، السمة التشخيصية لالتهاب القصبات المزمن في الرغامى والقصبات الأكبر هي:

- (A) Squamous cell carcinoma سرطانة الخلايا الحشرية
(B) Hyaline membranes الأغشية الزجاجية
(C) Enlargement of the mucus-secreting glands تضخم الغدد المفرزة للمخاط
(D) Granulomas الأورام الحبيبية

EN The normal value of the Reid index is: Q11

AR س11. القيمة الطبيعية لمؤشر ريد هي:

- (A) 0.1
(B) 0.4
(C) 0.8
(D) 1.0

EN The Reid index is the ratio of the thickness of the:

Q12

س12. مؤشّر ريد هو نسبة سُمك:

AR

- | | |
|--|---|
| (A) Epithelium to the basement membrane | الظهارة إلى الغشاء القاعدي |
| (B) Cartilage to the bronchial wall | الغضروف إلى جدار القصبة |
| (C) Smooth muscle to the submucosa | العضلات الملساء إلى تحت المخاطية |
| (D) Submucosal gland layer to the bronchial wall | طبقة الغدد تحت المخاطية إلى جدار القصبة |

EN Chronic bronchitis is diagnosed clinically by persistent productive cough for at least:

Q13

س13. يُشخّص التهاب القصبات المزمن سريرياً بسعال منتج مستمر لمدة لا تقل عن:

AR

- | | |
|--|---|
| (A) 3 consecutive months in at least 2 consecutive years | 3 أشهر متتالية في سنتين متتاليتين على الأقل |
| (B) 2 consecutive months in 3 years | شهرين متتاليتين في 3 سنوات |
| (C) 6 months in 1 year | 6 أشهر في سنة واحدة |
| (D) 3 weeks | 3 أسابيع |

EN Chronic bronchitis patients with hypercapnia, hypoxemia and cyanosis are called:

Q14

س14. يُسمّى مرضى التهاب القصبات المزمن المصابون بفرط ثاني أكسيد الكربون ونقص الأكسجة والزرّاق:

AR

- | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| (A) Pink puffers | المنتفخون الورديون | (B) Blue bloaters | المنتفخون الزرق |
| (C) Atopics | التأبّيون | (D) Wheezers | الآزّازون |

EN In early stages of chronic bronchitis:

Q15

AR س15. في المراحل المبكرة من التهاب القصبات المزمن:

- (A) Airflow is severely obstructed يكون جريان الهواء مسدوداً بشدة
- (B) Cyanosis is constant يكون الزُّراق دائماً
- (C) Cough raises mucoid sputum but airflow is not obstructed يُخرج السعال قشعاً مخاطياً لكن جريان الهواء غير مسدود
- (D) Respiratory failure occurs يحدث الفشل التنفسي

Asthma

الربو

EN Asthma attacks occur particularly:

Q16

AR س16. تحدث نوبات الربو خصوصاً:

- (A) At noon ظهراً
- (B) After meals بعد الوجبات
- (C) In the afternoon بعد الظهر
- (D) At night and/or early in the morning ليلاً و/أو في الصباح الباكر

EN Airway obstruction in asthma is:

Q17

AR س17. انسداد المجاري الهوائية في الربو:

- (A) Intermittent and reversible متقطع وقابل للعكس
- (B) Permanent and irreversible دائم وغير قابل للعكس
- (C) Caused by fibrosis only سببه التليف فقط
- (D) Absent غائب

EN Chronic bronchial inflammation in asthma is characteristically with:

Q18

AR س18. الالتهاب القصبي المزمن في الربو يكون بشكل مميز مع:

- (A) Neutrophils only العدلات فقط
- (B) Eosinophils الحمضات
- (C) Plasma cells الخلايا البلازمية
- (D) Platelets الصفائح

EN The “hygiene hypothesis” proposes that:

Q19

AR س 19. تقترح «فرضية النظافة» أن:

- (A) Infections cause asthma العدوى تسبب الربو
- (B) Smoking prevents asthma التدخين يمنع الربو
- (C) Eradication of infections may alter immune homeostasis and promote allergy القضاء على العدوى قد يغير التوازن المناعي ويعزز الأرجية
- (D) Cold air cures asthma الهواء البارد يشفي الربو

EN Atopic asthma is suggested by:

Q20

AR س 20. يُستدل على الربو التأتبي بـ:

- (A) Evidence of allergen sensitization, history of allergic rhinitis or eczema دليل على التحسس لمستأرج، وتاريخ التهاب الأنف التحسسي أو الإكزيما
- (B) Absence of IgE غياب IgE
- (C) Heavy smoking only التدخين الشديد فقط
- (D) Old age كبر العمر

EN All of the following can trigger bronchospasm in asthma EXCEPT:

Q21

AR س 21. كل مما يأتي قد يُطلق التشنج القصبي في الربو عدا:

- (A) Viral respiratory infections عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية
- (B) Cold air الهواء البارد
- (C) Exercise التمارين
- (D) Surfactant المادة الفاعلة بالسطح

EN Which is NOT one of the inflammatory patterns of asthma?

Q22

AR س 22. أي مما يأتي ليس من الأنماط الالتهابية للربو؟

- (A) Eosinophilic الحمضي
- (B) Granulomatous الحبيبي
- (C) Neutrophilic العدلي
- (D) Pauci-granulocytic قليل الخلايا الحبيبة

EN The cells most critical to the pathogenesis of asthma are: Q23

س23. الخلايا الأكثر أهمية في إمراضية الربو هي: AR

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ☐ A CD8+ T cells | الخلايا التائية +CD8 | ☐ B TH1 cells | خلايا TH1 |
| ☐ C TH2 cells | خلايا TH2 | ☐ D NK cells | الخلايا القاتلة الطبيعية |

EN Which cytokine stimulates IgE production? Q24

س24. أي سيتوكين يحفز إنتاج IgE؟ AR

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ☐ A IL-4 | ☐ B IL-5 |
| ☐ C IL-2 | ☐ D IL-8 |

EN IL-5 in asthma: Q25

س25. دور IL-5 في الربو: AR

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ A Stimulates mucus production | يحفز إنتاج المخاط |
| ☐ B Activates eosinophils | ينشط الحمضات |
| ☐ C Coats mast cells | يغلف الخلايا البدينة |
| ☐ D Causes fibrosis | يسبب التليف |

EN Which cytokine stimulates mucus production and also promotes IgE production by B cells? Q26

س26. أي سيتوكين يحفز إنتاج المخاط ويعزز أيضًا إنتاج IgE بواسطة الخلايا البائية؟ AR

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ☐ A IL-4 | ☐ B IL-5 |
| ☐ C IL-1 | ☐ D IL-13 |

EN Bronchoconstriction in the early phase is triggered by direct stimulation of: Q27

س 27. يُطلق تضيق القصبات في الطور المبكر بالتحفيز المباشر لـ:

- (A) Sub-epithelial vagal receptors المستقبلات المبهمة تحت الظهارية
- (B) Type II pneumocytes الخلايا الرئوية من النوع الثاني
- (C) Alveolar macrophages البلاعم السنخية
- (D) Goblet cells الخلايا الكأسية

EN A susceptibility locus for asthma is on: Q28

س 28. يقع أحد مواقع الاستعداد للربو على:


- (A) Chromosome 7q الكروموسوم 7q
- (B) Chromosome 5q الكروموسوم 5q
- (C) Chromosome 21 الكروموسوم 21
- (D) The X chromosome الكروموسوم X

Picture questions

أسئلة الصور

EN In this figure, the Reid index is the ratio of: Q29

س 29. في هذا الشكل، مؤشر ريد هو نسبة:




- (A) A:B
- (B) B:A
- (C) Cartilage:mucosa الغضروف:المخاطية
- (D) Lumen:wall اللبنة:الجدار

EN The change marked in the chronic bronchitis section of this figure (right) is:

Q30

س30. التغير المؤثر في مقطع التهاب القصبات المزمن في هذا الشكل (يميناً) هو:

AR



A Squamous metaplasia and mucous gland hyperplasia

حوّل حشفي وفرط تنسج الغدد المخاطية

B Hyaline membrane

غشاء زجاجي

C Alveolar collapse

انهيار الأسناخ

D Granuloma


ورم حبيبي

EN The cell labelled “goblet cell” in this figure increases in chronic bronchitis and secretes:

Q31

س31. الخلية المؤشرة “goblet cell” في هذا الشكل تزداد في التهاب القصبات المزمن وتفرز:

AR



A Surfactant

المادة الفاعلة بالسطح

B IgE

C Histamine


الهستامين

D Mucin

الميسين (المخاط)

EN The right half of this figure (thickened basement membrane and smooth muscle, mucus in the lumen) represents: Q32

س32. النصف الأيمن من هذا الشكل (غشاء قاعدي وعضلات ملساء متشنجة، ومخاط في المهعة) يمثل: AR



A Normal bronchus

قصبه طبيعيه

B Emphysema

النفاخ

C Asthma


الربو

D Atelectasis

انخماص الرئة

EN In this figure, IgE bound to FcεRI coats which cell? Q33

س33. في هذا الشكل، يغلف IgE المرتبط بـ FcεRI أي خلية؟ AR



A Dendritic cell

الخلية المتغصنة

B Eosinophil

الحمضة

C Mast cell

الخلية البدنية

D Treg cell

الخلية التائية التنظيمية

2

True / False

صح أو خطأ

EN Chronic bronchitis is common among cigarette smokers and urban dwellers in smog-ridden cities. 1

AR التهاب القصبات المزمن شائع بين مدخني السجائر وسكان المدن الملوثة بالضباب الدخاني.

True • صح

False • خطأ

EN Mucus hypersecretion in chronic bronchitis begins in the small airways. 2

AR يبدأ فرط إفراز المخاط في التهاب القصبات المزمن في المجاري الهوائية الصغيرة.

True • صح

False • خطأ

EN Sulfur dioxide and nitrogen dioxide may contribute to chronic bronchitis. 3

AR قد يسهم ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين في التهاب القصبات المزمن.

True • صح

False • خطأ

EN Mucus hypersecretion is the morphologic basis of airflow obstruction in chronic bronchitis. 4

AR فرط إفراز المخاط هو الأساس الشكلي لانسداد جريان الهواء في التهاب القصبات المزمن.

True • صح

False • خطأ

EN The Reid index is normally 0.4. 5

AR القيمة الطبيعية لمؤشر ريد 0.4.

True • صح

False • خطأ

EN The diagnosis of chronic bronchitis is made on histologic grounds. 6

AR يُوضع تشخيص التهاب القصبات المزمن على أسس نسيجية.

True • صح

False • خطأ

EN Recurrent infections and respiratory failure are constant threats in chronic bronchitis. 7

AR العدوى المتكررة والفشل التنفسي تهديدان دائمان في التهاب القصبات المزمن.

True • صح

False • خطأ

EN Airway obstruction in asthma is permanent. 8

AR انسداد المجاري الهوائية في الربو دائم.

True • صح

False • خطأ

EN Bronchial smooth muscle hypertrophy is a hallmark of asthma. 9

AR تضخم العضلات الملساء القصية من السمات المميزة للربو.

True • صح

False • خطأ

EN The incidence of asthma in the Western world has decreased over the past four decades. 10

AR انخفض حدوث الربو في العالم الغربي خلال العقود الأربعة الماضية.

True • صح

False • خطأ

EN Episodes of bronchospasm can be triggered in both atopic and nonatopic asthma. 11

AR يمكن أن تُطلق نوبات التشنج القصبي في الربو التأتبي وغير التأتبي كليهما.

True • صح

False • خطأ

EN Classic atopic asthma is associated with an excessive TH1 reaction. 12

AR يرتبط الربو التأتبي التقليدي بتفاعل مفرط لخلايا TH1.

True • صح

False • خطأ

EN IL-5 activates eosinophils. 13

AR ينشط IL-5 الحمضات.

True • صح

False • خطأ

EN Asthma is a single-gene disorder. 14

AR الربو اضطراب أحادي الجين.

True • صح

False • خطأ

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Defining feature vs cause of obstruction in chronic bronchitis

1

AR السمة المحددة مقابل سبب الانسداد في التهاب القصبات المزمن

EN Inflammatory cells: chronic bronchitis vs asthma

2

AR الخلايا الالتهابية: التهاب القصبات المزمن مقابل الربو

EN What causes luminal narrowing in chronic bronchiolitis?

3

AR ما سبب تضيق اللمعة في التهاب القصبيات المزمن؟

EN Diagnosis of chronic bronchitis — clinical or histologic?

4

AR تشخيص التهاب القصبات المزمن — سريري أم نسيجي؟

EN IL-4 vs IL-5 vs IL-13

5

AR IL-4 مقابل IL-5 مقابل IL-13

EN TH1 or TH2 in atopic asthma?

6

AR TH1 أم TH2 في الربو التأتبي؟

EN Chromosome of the asthma susceptibility locus

7

AR كروموسوم موقع الاستعداد للربو

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Explain the pathogenesis of chronic bronchitis.

1

AR اشرح إمراضية التهاب القصبات المزمن.

AR

EN Describe the morphology of chronic bronchitis and define the Reid index.

2

AR صف شكلية التهاب القصبات المزمن وعرف مؤشر ريد.

AR

EN How is chronic bronchitis diagnosed? Mention its clinical course.

3

AR كيف يُشخّص التهاب القصبات المزمن؟ اذكر سيره السريري.

AR

EN Define asthma and list its hallmarks.

4

AR عرف الربو وعدّد سماته المميزة.

AR

EN What is the hygiene hypothesis?

5

ما فرضية النظافة؟

AR

EN Classify asthma.

6

صنّف الربو.

AR

EN Explain the role of TH2 cells and IgE in the pathogenesis of asthma.

7

اشرح دور خلايا TH2 و IgE في إمراضية الربو.

AR

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 A	3 C	4 D	5 A	6 C	7 B	8 D
9 A	10 C	11 B	12 D	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 A	21 D	22 B	23 C	24 A
25 B	26 D	27 A	28 B	29 B	30 A	31 D	32 C
33 C							

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 True

2 False

3 True

4 False

5 True

6 False

7 True

8 False

9 True

10 False

11 True

12 False

13 True

14 False

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN Mucus hypersecretion reflects large bronchial involvement; airflow obstruction results from small airway disease and coexistent emphysema. **1**

AR فرط إفراز المخاط يعكس إصابة القصبات الكبيرة؛ أما انسداد جريان الهواء فينتج عن مرض المجاري الصغيرة والنفاخ المرافق.

EN Chronic bronchitis: CD8+ lymphocytes, macrophages, neutrophils (largely mononuclear). Asthma: eosinophils are the hallmark. **2**

AR التهاب القصبات المزمن: لمفاويات CD8+ وبلاعم وعدلات (معظمها وحيدة النواة). الربو: الحمضات هي السمة المميزة.

EN Submucosal fibrosis — not the mucus itself. Complete obliteration = bronchiolitis obliterans. **3**

AR التليف تحت المخاطي — لا المخاط نفسه. والانسداد التام = التهاب القصبيات المسد.

EN Clinical: productive cough for at least 3 consecutive months in at least 2 consecutive years. The histologic diagnostic feature (gland enlargement, Reid index) belongs to morphology. **4**

AR سريري: سعال منتج 3 أشهر متتالية في سنتين متتاليتين على الأقل. أما السمة النسيجية (تضخم الغدد ومؤشر ريد) فتخص الشكليات.

EN IL-4: IgE production. IL-5: activates eosinophils. IL-13: mucus production and also promotes IgE by B cells. **5**

AR IL-4: إنتاج IgE. تنشيط الحمضات. IL-13: إنتاج المخاط ويعزز أيضاً IgE من الخلايا البائية.

EN TH2 — an excessive TH2 reaction against environmental antigens.

6

AR TH2 — تفاعل مفرط لخلايا TH2 ضد المستضدات البيئية.

EN Long arm of chromosome 5 (5q) — genes regulating IgE synthesis and mast cell and eosinophil growth and differentiation.

7

AR الذراع الطويلة للكروموسوم 5 (5q) — جينات تنظم تخليق IgE ونمو الخلايا البدنية والحمضات وتميزها.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Explain the pathogenesis of chronic bronchitis.

1

Irritants (mainly cigarette smoke; SO₂, NO₂) cause mucus hypersecretion beginning in large airways, hypertrophy of mucous glands in trachea and main bronchi, increased goblet cells in smaller bronchi and bronchioles, and inflammation with CD8+ lymphocytes, macrophages and neutrophils. Obstruction results from small airway disease and coexistent emphysema.

AR المهيّجات (أساساً دخان السجائر؛ وثاني أوكسيد الكبريت والنيروجين) تسبّب فرط إفراز المخاط بدءاً من المجاري الكبيرة، وتضخم الغدد المخاطية في الرغامى والقصبات الرئيسة، وزيادة الخلايا الكأسية في القصبات الأصغر والقصبيات، والتهاباً مع لمفاويات CD8+ وبلاعم وعدلات. وينتج الانسداد عن مرض المجاري الصغيرة والنفاخ المرافق.

EN Describe the morphology of chronic bronchitis and define the Reid index.

2

Grossly: hyperemic, edematous mucosa covered by mucinous or mucopurulent secretions. Histologically: enlargement of mucus-secreting glands. Reid index = thickness of submucosal gland layer / bronchial wall, normally 0.4 (increased in chronic bronchitis).

AR عياناً: مخاطية محتقنة متوذمة تغطيها إفرازات مخاطية أو مخاطية قيحية. نسيجياً: تضخم الغدد المفرزة للمخاط. مؤشر ريد = سُمك طبقة الغدد تحت المخاطية / سُمك جدار القصبة، طبيعياً 0.4 (ويرتفع في التهاب القصبات المزمن).

EN

How is chronic bronchitis diagnosed? Mention its clinical course.

3

Clinically: persistent productive cough for at least 3 consecutive months in at least 2 consecutive years. Early: mucoid sputum without obstruction; some have hyper-responsive airways; heavy smokers develop chronic outflow obstruction with emphysema, hypercapnia, hypoxemia and cyanosis (blue bloaters); recurrent infections and respiratory failure.

سريراً: سعال منتج مستمر 3 أشهر متتالية في سنتين متتاليتين على الأقل. مبكراً: قشع مخاطي دون انسداد؛ بعضهم لديه مجارٍ مفرطة الاستجابة؛ المدخنون بشراهة يصابون بانسداد مزمن مع نفّاخ وفرط CO₂ ونقص أكسجة وزُرّاق (المنتفخون الزرق)؛ وعدوى متكررة وفشل تنفسي.

AR

EN

Define asthma and list its hallmarks.

4

A chronic inflammatory disorder of the airways causing recurrent wheezing, breathlessness, chest tightness and cough, particularly at night/early morning. Hallmarks: intermittent reversible obstruction; chronic inflammation with eosinophils; smooth muscle hypertrophy; hyperreactivity and increased mucus.

اضطراب التهابي مزمن في المجاري الهوائية يسبب أزيزاً وضيق نفس وضيق صدر وسعالاً متكرراً، خصوصاً ليلاً/صباحاً. السمات: انسداد متقطع قابل للعكس؛ التهاب مزمن مع الحمضات؛ تضخم العضلات الملساء؛ فرط التفاعلية وزيادة المخاط.

AR

EN

What is the hygiene hypothesis?

5

Based on the rise of asthma in the Western world over four decades: eradication of infections may alter immune homeostasis and promote allergic and other harmful immune responses.

مبنية على ارتفاع الربو في العالم الغربي خلال أربعة عقود: القضاء على العدوى قد يغيّر التوازن المناعي ويعزز الاستجابات الأرجية والضارة الأخرى.

AR

EN

Classify asthma.

6

Atopic (allergen sensitization, history of allergic rhinitis, eczema) and nonatopic; by inflammatory pattern (eosinophilic, neutrophilic, mixed, pauci-granulocytic); or by the agents/events that trigger bronchoconstriction.

تأتبي (تحسس لمستأرج، تاريخ التهاب أنف تحسسي أو إكزيما) وغير تأتبي؛ أو بحسب نمط الالتهاب (حمضي، عدلي، مختلط، قليل المحييات)؛ أو بحسب العوامل/الأحداث المطلقة لتضييق القصبات.

AR

EN

Explain the role of TH2 cells and IgE in the pathogenesis of asthma.

7

Excessive TH2 reaction to environmental antigens; IL-4 → IgE, IL-5 → eosinophils, IL-13 → mucus and IgE. IgE coats submucosal mast cells, which release granule contents on allergen exposure, giving an early phase (bronchoconstriction via vagal receptors, mucus, vasodilation) and a late phase.

AR

تفاعل مفرط لخلايا TH2 ضد المستضدات البيئية؛ IL-4 → IgE، وIL-5 → الحمضات، وIL-13 → المخاط وIgE. يغلف IgE الخلايا البدينة تحت المخاطية فتُطلق حبيباتها عند التعرض للمستأرج، فيحدث طور مبكر (تضيّق قصبات عبر المستقبلات المبهمة، ومخاط، وتوسّع أوعية) وطور متأخر.