مجمع السلطان
AL SULTAN MEDICAL COMPLEX

قسم النساء والتوليد



الحمل والمرض السكزي
Pregnancy and Diabetes

1
قبل التخطيط للحمل بثلاث شهور يتم اخذ حمض الفوليك وتظبيط السكر التراكمي في المستوى الطبيعي تجنيا لحدوث تشوهات جنينية او اجهاض متكرر

Before planning for pregnancy, for three months take folic acid and regulate HbA1c to the normal level to avoid fetal malformations or recurrent miscarriage.

2
مع بداية الحمل يتم استبدال علاج السكر بالانسولين طول فترة الحمل

At the beginning of pregnancy, the diabetes medication should be replaced with insulin throughout the pregnancy.

3
الحفاظ على وجيات الاكل الثلاثه الرئيسية وبينهما من 2 الى 3 وجبات خفيفة

Maintain the three main meals and between them 2 to 3 light snacks.

4
لا يفضل الصيام تماما اثناء الحمل مع مرضى السكر

Fasting is not recommended at all during pregnancy for women with diabetes.

5
تجنب اللحوم المحفوظة كالبرجر و اللانشون حيث تحتوي على سعرات حرارية عالية

Avoid processed meats such as burger and luncheon, as they contain high calories.

6
المحافظة على شرب الماء من لتر ونص الى لترين يوميا

Keep drinking water from 1.5 to 2 liters per day.

7
ممارسة الرياضة الخفيفه حيث انها تساعد على زيادة حساسية للجسم للانسولين وبالتا لي خفض مستوى السكر بالدم

Do light exercise, as it helps increase the body's sensitivity to insulin and thus lowers blood sugar levels.

8
متابعة السكر عن طريق تحليل سكر الصائم والفاطر بعد ساعه وساعتين والسكر التراكمي

Monitor blood sugar through fasting, postprandial (after 1 and 2 hours) and HbA1c tests.

9
المتابعه الدوريه لعيادة النساء والتوليد كل شهر اول 12 اسبوع بعدها كل اسبوعين حتى الاسبوع 35 ثم كل اسبوع حتى الولادة

Follow up at the obstetrics and gynecology clinic every month for 12 weeks, then every two weeks until week 35, then weekly until delivery.

10
في الاسبوع من 24 ل28 يتم عمل اشعه تلفزيونية على قلب الجنين للتأكد من وجود عيوب خلقية من عدمه

Between weeks 24 and 28, a fetal echocardiography is done to check for congenital heart defects.

11
يتم عمل تقييم شهري لحالة الجنين

Monthly evaluation of fetal condition is done.

12
اذا كان مستوى السكر بالدم منتظم طوال فترة الحمل فيمكن للسيدة ان تنتظر مدة حدوث الولادة الطبيعية اما اذا كان السكر غير منتظم فيتم انهاء الحمل عند 36 اسبوع واحيانا عند 34 اسبوع

If blood sugar is stable throughout pregnancy, the woman can wait for a natural delivery.
If it is uncontrolled, pregnancy is ended at 36 weeks, and sometimes at 34 weeks.



13
بعد الولادة يتم متابعة مستوى السكر في الدم ويمكن العودة الى العلاج المستخدم قبل الحمل

After delivery, blood sugar levels are monitored and the woman can return to the treatment used before pregnancy.

صحتك .. تهمنا