PRONTO ATENDIMENTO

Mantecorp Farmasa

ESCANEIE O QR CODE E ACESSE AS BULAS.

ANALGÉSICOS

PRODUTO	INDICAÇÕES	POSOLOGIA	APRESENTAÇÃO
Lisador dipirona 500 mg, cloreto de alfacetona 10 mg, cloreto de prometazina 5 mg	Manifestações dolorosas no pós-operatório de cirurgias, traumas, contusões, luxações, lombalgias, tendinites e osteoartrite.	**Crianças acima de 12 anos:** Tomar 1 comprimido de 6/6 horas. **Adultos:** Tomar 1 a 2 comprimidos, de 6/6 horas	Caixa com 16 ou 24 comprimidos. Blíster com 4 ou 8 comprimidos.
Lisador® Dip 1g dipirona monoidratada	Manifestações dolorosas em geral como: dores musculares, traumas, entorses, lombalgias, febres e dores no corpo.	**Adultos e adolescentes acima de 15 anos:** tomar ½ a 1 comprimido até 4 vezes ao dia.	Caixa com 10 ou 20 comprimidos. Blíster com 4 ou 8 comprimidos.
Lisador® Cólica butilbrometo de escopolamina 10mg, dipirona 250mg	Indicado para tratamento dos sintomas de cólicas intestinais, estomacais, urinárias, das vias biliares, dos órgãos sexuais femininos e menstruais.	1 a 2 comprimidos até 4 x ao dia.	Embalagem com 20 comprimidos.
Kelac trometamol cetorolaco	Com potente ação analgésica, indicado para o tratamento a curto prazo de dores agudas de moderada a severa intensidade, como em casos de pós-operatórios, cólicas renais ou biliares, entre outros.	**Dose recomendada:** 10 a 20 mg em dose única ou 10 mg a cada 6 a 8 horas. **Dose máxima diária:** 90 mg.	Embalagem com 10 ou 20 Comprimidos.
ECOXE etoricoxibe	Eficaz na dor aguda e crônica como: Cirurgias, traumas e fraturas, osteoartrite, dorsalgia, artrites reumatológicas.	Cômoda 1 x ao dia.	Embalagem de 60 mg com 7 e 14 comprimidos ou 90 mg com 7 e 14 comprimidos.
NOVOTRAM dicloridrato de tramadol	Tratamento das dores de intensidade moderada a grave. Lombalgias, hérnias discais, luxações, fraturas, artrites, espondilites e dores do pós-operatório.	**Cápsulas: Adultos e adolescentes a partir de 12 anos** Uma a duas cápsulas duras de Novotram. **Gotas: Adultos:** 20 a 40 gotas. **Crianças acima de 1 ano:** Aproximadamente 1 gota a cada 2kg.	Caixa com 10 ou 20 cápsulas duras. Frasco com 10mL sabor menta.
NOVOTRAM PAR dicloridrato de tramadol + paracetamol	Tratamento das dores de intensidade moderada a grave. Lombalgias, hérnias discais, luxações, fraturas, artrites, espondilites e dores do pós-operatório.	De 4 a 6 horas, até 8 comprimidos ao dia.	Caixa com 10 ou 20 comprimidos revestidos.

ANTI-INFLAMATÓRIOS

MaxSulid 400 mg mesylate celecoxibe	Lombalgias, tendinites, luxações, traumas e artritos.	1 comprimido a cada 12 horas.	Caixa com 10 ou 30 comprimidos.

ANTI-HISTAMÍNICOS

ALEKTOS bilastina 20mg	Indicado para o tratamento dos sintomas da rinoconjuntivite alérgica.	1 comprimido de 20 mg ao dia.	**Comprimidos revestidos.** Apresentação de 20mg. Embalagens com 20 e 30 unidades.
ALEKTOS® DERM	Dermatite atópica, ressecamento, urticárias e manifestações na pele.	Uso tópico conforme orientação médica.	**Hidratante 200 mL.**
CELESTAMINE® dexclorfeniramina + betametasona	Indicado no tratamento adjuvante de doenças alérgicas do aparelho respiratório e nas doenças alérgicas inflamatórias oculares.	**Adultos e crianças maiores de 12 anos:** a dose recomendada é de 5 a 10mL, 3 a 4 vezes ao dia. **Crianças de 6 a 12 anos:** a dose recomendada é de 2,5mL, 3 vezes ao dia. **Crianças de 2 a 6 anos:** a dose inicial recomendada é de 1,25 a 2,5mL, 3 vezes ao dia.	**Xarope 0,4mg/mL+0,05mg/mL.** Embalagens contendo 1 frasco com 30 ou 120mL acompanhado com copo dosador. **Solução Gotas 2mg/mL+0,25mg/mL.** Embalagens contendo 1 frasco com 10mL ou 20mL.

CORTICOIDES

Amome furoato de mometasona	Indicado para o tratamento dos sintomas de rinite alérgica sazonal e perene.	**Adultos e adolescentes:** dois acionamentos (50mcg/acionamento) em cada narina, uma vez por dia. **Crianças com idades entre 2 e 11 anos:** um acionamento (50mcg/acionamento) em cada narina uma vez por dia.	**Suspensão spray nasal.** Embalagens contendo 1 frasco de 9g de peso líquido equivalente a 60 acionamentos ou 1 frasco de 18g de peso líquido equivalente a 120 acionamentos.
PredSim fosfato sódico de prednisolona	Indicado como anti-inflamatório e imunossupressor e para o tratamento de doenças que respondam à terapia com corticosteroides.	Criança: Solução 3mg/mL: a dose pediátrica inicial pode variar de 0,14 a 2mg/kg de peso por dia, administrados de 3 a 4 vezes por dia. Solução Gotas 11mg/mL: a dose pediátrica inicial pode variar de 0,14 a 2mg/kg de peso por dia, administrados de 1 a 4 vezes por dia. Adulto: Comprimido: a dosagem inicial pode variar de 5 a 60mg por dia.	**Comprimido revestido.** Embalagem contendo 5, 10 ou 20 comprimidos de 5mg, 10mg ou 20mg. Embalagens contendo 4, 7 ou 10 comprimidos de 40mg. **Solução3mg/mL.** Embalagens contendo 1 frasco de 30mL, 60mL ou 100mL acompanhado com seringa dosadora. **Solução gotas 11mg/mL.** Embalagens contendo 1 frasco com 15mL ou 20mL.

DESCONGESTIONANTE SISTÊMICO

Descon® maleato de dexclorfeniramina 2mg, cloridrato de fenilefrina 25mg	Indicado para controlar e reduzir os sintomas relacionados a gripe, ao resfriado, a rinite e a sinusite.	**Adultos:** 1 a 1 ½ copos dosadores (10 a 15mL), 3 a 4 vezes ao dia. **Crianças acima de 2 anos:** ¼ a ½ copo dosador (2,5 a 5mL), 4 vezes ao dia. Dosagem máxima diária limitada a 60mL.	**Embalagem contendo 01 frasco** com 120mL, acompanhado com copo dosador de 10mL.

DESCONGESTIONANTE SISTÊMICO

Rinosoro® cloreto de sódio	Indicado como fluidificante e descongestionante nasal. Auxilia no tratamento dos sintomas nasais comuns a gripes e resfriados.	Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade ou a critério médico.	Rinosoro Gotas 0,9% 30mL / Rinosoro XT 0,9% Gotas 30mL / Rinosoro Sic 0,9% Infantil Spray 50mL / Rinosoro Sic 0,9% Spray 50mL / Rinosoro Sic 3% Solução Nasal 50mL / Rinosoro Jet Infantil 0,9% Spray 100mL / Rinosoro Jet 0,9% Spray Nasal 100mL / Rinosoro Jet XT 0,9% 100mL / Rinosoro Jet XT Infantil 0,9% Spray 100mL
Rinosoro® Alto Volume Solução de cloreto de sódio 9,0mg/mL	Indicado para lavagem nasal. Auxilia no tratamento dos sintomas nasais comuns a gripes e resfriados e de outras alterações respiratórias.	Realizar a lavagem nasal de 3 a 4 vezes ao dia, ou a critério médico.	RAV baby 6 meses a 3 anos RAV infantil 4 a 11 anos Rav adulto +12

CORTICÓIDE INJETÁVEL

Diprospan® betametasona	Tratamento das doenças agudas e crônicas que respondem aos corticoides (artrite reumatoide, inamações, torcicolos, lombalgia e osteoartrite).	**Adultos e crianças acima de 15 anos:** As necessidades posológicas são variáveis e deverão ser individualizadas com base na doença específica, na gravidade do quadro e na resposta do paciente ao tratamento.	**Suspensão injetável.** Embalagem contendo 1 ampola de 1mL acompanhado de seringa descartável esterilizada.

RELAXANTE MUSCULAR

Mioflex-A diclofenaco sódico, carisoprodol, paracetamol e cafeína	Dorsalgias, lombociatalgia, tendinites, gonartrose e osteoartrite.	Para tratamentos de 6 até 10 dias, 1 comprimido a cada 8 ou a cada 12 horas	Caixa com 12 ou 30 comprimidos.