Parceiros do Seu Plantão

ALEKTOS bilastina 20mg / ALEKTOS PED bilastina 2,5mg/mL

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Alergias Respiratórias: tratamento dos sintomas da rinoconjuntivite e da rinite alérgica, como espirros, congestão nasal, olhos vermelhos e lacrimejantes.

Urticária: erupções da pele com placas vermelhas (eritemas) e pápulas, acompanhadas de coceiras.

APRESENTAÇÕES

Alektos: caixa com 20 ou 30 comprimidos
Alektos Ped: frasco com 120ml

POSOLOGIA

Dos 2 aos 11 anos (peso corpóreo 20kg: 4ml 1x dia
Acima dos 12 anos: 1 comprimido ao dia

Alivium® ibuprofeno / Alivium® infantil / Alivium® GC ibuprofeno 200mg/mL

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Febre, amigdalites, faringites, laringites, sinusites, otites e dores associadas a gripes e resfriados

APRESENTAÇÕES

Gotas 100mg/ml com 20ml
Gotas Concentradas 200mg/ml com 20ml
Cápsulas líquidas 400mg
Cápsulas líquidas e compr. revestidos 600mg

POSOLOGIA

1 cápsula/compr. cada 6 a 8 horas
Dosagem antitérmica e analgésica
Alivium **100mg/ml:** 1 gota/kg 3 a 4x ao dia
Dosagem Anti-inflamatória
Alivium **GC 200mg/ml**: 1 gota/kg 3 a 4x ao dia

Amome furoato de mometasona

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Indicado para o tratamento dos sintomas de rinite alérgica sazonal e perene.

APRESENTAÇÕES

Suspensão spray nasal: Embalagens contendo 1 frasco de 9g de peso líquido equivalente a 60 acionamentos ou 1 frasco de 18g de peso líquido equivalente a 120 acionamentos.

POSOLOGIA

Adultos e adolescentes: dois acionamentos em cada narina, uma vez por dia.
Crianças com idades entre 2 e 11 anos: um acionamento em cada narina uma vez por dia.

Descon® maleato de bronfeniramina 2mg/5mL cloridrato de fenilefrina 5mg/5mL

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Indicado para controlar e reduzir os sintomas relacionados a gripe, ao resfriado, a rinite e a sinusite.

APRESENTAÇÕES

Embalagem contendo 01 frasco com 120mL, acompanhado com copo dosador de 10mL.

POSOLOGIA

Adultos: 1 a 1 ½ copos dosadores (10 a 15mL), 3 a 4 vezes ao dia.
Crianças acima de 2 anos: ¼ a ½ copo dosador (2,5 a 5mL), 4 vezes ao dia. Dosagem máxima diária limitada a 60mL.

PredSim prednisolona 10mg

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Asma, bronquite, IVAs, urticária, rinite alérgica e outras doenças que respondem ao uso de corticoide.

APRESENTAÇÕES

- Gotas 11mg/ml de 20ml
- Solução 3mg/ml de 60ml ou 100ml
- 5mg de 10 e 20 comp.
- 10mg de 10 comp.
- 20mg de 10 e 20 comp.
- 40mg de 7 e 10 comp.

POSOLOGIA

Criança: Gotas - 2 gts/kg, 1 x ao dia
Solução - 1ml a cada 3kg, 1x ao dia
Adulto: Dose em bula de 5mg a 60mg ao dia, variando com a patologia e recomendação médica.

Ondif ondansetrona

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Indicado para prevenir e tratar náuseas e vômitos.

APRESENTAÇÕES

Filme orodispersível: Embalagens contendo 10 filmes de 4mg ou 8mg.

POSOLOGIA

Uso adulto: 1 a 2 filmes de 8mg.
Uso pediátrico: para pacientes maiores de 11 anos, recomenda-se a dose de 1 a 2 filmes de 4mg.
Para crianças de 2 a 11 anos, recomenda-se a dose de 1 filme de 4mg.

ECOXE etoricoxibe

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Eficaz na dor aguda e crônica: cirurgias, traumas e fratura, dorsalgia, lombalgia, osteoartrite, artrites reumatológicas, espondilite anquilosante e gota.

APRESENTAÇÕES

Duas opções de dosagem:
60 e 90 mg, com 7 e 14 comp.

POSOLOGIA

1 comprimido ao dia

MaxSulid® 400mg nimesulida betaciclodextrina

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Lombalgias, tendinites, luxações, traumas, artrites, dismenorreia primária, endometriose, dores abdominais, amigdalites, faringites, sinusites e outros processos inflamatórios.

APRESENTAÇÕES

Caixa com 10 ou 30 comprimidos

POSOLOGIA

1 comprimido 2x ao dia

Lisador® Dip 1g dipirona monoidratada

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Indicado como analgésico (para dor) e antitérmico (para febre).

APRESENTAÇÕES

Caixa com 10 ou 20 comprimidos.
Blíster com 4 ou 8 comprimidos

POSOLOGIA

Adultos e adolescentes acima de 15 anos: tomar ½ a 1 comprimido até 4 vezes ao dia.

Lisador® Cólica dipirona 250mg butilbrometo de escopolamina 10mg

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Tratamento dos sintomas de cólicas intestinais, estomacais, urinárias, das vias biliares, dos órgãos sexuais femininos e menstruais.

APRESENTAÇÕES

Embalagens contendo 4 ou 20 comprimidos revestidos

POSOLOGIA

1 a 2 comprimidos revestidos até 4x ao dia

Esol XR esomeprazol magnésico

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

DGRE, Esofagite

APRESENTAÇÕES

ESOL 40MG com 28 cápsulas

POSOLOGIA

1 cápsula por dia em jejum

Bifilac GeFlora

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Diarréia aguda ou associada ao antibiótico

APRESENTAÇÕES

Caixa com 6 e 14 sachês

POSOLOGIA

1 a 2 sachês por dia

Dramin® dimenidrinato

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

náuseas, vômitos, cinetose, labirintite, tonturas e vertigens

APRESENTAÇÕES

Dramin B6 comprimidos com 30,
Dramin B6 gotas, 30ml,
Dramin cápsulas de 25mg com 10,
Dramin cápsulas de 50mg com 10

POSOLOGIA

Apresentação gotas 1 gota/quilo a cada 6 ou 8h
Comprimidos e cápsulas tomar de 6/6h ou de 8/8h

KELAC trometamol cetorolaco

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

Trauma musculoesquelético, enxaquecas e dismenorreias primárias

APRESENTAÇÕES

Kelac 10mg com 10 e 20 comprimidos

POSOLOGIA

Tomar 1 comprimido de 6/6h ou de acordo com a necessidade do paciente

Rinosoro® cloreto de sódio

APRESENTAÇÕES

Rinosoro spray 0,9 adulto, infantil e 3%,
Rinosoro spray XT 0,9 adulto, infantil e 3%,
Rinosoro Jet 0,9 adulto e infantil,
Rinosoro Jet XT 0,9 adulto e infantil,
Rinosoro Alto volume adulto 240ml,
Rinosoro Alto Volume infantil 120ml e
Rinosoro alto volume baby

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

lavagem nasal

POSOLOGIA

administrar pelo menos 3 vezes por dia
ou de acordo com a necessidade de cada paciente

Mantecorp Farmasa