780_LAMINA_SINERGIA_A5_FINAL_CURVAS.pdf 1 17/01/25 11:28

Confiança e Segurança
para o paciente com dor

KELAC
trometamol cetorolaco

RAPIDEZ E POTÊNCIA NA DOR AGUDA [1]

MaxSulid® 400 mg
nimesulida betaciclodextrina

A NIMESULIDA POTENCIALIZADA PELA BETACICLODEXTRINA

ECOXE
etoricoxibe

POTENTE [2], MODERNO E ALTAMENTE SELETIVO [3]

POTÊNCIA ANALGÉSICA

POTÊNCIA ANTI-INFLAMATÓRIA

ESCANEIE O QR CODE PARA VER AS BULAS DOS PRODUTOS

	KELAC trometamol cetorolaco	MaxSulid 400 mg nimesulida betaciclodextrina	ECOXE etoricoxibe
Molécula	Trometamol Cetorolaco [1]	Nimesulida Betaciclodextrina [4]	Etoricoxibe [5]
Intensidade da Dor	Dor aguda moderada a severa [1]	Dor aguda leve a moderada [4]	Dor aguda e dor crônica [5]
Posologia	1 ou 2 comprimidos em dose única ou 1 comprimido a cada 6 ou 8 horas (não exceder 60 mg/dia) [1] Tempo recomendado para tratamento: 5 dias [1]	1 comprimido a cada 12h [4] Tempo recomendado para tratamento: conforme orientação médica ou do profissional prescritor [4]	1 comprimido por dia [5] Tempo recomendado para tratamento: 5 dias [5]

Mantecorp Farmasa

Referências bibliográficas: 1) Bula do medicamento Kelac. **2**) Croom KF, Siddiqui MAA. Etoricoxib: a review of its use in the symptomatic treatment of osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and acute gouty arthritis. Drugs. 2009;69(11):1513-1532. **3)** Cannon CP, Curtis SP, FitzGerald GA, et al. Cardiovascular outcomes with etoricoxib and diclofenac in patients with osteoarthritisand rheumatoid arthritis in the Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term (MEDAL) programme: a randomized comparison. Lancet 2006; 368: 1771-1781. **4**) Bula do medicamento Maxsulid. **5**) Bula do medicamento Ecoxe.

MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 01/2025