Mantecorp Farmasa

Mantecorp Farmasa

LINHA OSTEO

LINHA OSTEO

PRODUTO	INDICAÇÕES	POSOLOGIA	APRESENTAÇÕES
Artroflan Harpagophytum procumbens 150mg Garra do Diabo	Este produto é usado tradicionalmente para alívio de dores articulares moderadas e dor lombar baixa aguda*	2 comprimidos 1 vez ao dia *	Caixa com 40 ou 60 comprimidos.
Artrotop Com extrato de Harpagophytum procumbens e Extrato de Capsaicina	Reduz o cansaço e a fadiga corporal.[1]	Aplicação 3 vezes ao dia.[1]	Creme com 50g.
Colflex bio Colágeno em cápsulas	Pacientes com preferência por cápsulas e em primeiro tratamento.	1 cápsula ao dia.[2]	Caixa com 30 ou 60 cápsulas.
Colflex Complet	Pacientes com comprometimento ósseo e necessidade de suplementação de cálcio.[3]	1 comprimido ao dia logo após as refeições.[4]	Caixa com 30 ou 60 comprimidos.
Colflex CURCUMA	Pacientes com dores mais intensas, dores e dificuldades em iniciar movimentos, segundo tratamento, restrição ao uso de AINEs.[5,6]	1 comprimido ao dia.[7]	Caixa com 30 comprimidos.

*Fonte: Bula e/ou folheto do produto. Para acesso, basta consultar o QRCode.

LINHA OSTEO

PRODUTO	INDICAÇÕES	POSOLOGIA	APRESENTAÇÕES
Colflex HIALU	Pacientes com necessidade de uso complementar à viscossuplementação, lesão por prática esportiva e limitação de movimento.[8,9]	1 comprimido ao dia.[10]	Caixa com 30 comprimidos.
Colflex MUSCULAR	Pacientes com perda de massa muscular, envelhecimento, doenças crônicas e praticantes de atividades físicas.[11]	1 sachê ao dia.[12]	Caixa com 30 sachês.
Colflex TRIO	Pacientes com dores generalizadas[5], dificuldades em se movimentar[13] e agudização.[5]	1 sachê ao dia.[14]	Caixa com 30 sachês.
CURC Curcuma longa 400mg MAIS BIODISPONÍVEL*	Pacientes com osteoartrite, dorsalgia e tendinite.[15,16]	1 comprimido por dia.[17]	Pote com 30 ou 60 comprimidos.
Diprospan dipropionato e fosfato dissódico de betametasona	Tratamento das doenças agudas e crônicas que respondem aos corticoides (artrite reumatoide, inflamações, torcicolos, lombalgia e osteoartrite).*	Adultos e crianças acima de 15 anos: As necessidades posológicas são variáveis e deverão ser individualizadas com base na doença específica, na gravidade do quadro e na resposta do paciente ao tratamento.*	Suspensão injetável. Embalagem contendo 1 ampola de 1mL acompanhado de seringa descartável esterilizada.

LINHA OSTEO

PRODUTO	INDICAÇÕES	POSOLOGIA	APRESENTAÇÕES
ECOXE etoricoxibe	Eficaz na dor aguda e crônica*: cirurgias*, traumas e fratura, dorsalgia, lombalgia, osteoartrite*, artrites reumatológicas*, espondilite anquilosante* e gota.[18-21]	1 comprimido ao dia.*	Duas opções de dosagem: 60 e 90 mg, com 7 e 14 comprimidos.
Lisador dipirona, cloridrato de adifenina, cloridrato de prometazina	Indicado para o tratamento de manifestações dolorosas em geral; como antipirético (estados febris); nas dores em geral como cólicas do trato gastrintestinal, cólicas nos rins e fígado; dores de cabeça, dores musculares, articulares e pós-operatórias.*	Crianças acima de 12 anos: Tomar 1 comprimido de 6/6 horas. Adultos: Tomar 1 a 2 comprimidos, de 6/6 horas.*	Caixa com 16 ou 24 comprimidos. Blíster com 4 ou 8 comprimidos.
Lisador® Cólica dipirona 250mg butilbrometo de escopolamina 10mg	Tratamento dos sintomas de cólicas intestinais, estomacais, urinárias, das vias biliares, dos órgãos sexuais femininos e menstruais.*	1 a 2 comprimidos revestidos até 4x ao dia*	Embalagens contendo 4 ou 20 comprimidos revestidos.
Lisador® Dip 1g dipirona monoidratada	Indicado como analgésico (para dor) e antitérmico (para febre)*	Adultos e adolescentes acima de 15 anos: tomar ½ a 1 comprimido até 4 vezes ao dia.*	Caixa com 10 ou 20 comprimidos. Blíster com 4 ou 8 comprimidos.
Lisador® Dip dipirona monoidratada Gotas	Indicado como analgésico (para dor) e antitérmico (para febre)*	Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 20 a 40 gotas em administração única ou até o máximo de 40 gotas, 4 vezes ao dia. As crianças acima de 3 meses devem receber Lisador® Dip gotas conforme seu peso, seguindo a orientação do esquema disponível na bula*	Frasco com 20mL.

*Fonte: Bula e/ou folheto do produto. Para acesso, basta consultar o QRCode.

LINHA OSTEO

PRODUTO	INDICAÇÕES	POSOLOGIA	APRESENTAÇÕES
MaxSulid® 400 mg nimesulida betaciclodextrina	Lombalgias, tendinites, luxações, traumas, artrites, dismenorreia primária, endometriose, dores abdominais, amigdalites, faringites, sinusites e outros processos inflamatórios.[22-25]	1 comprimido 2x ao dia*	Caixa com 10 ou 30 comprimidos.
Mioflex-A diclofenaco sódico, carisoprodol, paracetamol, cafeína.	Dorsalgias, lombociatalgia, gonartroses, osteoartrite e outros estados inflamatórios agudos*	Como regra geral, a dose mínima diária recomendada é de um comprimido a cada 12 horas e a dose máxima de um comprimido a cada 8 horas, a duração do tratamento deve ser a critério médico*	Caixa com 12 ou 30 comprimidos.
NOVOTRAM cloridrato de tramadol	Tratamento das dores de intensidade moderada a grave. Lombalgias, hérnias discais, luxações, fraturas, artrites, espondilites e dores do pós-operatório.*	Cápsulas: Adultos e adolescentes a partir de 12 anos. Uma a duas cápsulas duras de Novotram. Dependendo da dor, o efeito dura cerca de 4 a 8 horas. Gotas: Adultos: 20 a 40 gotas. Crianças acima de 1 ano: A dose única usual é 4 a 8 gotas por 10kg (1-2mg de cloridrato de tramadol por kg) de peso corporal.*	Caixa com 10 ou 20 cápsulas duras.
NOVOTRAM PAR cloridrato de tramadol + paracetamol	Tratamento das dores de intensidade moderada a grave. Lombalgias, hérnias discais, luxações, fraturas, artrites, espondilites e dores do pós-operatório.*	1 a 2 comprimidos revestidos de 4 a 6 horas, até 8 comprimidos ao dia*	Caixa com 10 ou 20 comprimidos revestidos.

Referências bibliográficas: 1.Cartonagem do produto Artrotop. 2. Cartonagem do Produto Colflex Bio 3. Hunter DJ, et al. Evidence of altered bone turnover, vitamin d and calcium regulation with knee osteoarthritis in female twins. Rheumatology (Oxford). 2003;42(11):1311-6. 4. Folheto do produto Colflex Complet. 5. Prabhoo R, Billa G.Undenatured collagen type II for the treatment of osteoarthritis: a review. In J Res Orthop. 2018; 4(5):684-689. 6. Zeng L, et al. The efficacy and safety of Curcuma longa extract and curcumin supplements on osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Biosci Rep. 2021;41(6):BSR20210817. 7. Cartonagem do produto Colflex Curcuma 8. Oe M, et al. Oral hyaluronan relieves knee pain: a review. Nutr J. 2016;15:11. 9. Ricci M, et al. Clinical comparison of oral administration and viscosupplementation of hyaluronic acid (HA) in early knee osteoarthritis. Musculoskelet Surg. 2017;101(1):45-49. 10. Cartonagem do produto Colflex Hialu 11. Nissen SL, Sharp RL. Effect of dietary supplements on lean mass and strength gains with resistance exercise: a meta-analysis. J Appl Physiol (1985). 2003;94(2):651-9. 12. Cartonagem do Produto Colflex Muscular. 13. Bakilan F, et al. Effects of Native Type II Collagen Treatment on Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial. Eurasian J Med. 2016;48(2):95-101. 14. Cartonagem do produto Colflex Trio 15. Chainani-Wu N. Safety and anti-inflammatory activity of curcumin: a component of tumeric (Curcuma longa). J Altern Complement Med. 2003;9(1):161-168. 16. Wu J, et al. Efficacy and side effect of curcumin for the treatment of osteoarthritis: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pak J Pharm Sci. 2019;32(1):43-51. 17. Cartonagem do produto Curc 18. Clarke R, et al. Single dose oral etoricoxib for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014, Issue 5. Art. No.: CD004309. 19. Malmstrom K, et al. A randomized, double-blind, parallel-group study comparing the analgesic effect of etoricoxib to placebo, naproxen sodium, and acetaminophen with codeine using the dental impaction pain model. Clin J Pain. 2004. 20(3): 147-55. 20. Yuan H, et al.A retrospective analysis of the effects of different analgesics on the pain of patients with traumatic thoracolumbar fractures in the peri-treatment period. J Orthop Surg Res. 2021. 17;16(1):268. 21. Ortiz MI, et al.Effectiveness of diclofenac, ketorolac and etoricoxib in the treatment of acute pain from ankle fracture.Proc West Pharmacol Soc. 2010;53:46-8. 22. Kress HG, et al. Acute pain: a multifaceted challenge - the role of nimesulide. Curr Med Res Opin. 2016;32(1):23-36. 23. Rabasseda X. Nimesullde: a selective cyclooxygenase 2 inhibitor antiinflammatory drug. Drugs of Today 1996;32(5):365-384. 24. Pulkkinen M. Nimesulide in dysmenorrhoea. Drugs. 1993,46 Suppl 1:129-33. 25. Ottaviani A, et al. A multicentre clinical study of nimesulide in inflammatory diseases of the ear, nose and throat. Drugs. 1993,46 Suppl 1:96-9. MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO PROFISSIONAL DA SAÚDE. Novembro/2023.

ACESSE AS BULAS