

## Régression linéaire simple

### Postulats

**H<sub>1</sub>** Linéarité :  $E[\varepsilon_i] = 0$

**H<sub>2</sub>** Homoscédasticité :  $Var(\varepsilon_i) = \sigma^2$

**H<sub>3</sub>** Indépendance :  $Cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$

**H<sub>4</sub>** Normalité :  $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

### Modèle

$$\begin{aligned} E[Y_i|x_i] &= \beta_0 + \beta_1 x_i \\ Var(Y_i|x_i) &= \sigma^2 \\ Y_i|x_i &\stackrel{H_4}{\sim} \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2) \end{aligned}$$

### Estimation des paramètres

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_0 &= \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \\ \hat{\beta}_1 &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i Y_i - \bar{Y} \sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x} \sum_{i=1}^n x_i} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) Y_i}{S_{XX}} \end{aligned}$$

### Estimation de $\sigma^2$

$$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{n - p'} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - 2}$$

### Propriété des estimateurs

$$\begin{aligned} E[\hat{\beta}_1] &= \beta_1, \quad Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{S_{XX}} \\ \hat{\beta}_1 &\stackrel{H_4}{\sim} \mathcal{N}\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{S_{XX}}\right) \\ E[\hat{\beta}_0] &= \beta_0, \quad Var(\hat{\beta}_0) = \sigma^2 \left( \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{XX}} \right) \\ \hat{\beta}_0 &\stackrel{H_4}{\sim} \mathcal{N}\left(\beta_0, \sigma^2 \left( \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{XX}} \right)\right) \\ Cov(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) &= -\frac{\bar{x} \sigma^2}{S_{XX}} \end{aligned}$$

### Tests d'hypothèse sur les paramètres

$$\begin{aligned} H_0 : \hat{\beta} &= \theta_0, \quad H_1 : \hat{\beta} \neq \theta_0 \\ t_{obs} &= \frac{\hat{\beta} - \theta_0}{\sqrt{Var(\hat{\beta})}} \sim T_{n-2} \\ \text{On Rejette } H_0 &\text{ si } t_{obs} > |t_{n-2}(1 - \frac{\alpha}{2})| \end{aligned}$$

### Intervalle de confiance

**Pour la droite de régression ( $E[Y_0|x_0]$ )**

$$\begin{aligned} \text{Sachant que } E[Y_0|x_0] &= \beta_0 + \beta_1 x_0, \text{ on a l'IC suivant} \\ \left[ \hat{Y}_0 \pm t_{n-2} \left( 1 - \frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{s^2 \left( \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right)} \right] \end{aligned}$$

**Pour la prévision de  $Y_0$**

$$\begin{aligned} \text{Sachant que } Y_0 &= \beta_0 + \beta_1 x_0 + \varepsilon, \text{ on a l'IC suivant} \\ \hat{Y}_0 \pm t_{n-2} \left( 1 - \frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{s^2 \left( 1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right)} \end{aligned}$$

### Analyse de la variance (ANOVA)

Source	dl	SS	MS	F
Model	$p$	$\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$ (SSR)	$SSR/dl_1$ (MSR)	$\frac{MSR}{MSE}$
Residual error	$n - p'$	$\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$ (SSE)	$SSE/dl_2$ (MSE = $s^2$ )	
Total	$n - 1$	$\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ (SST)		

Où  $p$  est le nombre de variables explicatives dans le modèle.

### Coefficient de détermination

$$\begin{aligned} R^2 &= \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} \\ \text{On a aussi la relation suivante avec } F_{obs} : \\ F &= \frac{R^2}{1 - R^2} \cdot \frac{n - p'}{p} \end{aligned}$$

### Test F de Fisher pour la validité globale de la régression

On rejette  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$  si

$$F_{obs} = \frac{MSR}{MSE} \geq F_{n, n-p'}(1 - \alpha)$$

où  $p$  est le nombre de variables explicatives dans le modèle (régression linéaire simple,  $p = 1$  et  $p' = p + 1$ ).

### Distribution d'un résidu $\varepsilon$

$$\begin{aligned} E[\hat{\varepsilon}_i] &= 0, \quad Var(\hat{\varepsilon}_i) = \sigma^2(1 - h_{ii}) \\ \text{où } h_{ii} &= \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_i)^2}{S_{XX}}. \\ \text{On peut aussi prouver que} \\ Cov(\hat{\varepsilon}_i, \hat{\varepsilon}_j) &= -\sigma^2 \left( \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S_{XX}} \right) \end{aligned}$$

## Vérification des postulats

Les résidus studentisés sont définis par

$$r_i = \frac{\hat{\varepsilon}_i}{\sqrt{s^2(1 - h_{ii})}}$$

### Linéarité

- graphique  $Y_i|x_i$
- graphique  $\hat{\varepsilon}_i|\hat{Y}_i$
- graphique  $\hat{\varepsilon}_i|x_i$

Les deux derniers graphique doivent être centrés à 0 et d'allure aléatoire.

### Homoscédasticité

- Graphique  $r_i|\hat{Y}_i$  : la dispersion des résidus doit être constante, pas de forme d'entonnoir ou de résidus absolus supérieurs à 3.

### Indépendance

- Graphique  $r_i|i$  : si il y a un *pattern*, présence d'auto-corrélation (le postulat  $H_3$  n'est donc pas respecté).

### Normalité

- Histogramme des  $r_i$
- Q-Q Plot Normal : les résidus du modèle doivent suivre la droite des quantiles normaux théoriques.

## 3 Régression linéaire multiple

## Le modèle et ses propriétés

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}_{n \times 1} &= \mathbf{X}_{n \times p'} \boldsymbol{\beta}_{p' \times 1} + \boldsymbol{\varepsilon}_{n \times 1} \\ E[\mathbf{Y}] &= \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}, \text{Var}(\mathbf{Y}) = \sigma^2 \mathbf{I}_{n \times n} \\ \mathbf{Y} &\stackrel{H_4}{\sim} \mathcal{N}_n(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}, \sigma^2 \mathbf{I}_{n \times n}) \end{aligned}$$

## Paramètres du modèle

### Estimation et propriétés des paramètres

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{\beta}} &= (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{Y} \\ E[\hat{\boldsymbol{\beta}}] &= \boldsymbol{\beta}, \text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \\ \hat{\boldsymbol{\beta}} &\stackrel{H_4}{\sim} \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}) \end{aligned}$$

### Intervalle de confiance sur les paramètres

$$\begin{aligned} \text{var}[\beta_j] &= \sigma^2 v_{jj} \\ \beta_j &\in \left[ \hat{\beta}_j \pm t_{n-p'} \left( 1 - \frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{s^2 v_{jj}} \right] \\ \text{où } v_{jj} &\text{ est l'élément } (j, j) \text{ de la matrice } (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}. \end{aligned}$$

### Estimation de $\sigma^2$

$$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}^\top \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}}{n - p'}$$

Il peut être démontré que cette estimateur est sans biais et indépendant de  $\hat{\boldsymbol{\beta}}$

## Test d'hypothèse sur un paramètre du modèle

On rejette  $H_0 : \beta_j = 0$  si

$$|t_{obs,j}| = \frac{\hat{\beta}_j}{\sqrt{s^2 v_{jj}}} > t_{n-p'} \left( 1 - \frac{\alpha}{2} \right)$$

## Propriétés de la droite de régression

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{Y}} &= \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} & \hat{\boldsymbol{\varepsilon}} &= \mathbf{Y} - \hat{\mathbf{Y}} \\ &= \mathbf{X}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{Y} & &= (\mathbf{I}_n - \mathbf{H})\mathbf{Y} \\ &= \mathbf{H}\mathbf{Y} & & \end{aligned}$$

où  $\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top$  est la *hat matrix*.

On a aussi que

$$\begin{aligned} E[\hat{\mathbf{Y}}] &= \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}, \text{Var}(\hat{\mathbf{Y}}) = \sigma^2 \mathbf{H} \\ \hat{\mathbf{Y}} &\stackrel{H_4}{\sim} \mathcal{N}_n(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}, \sigma^2 \mathbf{H}) \end{aligned}$$

Pour les résidus de la droite de régression, on a

$$\begin{aligned} E[\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}] &\stackrel{H_1}{=} \mathbf{0}, \text{Var}(\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}) = \sigma^2 (\mathbf{I}_{n \times n} - \mathbf{H}) \\ \hat{\boldsymbol{\varepsilon}} &\stackrel{H_4}{\sim} \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \sigma^2 (\mathbf{I}_{n \times n} - \mathbf{H})) \end{aligned}$$

## Matrice de projection

Les matrices  $\mathbf{H}$  et  $\mathbf{I}_n - \mathbf{H}$  peuvent être vues comme des matrices de projection. Ces deux opérateurs possèdent plusieurs propriétés :

- $\mathbf{H}^\top = \mathbf{H}$  (symétrie)
- $\mathbf{H}\mathbf{H} = \mathbf{H}$  (idempotence)
- $\mathbf{H}\mathbf{X} = \mathbf{X}$
- $(\mathbf{I}_n - \mathbf{H}) = (\mathbf{I}_n - \mathbf{H})^\top$  (symétrie)
- $(\mathbf{I}_n - \mathbf{H})(\mathbf{I}_n - \mathbf{H}) = (\mathbf{I}_n - \mathbf{H})$
- $(\mathbf{I}_n - \mathbf{H})\mathbf{X} = \mathbf{0}$
- $(\mathbf{I}_n - \mathbf{H})\mathbf{H} = \mathbf{0}$

## Intervalle de confiance pour la prévision

### Théorème de Gauss-Markov

Selon les postulats  $H_1$  à  $H_4$ , l'estimateur

$$\mathbf{a}^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{a}^\top (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{Y}$$

est le meilleur estimateur pour  $\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$

(BLUE : *Best linear unbiased estimator*).

### I.C. pour la prévision de la valeur moyenne $E[Y|\mathbf{X}^*]$

$$\left[ \mathbf{X}^{*\top} \hat{\boldsymbol{\beta}} \pm t_{n-p'} \left( 1 - \frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{s^2 \mathbf{X}^{*\top} (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^*} \right]$$

### I.C. pour la valeur prédite $\hat{Y}|\mathbf{X}^*$

$$\left[ \mathbf{X}^{*\top} \hat{\boldsymbol{\beta}} \pm t_{n-p'} \left( 1 - \frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{s^2 \left( 1 + \mathbf{X}^{*\top} (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^* \right)} \right]$$

## Analyse de la variance

### Tableau ANOVA

- On utilise le même tableau ANOVA qu'en régression linéaire simple.
- $SSR_{\text{régression}} = \sum_{i=1}^p SSR_i$ , où  $SSR_i$  représente le SSR individuel de la variable explicative  $i$  calculé par R. On peut ensuite trouver  $MSR$  et la statistique  $F_{\text{obs}}$ .

### Test F pour la validité globale de la régression

Même test qu'en régression linéaire simple.

### Test F partiel pour la réduction du modèle

Avec  $k < p$ , on va rejeter

$$H_0 : Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_{ik} \quad (\text{modèle réduit})$$

Pour

$$H_1 : Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_{ip} \quad (\text{modèle complet})$$

Si

$$F_{\text{obs}} = \frac{(SSE^{(0)} - SSE^{(1)}) / \Delta dl}{SSE^{(1)} / (n - p')} \geq F_{p-k, n-p'}(1 - \alpha)$$

où  $\Delta dl = p - k$ ,  $SSE^{(0)}$  pour le modèle réduit ( $H_0$ ) et  $SSE^{(1)}$  pour le modèle complet ( $H_1$ ).

## Multicollinéarité

### Problèmes potentiels

- Instabilité de  $(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$ , i.e. une petite variation de  $Y$  peut changer de grandes variations en  $\hat{\boldsymbol{\beta}}$  et  $\hat{Y}$ ;
- $\hat{\beta}_i$  de signes contre-intuitif;
- $Var(\hat{\beta}_i)$  et  $Var(\hat{Y})$  très grandes;
- Les méthodes de sélection de variable ne concordent pas;
- Conclusions erronées sur la significativité de certains paramètres, malgré une forte corrélation avec  $Y$ .

### Détection

- Si  $r_{ij}$  dans la matrice de corrélation  $\mathbf{X}^{*\top} \mathbf{X}^*$  est élevée, où  $\mathbf{X}^* = \begin{bmatrix} \frac{x_1 - \bar{x}_1}{s_1} & \dots & \frac{x_p - \bar{x}_p}{s_p} \end{bmatrix}_{1 \times p}$
- Si le facteur d'influence de la variance ( $VIF_j$ ) est élevé, où

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

avec  $R_j^2$  le coefficient de détermination de la régression ayant comme variable réponse le  $j^{\text{e}}$  variable et les  $(j - 1)$  autres variables exogènes en *input*.

- La variance de  $\hat{\beta}_j$  s'exprime en fonction du VIF comme suit :

$$\text{Var}(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{(\mathbf{X}^{*\top} \mathbf{X}^*)_{jj}} VIF_j$$

### Solution

- On retire les variables ayant un VIF élevé (une à la fois)
- On combine des variables exogènes redondantes

## Validation du modèle et des postulats

### Linéarité

- On trace les graphiques à variable ajoutée ( $\hat{\varepsilon}_Y | \mathbf{X}_{-j}$  en fonction de  $\hat{\varepsilon}_{x_j | \mathbf{X}_{-j}}$ ).
- Ces graphiques doivent normalement donner une droite de pente  $\beta_j$ .
  - Si le graphique ressemble à un graphique de résidus normaux,  $x_j$  est inutile.
  - Si il y a une courbe,  $x_j$  est non-linéaire.

### Homogénéité des variances

- Graphique  $r_i | \hat{Y}_i$

### Indépendance entre les observations

- Graphique  $\hat{\varepsilon}_i | i$
- Test de Durbin-Watson (pas à l'examen)

## 4 Sélection de modèle et régression régularisée

En présence de beaucoup de variable exogènes, on court le danger d'en garder trop ou pas assez

- Trop** : On augmente inutilement la variance des estimations( $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ )
- Moins** : On augmente inutilement le biais des estimations( $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ )

## Critères de comparaison classiques

- › Coefficient de détermination (pour mesurer la qualité globale du modèle) :

$$R_2 = \frac{SSR}{SST}$$

Si on ajoute une variable exogène, il est certain que  $R^2$  augmentera, on utilise donc ce critère pour valider si la régression est utile pour prédire  $Y$ , mais pas pour critère de sélection des variables exogènes.

- › Coefficient de détermination ajusté :

$$R_a^2 = \frac{SSE/p}{SST/(n-1)} = \frac{MSE}{MST}$$

Ce critère permet de valider l'ajout de nouvelles variables exogènes.

Ces deux critères sont inutiles pour comparer des modèles avec des transformations différentes et pour des modèles avec/sans ordonnée à l'origine.

## Méthode basées sur la puissance de prévision

Ce critère maximise l'habileté du modèle à prédire de nouvelles données.

### Principe de la validation croisée

- Pour  $i = 1, \dots, n$ ,
  - Enlever la  $i^e$  observation du jeu de données.
  - Estimer les paramètres du modèle à partir des  $n - 1$  données restantes.
  - Prédire  $Y_i$  à partir de  $x_i$  et du modèle obtenu en 2, noté  $\hat{Y}_{i,-i}$
- Calculer la somme des carrés des erreurs de prévision  $PRESS = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_{i,-i})^2$

On cherche à minimiser le PRESS ou à maximiser le coefficient de détermination de prévision :

$$R_p^2 = 1 - \frac{PRESS}{SST}$$

## Les résidus PRESS

Il est possible de trouver la statistique PRESS sans devoir calculer  $n$  régressions :

$$PRESS = \sum_{i=1}^n \left( \frac{\varepsilon_i}{1 - h_{ii}} \right)^2$$

### Échantillon de test et validation croisée par $k$ ensemble

- Pour  $k = 1, \dots, K$ ,
  - Enlever le  $k^e$  ensemble du jeu de donnée.
  - Estimer les paramètres du modèle à partir des données des  $k - 1$  échantillons restants.
  - Prédire les observations du  $k^e$  ensemble ( $\hat{Y}_{i,-k}$ ) et calculer
 
$$MSEP_k = \frac{1}{n_k} \sum_{i \in \text{group } k} (Y_i - \hat{Y}_{i,-k})^2$$
- Calculer la moyenne des sommes des carrés des erreurs de prévision  $\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K MSEP_k$

On choisit le modèle qui minimise  $\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K MSEP_k$

## Le $C_p$ de Mallows

$$C_p = p' + \frac{(s_p^2 - \hat{\sigma}^2)(n - p')}{\hat{\sigma}^2} = \frac{SSE}{\hat{\sigma}^2} + 2p' - n$$

On cherche le modèle pour lequel  $C_p \approx p'$

## Critère d'information d'akaike et critère bayésien de Schwarz

- › Ce critère est le plus utilisé dans la pratique et permet d'évaluer la qualité de l'ajustement d'un modèle.

$$AIC = n \cdot \ln \left( \frac{SSE}{n} \right) + 2p'$$

AIC prend en compte à la fois la qualité des prédictions du modèle et sa complexité.

- › BIC est similaire à AIC, mais la pénalité des paramètres dépend de la taille de l'échantillon. On cherche à minimiser ces 2 critères.

$$BIC = n \cdot \ln \left( \frac{SSE}{n} \right) + \ln(n)p'$$

## Méthode algorithmiques

### Méthode d'inclusion (forward)

- On commence avec le modèle le plus simple (i.e.  $\hat{Y}_i = \beta_0$ )
- On essaie d'ajouter la variable qui, en l'incluant dans le modèle, permet de réduire le plus le SSE du modèle.
- On valide si la variable diminue de façon significative les résidus avec un test  $F$ , où
 
$$F_{obs} = \frac{SSE_{\text{petit modèle}} - SSE_{\text{grand modèle}}}{SSE_{\text{grand modèle}} / (n - p')}$$
 On ajoute la variable au modèle si  $F_{obs} > F_{1,n-p'}(1 - \alpha)$
- On répète jusqu'à ce qu'aucune variable ne vaille la peine d'être ajoutée.

### Méthode d'exclusion (backward)

- On débute avec le modèle complet
- On veut enlever la variable exogène qui, en l'excluant du modèle, permet de minimiser l'augmentation du SSE de la régression.
- Même test  $F$  qu'à l'étape 3 de la méthode *forward*, sauf qu'on enlève la variable seulement si
 
$$F_{obs} < F_{1,n-p'}(1 - \alpha)$$
- On répète jusqu'à ce qu'aucune variable ne vaille la peine d'être enlevée.

### Méthode pas à pas (step-wise)

- On débute avec la méthode d'inclusion
- Après l'ajout d'une variable au modèle, on effectue la méthode d'exclusion pour les variables qui sont actuellement dans le modèle (on remet constamment le modèle en question).

## 5 Modèles linéaires généralisés (GLM)

### Famille exponentielle linéaire

#### Définition

Une loi de probabilité fait partie de la famille exponentielle linéaire si

- On peut exprimer la fonction de densité (ou masse) de probabilité comme

$$f(y; \theta, \phi) = \exp \left( \frac{y\theta - b(\theta)}{a(\phi)} + c(y; \phi) \right)$$

où  $\theta$  est le paramètre canonique et  $\phi$  est le paramètre de dispersion.

- la fonction  $c$  ne dépend pas du paramètre  $\theta$ .
- Le support de  $Y$  ne dépend pas des paramètres  $\theta$  ou  $\phi$ .

#### Propriétés

Soit  $\mu = \dot{b}(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} b(\theta)$  et  $V(\mu) = \ddot{b}(\theta) = \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} b(\theta)$ . Alors, si  $Y$  fait partie de la famille exponentielle linéaire, on peut exprimer l'espérance et la variance comme

$$E[Y] = \dot{b}(\theta) = \mu$$

$$\text{Var}(Y) = a(\phi) \ddot{b}(\theta) = a(\phi) V(\mu)$$

#### Lemme de la Log-vraisemblance

Soit  $\ell(\theta, \phi; Y) = L(\theta, \phi; Y)$  la log-vraisemblance. Alors,

$$E \left[ \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(\theta, \phi; Y) \right] = 0$$

et

$$E \left[ \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(\theta, \phi; Y) \right)^2 \right] = -E \left[ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ell(\theta, \phi; Y) \right]$$

#### Fonction de lien

Soit  $\eta = \mathbf{X}\beta$ . La fonction de lien est la transformation qu'on applique à  $\eta$  afin de limiter le support de  $Y$ .

**Lien log**  $\eta = \ln \mu \leftrightarrow \mu = e^\eta$

**Lien logistique**  $\eta = \ln \left( \frac{\mu}{1-\mu} \right) \leftrightarrow \mu = \frac{e^\eta}{1+e^\eta}$

**Lien probit**  $\eta = \Phi^{-1}(\mu) \leftrightarrow \mu = \Phi(\eta)$

**Lien log-log complémentaire**  $\eta = \ln(-\ln(1-\mu)) \leftrightarrow \mu = 1 - e^{-e^\eta}$

**Lien canonique**  $\eta = \theta$

#### Estimation des paramètres

- On estime  $\hat{\beta}$  avec la méthode du maximum de vraisemblance (EMV ou MLE en anglais)

- L'EMV est cohérent, i.e.

$$\hat{\beta} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \beta$$

- L'estimateur a une normalité asymptotique, i.e.

$$\hat{\beta} \sim \mathcal{N} \left( \beta, \frac{\mathcal{I}(\beta)^{-1}}{n} \right)$$

où  $\mathcal{I}(\beta)_{(p' \times p')}$  est la matrice d'information de Fisher :

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\beta) &= E \left[ \dot{\ell}(\beta; Y_1, \dots, Y_n) \dot{\ell}(\beta; Y_1, \dots, Y_n)^\top \right] \\ &= -E \left[ \ddot{\ell}(\beta; Y_1, \dots, Y_n) \right] \end{aligned}$$

- On peut estimer la matrice d'information de Fisher avec **l'information observée** :

$$\mathcal{I}(\hat{\beta}) = - \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ell(\beta; Y_i) \Big|_{\hat{\beta}}$$

#### Algorithme de Newton-Raphson

L'objectif est de trouver  $\hat{\beta}$  qui maximise  $\ell(\hat{\beta})$ , ce qui revient à trouver  $\dot{\ell}(\hat{\beta}) = 0$ . On utilise l'approximation de Taylor de premier ordre dans l'algorithme :

- Choisir des valeurs de départ pour le vecteur  $\hat{\beta}^{H_0}$

- Pour  $k = 1, 2, \dots$

$$(2.1) \quad \hat{\beta}^{(k)} = \hat{\beta}^{(k-1)} + \left\{ -\ddot{\ell}(\hat{\beta})^{(k-1)} \right\}^{-1} \dot{\ell}(\hat{\beta})^{(k-1)}$$

- Si  $|\dot{\ell}(\hat{\beta})^{(k)}| < \varepsilon$ , on converge vers les paramètres optimaux pour le modèle et on arrête.

- Répéter les étapes (2.1) et (2.2) jusqu'à une convergence.

#### Méthode du score de Fisher

Cette méthode est la même que l'algorithme de Newton-Raphson, à l'exception qu'on remplace  $\mathcal{I}(\hat{\beta})$  par  $-E[\ddot{\ell}(\hat{\beta})]$  à l'étape (2.1)

#### Statistique de Wald

Test d'hypothèse pour tester  $H_0 : \beta_j = 0, H_1 : \beta_j \neq 0$ . On a que

$$Z = \frac{\hat{\beta}_j}{\sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

On rejette donc  $H_0$  si  $Z > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ .

**Note** On obtient  $\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j)$  sur les éléments de la diagonale de  $\{\mathcal{I}(\hat{\beta})\}^{-1}/n$ .

#### Test du rapport de vraisemblance

On teste  $H_0 : \beta \in \beta_0$  et  $H_1 : \beta \in \beta_1$ , où  $\beta_1$  est le complément de l'espace  $\beta_0$ , qui est une sélection réduite des variables explicatives disponibles. On teste

$$\lambda(y) = \frac{L(\hat{\beta}^{(H_0)})}{L(\hat{\beta})}$$

$\lambda(y)$  sera assurément plus petit que 1 (il y a moins de variables explicatives). Mais on veut tester si  $\lambda(y)$  est plus petit qu'une certaine valeur critique.

- Si  $H_0$  spécifie tous les paramètres du modèle, on a  $-2 \ln \lambda(y) \sim \chi_{p'}^2$ , Sous  $H_0$
- Si  $H_0$  spécifie partiellement les paramètres du modèle, on a

$$-2 \ln \lambda(y) \sim \chi_{k_2 - k_1}^2, \text{ Sous } H_0$$

où  $k_1$  est le nombre de paramètres non-spécifiés dans  $H_0$  et  $k_2$  le nombre de paramètres non-spécifiés dans  $H_1$ .

- › Avec le TRV, on peut seulement comparer des modèles qui sont liés ( $\hat{\beta}^{(H_0)}$  doit être un sous-ensemble de  $\hat{\beta}$ ).

## Adéquation du modèle

### Statistiques $\chi^2$ de Pearson

On peut valider l'adéquation du modèle avec la statistique  $X^2$ , où

$$X^2 = \sum_{i=1}^n \left( \frac{y_i - \hat{\mu}_i}{\sqrt{V(\hat{\mu}_i)}} \right)^2 \sim \chi_{n-p'}^2$$

Avec  $X^2 \leq \chi_{n-p', 1-\frac{\alpha}{2}}^2$  si le modèle est adéquat. Si  $\phi$  est inconnu, on peut l'estimer avec  $\hat{\phi} = \frac{X^2}{n-p'}$

### Déviance

On a

$$2(\ell(\tilde{\theta}) - \ell(\hat{\theta})) \sim \chi_{n-p'}^2$$

avec  $\tilde{\theta}$  est le modèle nul,  $\hat{\theta}$  le modèle à l'étude et  $\tilde{\theta}$  le modèle complet, où  $\hat{\mu}_i = y_i$ . Cette expression représente la déviance  $D(y; \hat{\mu})$  :

$$\begin{aligned} 2(\ell(\tilde{\theta}) - \ell(\hat{\theta})) &= 2 \sum_{i=1}^n \frac{w_i}{\phi} (y_i \tilde{\theta} - b(\tilde{\theta}) - y_i \hat{\theta} + b(\hat{\theta})) \\ &= 2 \sum_{i=1}^n \frac{w_i}{\phi} y_i (\tilde{\theta} - \hat{\theta}) - (b(\tilde{\theta}) - b(\hat{\theta})) \\ &= \frac{D(y; \hat{\mu})}{\phi} \end{aligned}$$

Si  $\phi$  est inconnu, on peut l'estimer avec  $\hat{\phi} = \frac{D(y; \hat{\mu})}{n-p'}$

## Comparaison de modèles

Les critères classiques AIC et BIC peuvent être utilisés pour comparer des modèles. On peut aussi faire une analyse de la déviance

### Analyse de la déviance

On compare le modèle  $A$  et le modèle  $B$  (où  $A$  est une simplification de  $B$ ). Le modèle  $A$  sera une bonne sim-

plification de  $B$  si

$$\frac{D(y; \hat{\mu}_A) - D(y; \hat{\mu}_B)}{\phi} \sim \chi_{p_B - p_A}^2$$

Il est certain que la déviance va augmenter en diminuant le nombre de paramètres. On veut valider si la déviance augmente *significativement* au point de ne pas pouvoir simplifier  $B$ . On rejette  $H_0$  que  $A$  est une bonne simplification de  $B$  si la différence est déviance réduite est supérieure à  $\chi_{p_B - p_A, 1-\frac{\alpha}{2}}^2$

## Analyse des résidus

### Résidus de Pearson

$$r_{P_i} = \frac{y_i - \hat{\mu}_i}{\sqrt{V(\hat{\mu})_i}}$$

### Résidus d'Anscombe

À valider si la formule est à savoir

### Résidus de la déviance

À valider si la formule est à savoir

## 6 Modélisation de données de comptage

### Terme *offset*

On veut souvent modéliser le taux de réclamation, cela se fait avec un terme *offset*  $t_i$  qui représente l'exposition au risque (i.e. le nombre d'années qu'on a assuré la personne) :

$$\ln \left( \frac{\mu_i}{t_i} \right) = x_i \beta$$

$$\ln(\mu_i) = x_i \beta + \ln(t_i)$$

$$\mu_i = t_i e^{\eta_i}$$

le terme *offset* peut être vu comme une variable explicative additionnelle (où le coefficient est toujours 1)

## Notation pour les interactions

Lorsqu'on utilise des variables catégoriques qui ont plusieurs niveaux, on peut utiliser une notation abrégée. Prenons un modèle quelconque  $A * B$  avec la variable  $A$  qui a  $I = 3$  niveaux et  $B$  qui a  $J = 2$  niveaux. Alors, on aurait

$$\ln(\mu_{i,j}) = \alpha + \beta_i^A + \beta_j^B + \gamma_{i,j} \quad i = 1, 2, 3 \text{ et } j = 1, 2$$

Où on impose les contraintes telles que  $\beta_1^A = \beta_1^B = 0$  et  $\gamma_{1,j} = \gamma_{j,1} = 0$ .

## Approximation de la Binomiale par une Poisson

Si la variable qu'on veut modéliser obéit à une  $Bin(m, \pi)$  avec  $m$  grand et  $\pi$  petit, alors on peut l'approximer avec une loi de Poisson en prenant le modèle

$$\ln(\mu_i) = \ln(m_i) + \ln(\pi_i)$$

où  $\ln(m_i)$  est un terme *offset*

## Tableau de contingence

Lorsque toutes les variables sont des catégorielles, on peut créer un tableau de contingence, où on veut modéliser le nombre dans chaque case avec un GLM Poisson.

On a 3 modèles dans les tableaux de contingence (illustré avec des modèles simples qui ont les variables explicatives  $A, B$  et  $C$  avec  $J, K$  et  $L$  niveaux :

- › Modèle d'indépendance :  $A + B + C$
- › Modèle d'indépendance partielle (celui qu'on veut tester) :  
 $A + B * C$
- › Modèle d'indépendance conditionnelle (aussi appelé le *modèle saturé*) :  
 $A * B * C$

On peut alors tester l'indépendance de certaines variables en faisant une **Analyse de la déviance** (section 5).



## Cote

La cote de  $A$  est définie par

$$\text{Cote}(A) = \frac{\Pr(A)}{\Pr(\bar{A})} = \frac{\Pr(A)}{1 - \Pr(A)}$$

## 7 Modélisation de données binomiales

### 7.1 Cas Bernoulli

Tableau de mauvaise classification

	Prédiction $\hat{Y}_i$	
Vrai $Y_i$	0	1
0	a	b
1	c	d

En forçant  $\hat{Y}_i$  tel que

$$\hat{Y}_i = \begin{cases} 0 & , \hat{\pi}_i < \tau \\ 1 & , \hat{\pi}_i \geq \tau \end{cases}$$

On peut calculer la statistique de **sensitivité** (i.e. le taux de bonne classification des vrais 1) et de **spécificité** (i.e. le taux de bonne classification des vrais 0) :

$$\text{Sensitivité} = \alpha(\tau) = \frac{d}{c + d}$$

$$\text{Spécificité} = \beta(\tau) = \frac{a}{a + b}$$