

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO

MESTRADO ACADÊMICO EM COMPUTAÇÃO

ÁLVARO DA SILVA FARIAS

CONVEXIDADE P_3 ORIENTADA

FORTALEZA

2026

ÁLVARO DA SILVA FARIAS

CONVEXIDADE P_3 ORIENTADA

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Computação do Programa de Pós-Graduação em Computação do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Ciência da Computação. Área de Concentração: Ciência da Computação

Orientadora: Prof. Dra. Ana Karolinna Maia

Coorientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Fisch de Brito

FORTALEZA


2026

Para criar sua ficha catalográfica, preencha corretamente o Módulo de Elaboração de Fichas Catalográficas (CATALOG!) disponibilizado no link:

http://fichacatalografica.ufc.br/

Em seguida, deve-se renomear o arquivo gerado como "ficha-catalografica" e adicioná-lo ao *template* na pasta "1-pre-textuais". É necessário, contudo, excluir o antigo arquivo "ficha-catalografica" antes de adicionar o novo.

A figura a seguir mostra os passos enumerados para a inclusão da ficha catalográfica no *Overleaf*.



ÁLVARO DA SILVA FARIAS

CONVEXIDADE P_3 ORIENTADA

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Computação do Programa de Pós-Graduação em Computação do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Ciência da Computação. Área de Concentração: Ciência da Computação

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dra. Ana Karolinna Maia (Orientadora)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Carlos Eduardo Fisch de Brito (Coorientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Quatro (SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foi que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Ricardo Silva Thé Pontes por me orientar em minha tese de doutorado.

Ao Prof. Dr. Tobias Rafael Fernandes Neto, coordenador do Laboratório de Sistemas Motrizes (LAMOTRIZ) onde este *template* foi desenvolvido.

Ao Doutorando em Engenharia Elétrica, Ednardo Moreira Rodrigues, e seu assistente, Alan Batista de Oliveira, aluno de graduação em Engenharia Elétrica, pela adequação do *template* utilizado neste trabalho para que o mesmo ficasse de acordo com as normas da biblioteca da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Aos bibliotecários da Universidade Federal do Ceará: Francisco Edvander Pires Santos, Juliana Soares Lima, Izabel Lima dos Santos, Kalline Yasmin Soares Feitosa e Eliene Maria Vieira de Moura, pela revisão e discussão da formatação utilizada neste *template*.

Ao aluno Thiago Nascimento do curso de ciência da computação da Universidade Estadual do Ceará que elaborou o *template* do qual este trabalho foi adaptado para Universidade Federal do Ceará.

Ao Prof. Dr. Humberto de Andrade Carmona do Curso de Física da UFC pelo primeiro incentivo para o uso do LaTeX.

Ao aluno de graduação em engenharia elétrica e amigo, Lohan Costa por me apresentar a plataforma *ShareLatex* que depois migrou para a plataforma *OverLeaf*.

Aos amigos de laboratório, Felipe Bandeira, Renan Barroso e Roney Coelho, pelas discussões sobre os recursos do LaTeX.

Aos meus pais, irmãos e sobrinhos, que nos momentos de minha ausência dedicados ao estudo superior, sempre fizeram entender que o futuro é feito a partir da constante dedicação no presente!

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender.

E à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento (Funcap), na pessoa do Presidente Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno pelo financiamento da pesquisa de doutorado via bolsa de estudos.

"O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado."

(Ariano Suassuna)

RESUMO

Em Pelas Ondas do Rádio: Cultura Popular, Camponeses e o MEB analisa a participação de camponeses do nordeste brasileiro no Movimento de Educação de Base. A perspectiva da tese é a de demonstrar como os trabalhadores envolvidos com as escolas radiofônicas elaboraram ações para manutenção e reprodução da escola em sua comunidade, visando obter os benefícios necessários à reprodução e melhoria de seu modo de vida. A partir de representações políticas e culturais singulares, dentre as quais vigoraram: um sentido para escola, um papel para o sindicato e para participação política, preceitos do direito de uso da terra e dos direitos do trabalho, assim como, sentidos múltiplos para o uso do rádio como meio de comunicação, informação e lazer, os camponeses do MEB, foram coadjuvantes da proposição católica modernizadora de inícios de 1960. Isto posto, demarca que a ação do camponês nordestino e seu engajamento político, seja no MEB, nos sindicatos rurais, nas Juventudes Agrárias Católicas (JAC's), no MCP, e nas mais diversas instâncias dos movimentos sociais do período, não se apartaram do processo modernizador. Neste sentido, considera-se que a modernização brasileira foi pauta das instituições, organismos políticos e partidos, assim como, do movimento social, instância em que ela foi ressignificada a partir de elementos da vida material, que envolviam diretamente, no momento em questão, a problemática do direito a terra, do direito a educação e cultura e dos direitos do trabalho.

Palavras-chave: Camponeses. Cultura popular. Educação de adultos. Escola rural.

ABSTRACT

In this on the radio waves: popular culture, peasants and the Basic Education Movement we analyze the participation of peasants of the Brazilian northeastern region in the Basic Education Movement. The focus of this thesis is to demonstrate how the labors involved with broadcast schools have elaborated actions for maintaining and spreading the schools in their communities, in order to achieve the necessary means to improve their way of life. Peasants of the Basic Education Movement have been coadjuvant of the modernizing catholic proposition of the early 1960s, by means of quite peculiar political and cultural representations. Some of these representations were: a meaning for the school, a role for the union and for the political participation, precepts of the land use rights and labor rights, and the multiple meanings of the radio as a mass communication, information and leisure medium. This study intends to stress that the actions – and the political enrollment – of the northeastern peasant could not ever be separated from the modernizing process. The connection can be observed in different social movements of the period, such as the Basic Education Movement, rural unions, the Catholic Agrarian Youth and the MCP. In this sense, we consider that, if the Brazilian modernization was a guideline for the institutions, political organisms and parties for the social movement, such a modernization was a guideline of demands based on elements of material life. Those elements included, by that time, the agrarian reform, the educational issue and labor urgencies.

Keywords: Adult education. Community schools. Peasants. Popular culture.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Representação de uma forma convexa (esquerda) e uma forma não convexa (direita) 13
Figura 2 – Representação de um grafo simples. 15
Figura 3 – Uma representação de um digrafo D. 16
Figura 4 – Processo de infecção na convexidade P_3 direcionada a partir do conjunto de envoltória $S = \{v_1, v_2\}$. $ti(G) = 3$ 18
Figura 5 – Os vértices em cinza formam um conjunto de intervalo com cardinalidade 5. 18

LISTA DE SÍMBOLOS

$V(G)$	Conjunto de vértices do grafo G
$E(G)$	Conjunto de arestas do grafo G
$N_G(v)$	Vizinhança do vértice v no grafo G
$N_G[v]$	Vizinhança fechada do vértice v no grafo G
$N_D^+(v)$	Vizinhança de saída do vértice v no grafo direcionado D
$N_D^-(v)$	Vizinhança de entrada do vértice v no grafo direcionado D
$d_G(v)$	Grau do vértice v no grafo G
$d_D^+(v)$	Grau de saída do vértice v no grafo direcionado D
$d_D^-(v)$	Grau de entrada do vértice v no grafo direcionado D
$G[S]$	Subgrafo de G induzido por S
$d_G(u,v)$	Distância entre os vértices u e v no grafo G
$T(G)$	Árvore de blocos e vértices de corte do grafo G
$conv_{\mathscr{C}}(S)$	Envoltória convexa de S na convexidade $\mathscr{C}$
$Ext_{\mathscr{C}}(S)$	Conjunto dos vértices extremos do convexo S em $\mathscr{C}$
$hn_{\mathscr{C}}(G)$	Número de envoltória do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$in_{\mathscr{C}}(G)$	Número de intervalo do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$con_{\mathscr{C}}(G)$	Número de convexidade do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$cth_{\mathscr{C}}(G)$	Número de Carathéodory do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$h\ell_{\mathscr{C}}(G)$	Número de Helly do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$rd_{\mathscr{C}}(G)$	Número de Radon do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$rk_{\mathscr{C}}(G)$	Posto (Rank) do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$gp_{\mathscr{C}}(G)$	Número de posição geral do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$b(G)$	Quantidade de vértices do menor bloco-folha do grafo G


SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	13
1.1	**Parâmetros de Convexidade**	14
1.2	**Espectro**	14
1.3	**Contribuições e Organização do texto**	14
2	**CONCEITOS BÁSICOS**	15
2.1	**Grafos e Digrafos**	15
2.2	**Convexidade em Grafos orientados**	17
3	**CONVEXIDADE EM GRAFOS**	19
4	**ESPECTRO DO NÚMERO DE INTERVALO P3 ORIENTADO**	20
4.1	**Continuidade do espectro**	20
4.2	**Limitantes do espectro do número de intervalo em árvores, caminhos e ciclos**	23
5	**ALGORITMO POLINOMIAL PARA CONJUNTO DE INTERVALO NA CONVEXIDADE P3 ORIENTADA**	25
6	**RESULTADOS DE COMPLEXIDADE EM GRAFOS PLANARES**	28
6.1	**NP-completude para grafos planares orientados**	28
7	**CONCLUSÃO**	32
	REFERÊNCIAS	33

1 INTRODUÇÃO

A teoria de convexidade em grafos é uma área que busca adaptar os conceitos de topologia em um ambiente discreto. Naturalmente, o estudo da convexidade em grafos se estende aos grafos orientados. Dentre os vários modelos de convexidade estudados, as convexidades baseadas em caminhos, mais especificamente a convexidade $\overrightarrow{P_3}$, onde um vértice é gerado por um conjunto se possui vizinhança de entrada e vizinhança de saída neste conjunto, introduzida em (ERDöS *et al.*, 1972), será o foco deste trabalho.

Para introduzir os conceitos básicos de convexidade em grafos, iremos revisitar os conceitos básicos da *geometria convexa*. Para uma leitura um pouco mais detalhada, vale checar o capítulo inicial de (ARAÚJO *et al.*, 2023). Seja d um inteiro tal que $d \geq 2$ e $\mathbb{R}^d$ o espaço (euclidiano) d-dimensional, um determinado conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^d$ é convexo se para qualquer segmento de reta entre dois pontos de S, o mesmo está contido em S.



Forma convexa Forma não convexa

Figura 1 – Representação de uma forma convexa (esquerda) e uma forma não convexa (direita)

Seja A um conjunto não vazio, uma convexidade $\mathscr{C}$, é uma família de subconjuntos de A, tal que:

1. $\emptyset, A \in \mathscr{C}$
2. $\mathscr{C}$ é fechado sob interseção
3. A união infinita de conjuntos conexos aninhados, é convexa

Observe que quando o conjunto A é finito, como por exemplo o conjunto de vértices de um grafo, a propriedade 3 pode ser descartada. Seja $C \in \mathscr{C}$, C é um conjunto convexo.

Definir envoltória convexa abstrata

Definir vertice extremo

Definir função de intervalo

Definir as convexidades mais comuns, P3, P3* e Geodésica, talvez

Convexidade em grafos

1.1 Parâmetros de Convexidade

1.2 Espectro

1.3 Contribuições e Organização do texto

(alvaro: Na convexidade $\overrightarrow{P_3}$, a função de intervalo $\overrightarrow{I_{P_3}}(u,v)$ retorna todos os vértices de D que pertencem a um u,v-caminho ou v,u-caminho direcionados que possuem exatamente 3 vértices (ERDöS *et al.*, 1972). Dado um subconjunto de vértices $S \subseteq V(D)$, se $\overrightarrow{I_{P_3}}(S) = V(D)$, temos que S é um *conjunto de intervalo* de D. É possível obter vários conjuntos de intervalo e a cardinalidade mínima dentre todos os conjuntos de intervalo é o *número de intervalo*.)

2 CONCEITOS BÁSICOS

Nesta seção apresentamos conceitos básicos sobre *grafos, digrafos e convexidade* para explorarmos o problema do *Espectro em convexidade* e outros problemas relacionados. Todos os conceitos abordados aqui foram inspirados nos livros *Introduction to graph Theory* (WEST, 2001), *Digraphs: Theory, Algorithms and Applications* (BANG-JENSEN; GUTIN, 2001) e *Introduction to Graph Convexity: An Algorithmic Approach* (ARAÚJO *et al.*, 2023).

2.1 Grafos e Digrafos

Podemos definir um grafo simples da seguinte forma: uma dupla $G = (V, E)$, onde $V(G)$ é o conjunto de vértices do grafo G e $E(G)$ é o conjunto de arestas (pares não ordenados de vértices vu ou uv) do grafo G. Dizemos que os vértices ligados por uma aresta são suas *extremidades*. Como se trata de grafos simples, não temos *laços*, onde as extremidades de uma aresta são o mesmo vértice e também não temos *arestas múltiplas*, ou seja, duas ou mais arestas compartilham as mesmas extremidades.

Seja $vu \in E(G)$, dizemos então que esses vértices são adjacentes. Denotamos como vizinhança aberta de um vértice v, o conjunto de todos os vértices adjacentes a v. Quando falamos de vizinhança fechada de v, o vértice v também está no conjunto. Com o conceito de vizinhança podemos definir o *grau* de um vértice como $d(v) = |N(v)|$.

Um *caminho* em um grafo G, é uma sequência de vértices e arestas em que não há repetição de vértices. Um (u,v)-caminho é um caminho em que o primeiro vértice da sequência é u e o último é v. Um *ciclo* em um grafo G é um caminho em que o primeiro vértice da sequência é igual ao último. Um grafo é dito *conexo* se para todo par de vértice $u, v \in V(G)$ temos um (u,v)-caminho. Seja $H = (V_H, E_H)$, H é um subgrafo de $G = (V, E)$ se $V_H \subseteq V$ e $E_H \subseteq E$. Uma *componente* é um subgrafo maximal conexo de G. Uma *ponte* é uma aresta $e \in E(G)$ tal que $G - e$ possui mais componentes que G.




Figura 2 – Representação de um grafo simples.

Um *digrafo* (ou grafo direcionado) é uma dupla $D = (V,A)$, onde $V(D)$ é o conjunto de vértices do digrafo D e $A(D)$ é o conjunto de arcos do digrafo D. Diferente das arestas em grafos simples, no contexto dos digrafos, um arco é um par ordenado de vértices. Seja $a = (u,v) \in A(D)$, dizemos que o vértice u é a *cauda* do arco a e o vértice v é *cabeça* do arco a. Como temos que os arcos são pares ordenados de vértices, podemos dizer que no arco (u,v), o vértice v é *sucessor* do vértice u e que o vértice u é *predecessor* do vértice v. O grafo *subjacente* de D é o grafo sem as orientações dos arcos.

Os conceitos de caminhos e ciclos também existem no contexto direcionado, basicamente ao invés de termos arestas, temos arcos, vale ressaltar que um (u,v)-caminho direcionado não significa que temos um (v,u)-caminho direcionado. O digrafo D é conexo, se o grafo subjacente de D é conexo. Dizemos que o digrafo é *fortemente* conexo se para todo par de vértices $u,v \in V(D)$ existe um (u,v)-caminho direcionado e um (v,u)-caminho direcionado.

Se o arco tem as extremidades no mesmo vértice, temos um *laço*, os *arcos múltiplos* são dois ou mais arcos que compartilham a mesma *cabeça* e *cauda*. Se temos laços e arcos múltiplos, se trata de um *pseudodigrafo*, quando temos apenas arcos múltiplos, se trata de um *multidigrafo*. Também podemos dizer que um digrafo sem laços e sem arcos múltiplos é um grafo orientado.

Assim como nos grafos não direcionados, o conceito de vizinhança se mantém, mas nesse caso, se divide em *vizinhança de entrada* e *vizinhança de saída*. Seja $v \in V(D)$, a vizinhança de entrada de v, denotado por $N^-(v)$, é o conjunto de todos os predecessores de v, já a vizinhança de saída de v, denotado por $N^+(v)$, é o conjunto de todos os sucessores de v. Com isso, podemos definir *grau de entrada* de v como $d^-(v) = |N^-(v)|$ e *grau de saída* de v como $d^+(v) = |N^+(v)|$.




Figura 3 – Uma representação de um digrafo D.

Neste texto, quando falarmos grafos, estamos nos referindo à grafos simples, e grafos orientados, à digrafos com grafo subjacente sendo um grafo simples. Dado um grafo G, a orientação de G é atribuir para cada aresta $e = uv \in E(G)$ uma única orientação, (u,v) ou (v,u). Se o grafo G, é um *grafo completo*, ou seja, para cada par de vértices $u,v \in V(G)$, temos uma

aresta, ao orientarmos G, obtemos um *torneio*.

2.2 Convexidade em Grafos orientados


A teoria da convexidade em grafos é uma área que busca adaptar os conceitos de topologia e geometria contínua em um ambiente discreto, um dos primeiros trabalhos a abordar formalmente o tema foi *Convexity in Graphs* (HARARY; NIEMINEN, 1981). Naturalmente, o estudo da convexidade se estende aos grafos orientados. Dentre os vários tipos de convexidade estudados, temos as convexidades baseadas em caminhos, como por exemplo a *convexidade de caminhos de tamanho 2*, introduzido em (CENTENO *et al.*, 2009), denotado por P_3, onde um vértice é gerado por um conjunto $S \subseteq V(G)$ se possui dois vizinhos em S, ou a *convexidade geodésica*, onde dado dois vértices $u, v \in S \subseteq V(G)$, todos os vértices que pertencem ao menor (u,v)-caminho são gerados, introduzido em(HARARY *et al.*, 1993).

No contexto de grafos orientados, temos por exemplo as versões das convexidades apresentadas anteriormente, como a convexidade $\overrightarrow{P_3}$, onde um vértice é gerado por um conjunto se possui vizinhança de entrada e vizinhança de saída neste conjunto, introduzida em (ERDöS *et al.*, 1972) ou a *convexidade geodésica* orientada, onde dados dois vértices $u, v \in S \subseteq V(D)$, todos os vértices no menor u,v-caminho ou v,u-caminho são gerados.


Essas operações descritas anteriormente para gerar novos vértices é o que chamamos de *funções de intervalo*, e cada convexidade pode ser definida por uma função de intervalo distinta. Dado um subconjunto inicial de vértices S, aplicamos a função de intervalo nesse conjunto para gerar novos vértices. Dizemos que um subconjunto $S \subseteq V(D)$ é *convexo* se, para qualquer $u, v \in S$, $I(u,v) \in S$. O *fecho convexo*, denotado por $conv(S)$, é o menor conjunto convexo que contém S. Se $conv(S) = V(D)$, dizemos que S é um conjunto de envoltória.

Com base nessas definições, podemos definir alguns parâmetros que são bastante estudados em diversas convexidades. O *número de envoltória*, denotado por $hn(D)$ é o tamanho do menor conjunto de envoltória em D. Denotamos o número de envoltória dicrecionado como $\overrightarrow{hn}(D)$. O *tempo de iteração* de um conjunto $S \subseteq V(D)$, denotado por $ti(S)$, é basicamente a quantidade de vezes que é necessário aplicar uma função de intervalo até obter o fecho convexo $conv(S)$.


Se dado um subconjunto $S \subseteq V(D)$, $I(S) = V(D)$ em um única iteração, temos que S é um *conjunto de intervalo*. Com isso, temos um outro parâmetro bastante estudado em convexidade, o *número de intervalo*, denotado por $in(D)$, que é basicamente o tamanho do menor




(a) Etapa 0: conjunto inicial $S = \{v_1, v_2\}$.



(b) Etapa 1: v_3 é infectado por v_1 e v_2.



(c) Etapa 2: v_4 é infectado pelos vértices v_2 e v_3 e o vértice v_5 é infectado pelos vértices v_1 e v_3.



(d) Etapa 3: v_6 é infectado pelos vértices v_4 e v_5. Todo o grafo está infectado.

Figura 4 – Processo de infecção na convexidade P_3 direcionada a partir do conjunto de envoltória $S = \{v_1, v_2\}$. $ti(G) = 3$

conjunto de intervalo em D. Denotamos o número de intervalo direcionado como $\overrightarrow{in}(D)$.




Figura 5 – Os vértices em cinza formam um conjunto de intervalo com cardinalidade 5.

Dado um grafo G e um parâmetro de convexidade, o *espectro* de um determinado parâmetro é o conjunto de valores que o parâmetro assume em todas as possíveis orientações de G, denotado por S_c, onde c é uma convexidade de sua escolha, por exemplo, S_g é o espectro *geodésico*. Formalmente o conceito de espectro foi introduzido na convexidade geodésica em *Geodetic Spectra of graphs* (CHANG *et al.*, 2004), em que o parâmetro estudado foi o *número de intervalo* que também é chamado de *número geodésico*, também foi introduzido o conceito de *espectro geodésico forte*, em que temos apenas orientações fortes do grafo G, vale ressaltar que um grafo G tem orientações fortes se e somente se não tem pontes e é conexo.

Dizemos que o espectro é *contínuo* se o mesmo assume todos os valores inteiros no intervalo entre o limite inferior e o limite superior.

3 CONVEXIDADE EM GRAFOS

(alvaro: Não precisa necessariamente ter esse capitulo separado de uma introdução)

4 ESPECTRO DO NÚMERO DE INTERVALO P3 ORIENTADO

O espectro em um determinado parâmetro é o conjunto de valores que o parâmetro assume em todas as orientações possíveis de um grafo. O objetivo deste trabalho é analisar o espectro do *número de intervalo* na convexidade $\overrightarrow{P_3}$ denotado por $S_{\overrightarrow{P_3}}(G) = \{\overrightarrow{in}(D) \mid D \text{ é uma orientação de } G\}$. Dizemos que o espectro é contínuo quando o parâmetro assume todos os valores inteiros no intervalo entre o limite inferior e o limite superior.

4.1 Continuidade do espectro

Dado um grafo G, se encontramos as orientações D^+ e D^- desse grafo que tornam o seu número de intervalo máximo e mínimo, respectivamente, gostaríamos de poder afirmar que existe uma orientação D_k que, para qualquer número inteiro k entre $\overrightarrow{in}(D^+)$ e $\overrightarrow{in}(D^-)$, faz que $\overrightarrow{in}(D_k) = k$, isto é, todos os inteiros no intervalo entre os elementos máximo e mínimo do espectro também pertencem ao espectro, assim o espectro é um intervalo de inteiros e dizemos que é *contínuo*.

Essa *continuidade* do espectro não acontece para todos os grafos em todas as convexidades, mas para qualquer grafo o espectro do número de intervalo na convexidade $\overrightarrow{P_3}$ é contínuo; para mostrar isso, utilizaremos o seguinte lema.

Lema 4.1. *Se D é um grafo orientado e D' é uma orientação obtida ao inverter o sentido de exatamente um arco de D, então $|\overrightarrow{in}(D) - \overrightarrow{in}(D')| \leq 1$.*

Demonstração. Seja S um conjunto de intervalo minimal no grafo orientado D e, assim, $\overrightarrow{in_{P_3}}(D) = |S|$. Sendo, também, D' uma orientação obtida invertendo o arco $(u,v) \in A(D)$, logo $V(D') = V(D)$ e $A(D') = (A(D) - \{(u,v)\}) \cup \{(v,u)\}$ e S' um conjunto de intervalo minimal em D'.

Vamos mostrar que nos casos que $|S| \neq |S'|$ a diferença entre os números de intervalo é de 1.

Caso 1: $u, v \notin S$ ou $u, v \in S$

Note que S também é um conjunto de intervalo em D', logo $\overrightarrow{in}(D') \leq \overrightarrow{in}(D)$. Suponha, então, que $|S'| < |S|$.

Temos, em D', que todo vértice $w \in V(D')$, $w \in S'$ ou w possui um vizinho de entrada e um vizinho de saída em S'. E, também, não ocorrem os casos que $u, v \in S'$ e $u, v \notin S'$. De fato,

nesses casos, S' também seria um conjunto de intervalo em D, o que é absurdo pela minimalidade de S.

Supondo, então, que $u \in S'$ e $v \notin S'$, assim, em D, para todo $w \in V(D) - \{v\}$, $w \in S'$ ou w possui um vizinho de entrada e um vizinho de saída que pertence a S', logo $S' \cup \{v\}$ é um conjunto de intervalo de D e, assim, $|S'| < |S| \leq |S' \cup \{v\}| = |S'|+1$; portanto, $\overrightarrow{in}(D) = \overrightarrow{in}(D') + 1$. Vale notar ainda que, em D, v não pode ter vizinho de saída em S', pois, caso ocorresse, S' seria conjunto de intervalo de D, o que é absurdo pela minimalidade de S. Essa observação é equivalente a dizer que u é o único vizinho de saída de v em D'.

Análogo ao parágrafo anterior, supondo $u \notin S'$ e $v \in S'$, temos que $S' \cup \{u\}$ é conjunto de intervalo em D e, portanto, $\overrightarrow{in}(D) = \overrightarrow{in}(D') + 1$.

Caso 2: $u \in S$ e $v \notin S$

Perceba que, sendo S' um conjunto de intervalo minimal em D', pelo caso anterior, não precisamos fazer os casos que $u, v \in S'$ e $u, v \notin S'$ para evitar repetição.

Supondo $u \in S'$ e $v \notin S'$, temos que, se $|S'| < |S|$, então, para todo $w \in V(D) - (S' \cup \{v\})$ existem vizinho de entrada e vizinho de saída de w que pertence a S', logo $S' \cup \{v\}$ é conjunto de intervalo de D e, assim, $|S'| < |S| \leq |S' \cup \{v\}| = |S'|+1$; portanto, $\overrightarrow{in}(D) = \overrightarrow{in}(D') + 1$. Analogamente, se $|S| < |S'|$, então, para todo $w \in V(D') - (S \cup \{v\})$ existem vizinho de entrada e vizinho de saída de w que pertence a S, logo $S \cup \{v\}$ é conjunto de intervalo de D' e, assim, $|S| < |S'| \leq |S \cup \{v\}| = |S|+1$; portanto, $\overrightarrow{in}(D') = \overrightarrow{in}(D) + 1$.

Com uma argumentação análoga a do paragrafo anterior, supondo que $u \notin S'$ e $v \in S'$, se $|S'| < |S|$, então $S' \cup \{u\}$ é conjunto de intervalo de D, portanto $\overrightarrow{in}(D) = \overrightarrow{in}(D') + 1$. E, se $|S| < |S'|$, então $S \cup \{u\}$ é conjunto de intervalo de D', portanto, $\overrightarrow{in}(D') = \overrightarrow{in}(D) + 1$.

Caso 3: $u \notin S$ e $v \in S$

Está totalmente provado pelos casos anteriores. □

O resultado da continuidade do espectro pode ser visto como um teorema utiliza o lema 4.1 apresentado anteriormente, e está enunciado a seguir.

Teorema 4.1. *Para qualquer grafo, o espectro do número de intervalo na convexidade $\overrightarrow{P_3}$ é contínuo, isto é, se $k_1, k_2 \in S_{\overrightarrow{P_3}}(G)$ e $k_1 \leq k \leq k_2$, $k \in \mathbb{N}$, então $k \in S_{\overrightarrow{P_3}}(G)$.*

Demonstração. Seja D^+ e D^- as orientações do grafo G que tornam o seu número de intervalo máximo e mínimo, respectivamente, com valores $\overrightarrow{in}(D^+)$ e $\overrightarrow{in}(D^-)$. Perceba que se $\overrightarrow{in}(D^+) = \overrightarrow{in}(D^-)$, o espectro é trivialmente contínuo.

Qualquer par de orientações de G pode ser transformada uma na outra com uma sequência finita de inversões dos arcos. Fixamos tal sequência que inicia na orientação D^- e transforma na orientação D^+.

Seja a sequência denotada por $O = \{D_0, D_1, \ldots, D_m\}$, onde $D_0 = D^-$ e $D_m = D^+$. Para $1 \leq n \leq m$, cada orientação D_n é obtida invertendo exatamente um arco de D_{n-1}. Seja $S_n = \{\overrightarrow{in}(D) \mid D \textit{ é uma orientação de } G\}$ o conjunto de todos os valores do número de intervalo após as n primeiras inversões.

Caso base: ($n = 1$) Apenas uma inversão é feita, logo, $S_1 = \{\overrightarrow{in}(D_0), \overrightarrow{in}(D_1)\}$. Pelo lema 4.1, temos que a variação entre $\overrightarrow{in}(D_0)$ e $\overrightarrow{in}(D_1)$ é no máximo 1. Como $\overrightarrow{in}(D_0)$ é o valor mínimo dentre todas as orientações do grafo G, esse valor não pode decrescer, logo, $\overrightarrow{in}(D_1) \in \{\overrightarrow{in}(D_0), \overrightarrow{in}(D_0)+1\}$. Em ambos os casos, S_n é contínuo.

Assuma para um inteiro n tal que $1 \leq n < m$ que a proposição é válida para todos os passos até n, ou seja, $S_1, S_2, \ldots, S_n$ são todos contínuos e que iniciam em $\overrightarrow{in}(D_0)$, seja $i_{\min} = \overrightarrow{in}(D_0)$. Neste caso, temos que $S_n = \{i_{\min}, \ldots, i_n\}$ (alvaro: usar apenas uma notação para indicar o mínimo do conjunto e indicar que i_{min} é o menor valor de S_n e também do espectro e manter o i_n como máximo atual, talvez isso possa ser citado diretamente nos casos), onde i_n é o maior valor obtido até a orientação D_n.

Precisamos mostrar que $S_{n+1} = S_n \cup \{\overrightarrow{in}(D_{n+1})\}$ é contínuo. Pelo lema 4.1 temos que $\overrightarrow{in}(D_{n+1}) \in \{\overrightarrow{in}(D_n) - 1, \overrightarrow{in}(D_n), \overrightarrow{in}(D_n) + 1\}$. Pela hipótese indutiva, S_n é contínuo e contém $\overrightarrow{in}(D_n)$, logo, analisamos os seguintes casos:

Caso 1: Se $\overrightarrow{in}(D_{n+1}) = \overrightarrow{in}(D_n)$, o valor obtido já existe no conjunto S_n. Portanto, $S_n = S_{n+1}$ e contínuo.

Caso 2: Se $\overrightarrow{in}(D_{n+1}) = \overrightarrow{in}(D_n) - 1$, como $i_{\min}$ é o valor mínimo, o novo valor não pode ser menor que $i_{\min}$. Como o mesmo é estritamente menor que i_n, o valor $\overrightarrow{in}(D_n) - 1$ já existe em S_n pela hipótese de indução. Portanto, $S_n = S_{n+1}$, contínuo.

Caso 3: Se $\overrightarrow{in}(D_{n+1}) = \overrightarrow{in}(D_n) + 1$, caso $\overrightarrow{in}(D_n)$ seja menor que i_n, o novo valor já está em S_n. O único caso em que o conjunto aumenta é quando $\overrightarrow{in}(D_n) = i_n$, neste caso, $\overrightarrow{in}(D_{n+1}) = i_n + 1$ e o limite superior aumenta em no máximo um. Portanto, S_{n+1} é contínuo.

Com isso, temos que o espectro do número de intervalo na convexidade $\overrightarrow{P_3}$ é contínuo.

□

4.2 Limitantes do espectro do número de intervalo em árvores, caminhos e ciclos

Teorema 4.2. *Seja G um grafo com $n \geq 3$ vértices. O espectro do número de intervalo na convexidade $\overrightarrow{P}_3$, denotado por $S_{\overrightarrow{P_3}}(G)$, é um intervalo contínuo de inteiros definido da seguinte forma para classes abaixo:*

- ***Para árvores*** *T:* $S_{\overrightarrow{P_3}}(T) = \{in^-(T), \ldots, n\}$, *onde* $in^-(T)$ *é o menor valor do número de intervalo entre todas as orientações.*
- ***Para caminhos*** *P_n:* $S_{\overrightarrow{P_3}}(P_n) = \{\lceil \frac{n+1}{2} \rceil, \ldots, n\}$.
- ***Para ciclos*** *C_n:* $S_{\overrightarrow{P_3}}(C_n) = \{\lceil \frac{n}{2} \rceil, \ldots, n-1\}$ *se n for ímpar, e* $S_{\overrightarrow{P_3}}(C_n) = \{\frac{n}{2}, \ldots, n\}$ *se n for par.*

Demonstração. A demonstração divide-se na análise dos limites extremos para cada classe e, subsequentemente, na prova da continuidade do espectro entre esses limites.

1. **Limites Superiores:** Em (CHARTRAND *et al.*, 2002) temos que um vértice é extremo se ele é fonte, sumidouro ou transitivo. Além disso, todos os vértices extremos em um grafo orientado conexo devem estar em um conjunto de envoltória (GARY *et al.*, 2003). Como árvores, caminhos e ciclos pares são grafos bipartidos(WEST, 2001), é possível orientar suas arestas de modo que uma partição A do conjunto de vértices contenha apenas fontes e uma partição B contenha apenas sumidouros. Nessa orientação, todos os vértices são considerados extremos, portanto, $\overrightarrow{in}(D)_T = \overrightarrow{in}(D)_{P_n} = \overrightarrow{in}(D)_{C_{2k}} = n$. Por outro lado, por conta da paridade, ciclos ímpares não são bipartidos. É fácil ver que pelo menos um vértice no ciclo terá vizinho de entrada e um vizinho de saída para maximizar o número de vértices extremos, logo, obtemos $in(D)_{C_{2k+1}} = n-1$.
2. **Limites Inferiores:** Pela função de intervalo da convexidade $\overrightarrow{P_3}$ se o vértice v tem pelo menos um vizinho de saída e um vizinho de entrada no conjunto de envoltória S, $v \in S$. Consequentemente, os vértices que pertencem a $V(G) \setminus S$ formam, obrigatoriamente, um conjunto independente no grafo.

   Para ciclos C_n, o tamanho máximo de um conjunto independente é $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, impondo um valor mínimo para o número de vértices que estão em um conjunto de envoltória de $n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor = \lceil \frac{n}{2} \rceil$, limite este alcançado quando a orientação é um ciclo direcionado.

   Para caminhos P_n, os vértices das extremidades são folhas, logo são vértices extremos e devem pertencer a um conjunto de envoltória S. Os $n-2$ vértices internos formam um subcaminho cujo maior conjunto independente tem tamanho $\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor$. Assim, o tamanho mínimo de S é

$2+(n-2)-\lfloor\frac{n-2}{2}\rfloor=\lceil\frac{n+1}{2}\rceil$, limite alcançado orientando o caminho para uma só direção.

3. **Continuidade do Espectro:** Pelo Teorema4.1, temos de forma direta que o espectro para árvores, caminhos e ciclos são contínuos.

□

5 ALGORITMO POLINOMIAL PARA CONJUNTO DE INTERVALO NA CONVEXIDADE P3 ORIENTADA

Introduzir os conceitos de MSO_1 e largura em árvore para falar dos resultados do pedro aqui em seguida apresentar o contexto para os algoritmos explicitos para interval set e hull set. Ver teorema 2.4.1 trab pedro

Apresentamos o seguinte algoritmo para calcular o *Interval Set* em árvores orientadas. Consideremos $S \subseteq V(T)$ um conjunto de intervalo e que qualquer vértice extremo v obrigatoriamente está em S, seja $Ext(T)$ o conjunto de vértices extremos em T.

Teorema 5.1. *Algoritmo1 retorna o menor conjunto de intervalo para a árvore T*

Demonstração. Seja $I^* = (i_1^*, \ldots, i_j^*, \ldots, i_n^*)$ uma sequência de escolhas ótimas para obtermos o *Interval Set* de T, onde $i_i^* = 1$ se o vértice v_i está no *conjunto de intervalo* e 0 caso contrário. Além disso, seja $S = (s_1, \ldots, s_j, \ldots, s_n)$ a sequência de escolhas feita pelo *Algoritmo 1*. Se $I^* = S$, está resolvido. Suponha que $I^* \neq S$, neste caso, seja i a primeira posição em que as sequências diferem.

Suponha primeiro que $i_i^* = 0$ e $s_i = 1$, ou seja, o vértice v_i foi escolhido pelo *algoritmo* mas não pela sequência I^*. Com isso temos os seguintes casos:

1. Neste caso, v_i entrou na condicional **15**, como I^* e S concordam em todas as posições anteriores a i, temos que os filhos de v_i não estão em I^*, caso contrário, o algoritmo não entraria na condicional 15. O único vizinho restante de v_i é seu pai π, mas mesmo que $\pi \in I^*$, se $v_i \notin I^*$, então v_i não seria gerado por I^*, contradizendo o fato de I^* ser *Interval Set*.
2. Neste caso, v_i entrou na condicional **22**, como I^* e S concordam em todos os filhos de v_i, então v_i possui pelo menos um filho em $N^-(v_i)$ que está em S, mas nenhum filho em $N^+(v_i)$ que está em S. Além disso, o pai $\pi \in N^-(v_i)$. O único vizinho restante de v_i é seu pai π, mas mesmo que I^* escolha π, como $\pi \in N^-(v_i)$ e $I^* \cap N^+(v_i) = \emptyset$, então I^* não gera v_i, um absurdo.
3. Condicional **31** é análoga ao caso anterior.

Agora suponha que $i_i^* = 1$ e $s_i = 0$, ou seja, o vértice v_i foi escolhido pela sequência I^* mas não pelo *algoritmo*. Com isso temos os seguintes casos:

1. O algoritmo não escolheu v_i pois entrou na condicional **19**. Como $v_i \in I^*$, então seu pai $\pi \notin I^*$, pois caso contrário, obteríamos um conjunto de intervalo menor, neste caso,

Algoritmo 1: Interval Set em Árvores orientadas

Entrada: $T, Ext(T)$
Saída: *Interval Set de T*

Inicialize $r^-(v) = 1$ e $r^+(v) = 1$ para todo $v \in V(T)$
$S \leftarrow Ext(T)$
Seja $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ uma pós-ordem de T
para $i \leftarrow 1, 2, \ldots, n$ **faça**
    Seja π pai de v_i em T
    se $v \in S$ **então**
        se $\pi \in N^+(v)$ **então**
            $r^-(\pi) \leftarrow r^-(\pi) - 1$
        fim
        se $\pi \in N^-(v)$ **então**
            $r^+(\pi) \leftarrow r^+(\pi) - 1$
        fim
    fim
    se $v \notin S$ **então**
        se $r^-(v) = 1$ *e* $r^+(v) = 1$ **então**
            $S \leftarrow S \cup \{v\}$
        fim
        se $r^-(v) \leq 0$ *e* $r^+(v) = 1$ **então**
            se $\pi \in N^+(v)$ *e* $\pi \notin S$ **então**
                $S \leftarrow S \cup \{\pi\}$
            fim
            se $\pi \in N^-(v)$ **então**
                $S \leftarrow S \cup \{v\}$
                $r^+(\pi) \leftarrow r^+(\pi) - 1$
            fim
        fim
        se $r^-(v) = 1$ *e* $r^+(v) \leq 0$ **então**
            se $\pi \in N^-(v)$ *e* $\pi \notin S$ **então**
                $S \leftarrow S \cup \{\pi\}$
            fim
            se $\pi \in N^+(v)$ **então**
                $S \leftarrow S \cup \{v\}$
                $r^-(\pi) \leftarrow r^-(\pi) - 1$
            fim
        fim
    fim
fim

$I^* \setminus \{v_i\}$. Mas perceba que $I'^* = I^* \setminus \{v_i\} \cup \{\pi\}$ continua sendo conjunto de intervalo tal que $|I^*| = |I'^*|$, portanto, mínimo e concorda em mais uma posição com a sequência S.

2. Condicional **28** é análoga ao caso anterior.

□

6 RESULTADOS DE COMPLEXIDADE EM GRAFOS PLANARES

(alvaro: Alguma coisa aqui para introduzir) pode ser uma introdução sobre complexidade computacional

6.1 NP-completude para grafos planares orientados

Em (CENTENO *et al.*, 2009), foi provado que no caso não orientado, decidir se o número de intervalo (in_{P_3}) é no máximo k é um problema NP-completo. Posteriormente, (PENSO *et al.*, 2015) mostraram que o problema continua NP-completo mesmo em grafos planares com grau máximo 3. Além disso, em(PENSO *et al.*, 2015), é apresentado o problema PLANAR SAT-AM3 .

PLANAR SAT-AM3

Entrada: Um conjunto de cláusulas $F = \{C_1, C_2, \ldots, C_m\}$, um conjunto finito de variáveis booleanas $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, onde cada cláusula contém no máximo 3 literais, cada variável aparece no máximo 3 vezes, cada literal ocorre no máximo 2 vezes e o grafo bipartido $H_F = (V, E)$ tal que $V = \{w_{c_1}, w_{c_2}, \ldots, w_{c_m}\} \cup \{v_{x_1}, v_{x_2}, \ldots, v_{x_n}\}$ e E contém exatamente os pares (w_{c_i}, v_{x_j}) tal que x_j ou $\overline{x_j}$ pertencem a cláusula C_i, é planar

Problema: Existe alguma valoração de valores verdadeiros as variáveis de X que satisfaz F?

Teorema 6.1 ((PENSO *et al.*, 2015))**.** PLANAR SAT-AM3 *é NP-completo*

Muitos conceitos de convexidade em grafos se estendem aos grafos orientados. Tendo como base o resultado de (PENSO *et al.*, 2015) faremos uma redução do problema PLANAR SAT-AM3 para o problema do NÚMERO DE INTERVALO $\overrightarrow{in_{P_3}}$.

NÚMERO DE INTERVALO $\overrightarrow{in_{P_3}}$

Entrada: Um grafo planar orientado D e um inteiro positivo k

Problema: $\overrightarrow{in_{P_3}} \leq k$?

Teorema 6.2. NÚMERO DE INTERVALO $\overrightarrow{in_{P_3}}$ *é* NP*-completo* .

Demonstração. Essa demonstração é similar ao resultado não direcionado apresentado em (PENSO *et al.*, 2015). Podemos ver que NÚMERO DE INTERVALO $\overrightarrow{in_{P_3}}$ está em NP tendo um subconjunto S de vértices de um grafo direcionado D como certificado. Neste caso, basta verificar o tamanho do subconjunto S e para cada $v \in V(D) \backslash S$, verificar se existe pelo menos um vértice $v_1 \in N^+(v)$ e pelo menos um vértice $v_2 \in N^-(v)$ que estão em S.

Para provar a NP-completude, faremos uma redução do problema PLANAR SAT-AM3 para NÚMERO DE INTERVALO $\overrightarrow{in_{P_3}}$. Seja F uma instância de PLANAR SAT-AM3 , construíremos um grafo orientado D da seguinte forma:

- Para cada variável x_i, criamos em D um *gadget* d_{x_i} composta pelo ciclo direcionado $f^1_{x_i}, t^1_{x_i}, a^1_{x_i}, a^2_{x_i}, f^2_{x_i}, t^2_{x_i}, a^3_{x_i}, a^4_{x_i}$;
- Para cada cláusula com no máximo 2 literais, criamos em D um *gadget* d_{c_j} composta pelos vértices c^1_j e c^2_j e o arco (c^2_j, c^1_j);
- Para cada cláusula com exatamente 3 literais, criamos em D um *gadget* d_{x_i} composta pelos vértices $c^1_j, c^2_j, c^3_j, l^1_j, l^2_j$ e os arcos (c^2_j, c^1_j), (c^1_j, c^3_j), (c^3_j, l^2_j) e (c^1_j, l^1_j)

Considerando a representação plana do grafo H_F como um *template* para o grafo orientado D, adicionamos arcos que conectam os *gadgets* da seguinte forma:

- Se a variável x_i aparece positiva (respectivamente, negativa) na cláusula C_j, adicionamos o arco $(t^a_{x_i}, c^b_j)$ (respectivamente, $(f^a_{x_i}, c^b_j)$), onde $a \in \{1,2\}$ e $b \in \{2,3\}$.
- Se a cláusula contém no máximo 2 literais, o único vértice conector é o vértice c^2_j. Por outro lado, se a cláusula tem exatamente 3 literais, os conectores são apenas c^2_j e c^3_j. Neste caso, c^2_j terá 2 vizinhos de entrada e c^3_j terá exatamente 1 vizinho de entrada.
  (alvaro: a única forma de garantir isso é tendo grau de entrada no máximo 2?)
- Neste caso, o grafo orientado D tem grau de entrada máximo igual a 2

Vamos demonstrar que dada uma instância F de PLANAR SAT-AM3 , onde n é o número de variáveis, m_1 é o número de cláusulas com no máximo 2 literais e m_2 é o número de cláusulas com exatamente 3 literais, F é satisfatível se e somente se o grafo orientado D obtido na construção acima tem um conjunto de intervalo $\overrightarrow{P_3}$ de tamanho $k = 4n + m_1 + 3m_2$.

Seja F uma fórmula PLANAR SAT-AM3 e A uma atribuição de valores verdadeiros para F. Construímos um conjunto de intervalo S_A da seguinte forma:

1. Todos os vértices extremos são adicionados a S_A
2. Se $x_i = verdadeiro$ em A, adicionamos os seguintes vértices a S_A: $t^1_{x_i}, t^2_{x_i}, a^2_{x_i}, a^4_{x_i}$
3. Se $x_i = falso$ em A, adicionamos os seguintes vértices a S_A: $f^1_{x_i}, f^2_{x_i}, a^1_{x_i}, a^3_{x_i}$

4. Para cada cláusula com exatamente 3 literais, seja $v \neq c_j^1$, se o vértice $v \in N^-(c_j^3)$ está em S_A , então adicionamos o vértice c_j^2 a S_A, caso contrário, adicionamos o vértice c_j^1.
5. Como A é uma atribuição de valores verdade, cada cláusula deve ser satisfeita, com isso temos que cada *gadget* d_{c_j} de D deve ter pelo menos um vizinho no conjunto de intervalo S_A que estão em algum d_{x_i}. Portanto, S_A é um conjunto de intervalo tal que $|S_A| = 4n + m_1 + 3m_2$.

Por outro lado, seja $S_A \subseteq V(D)$ um conjunto de intervalo tal que $|S_A| = 4n + m_1 + 3m_2 = k$, obtemos uma atribuição de valores A da seguinte forma:

1. Todo vértice extremo está em S_A (alvaro: usar a referencia para garantir a escrita dessa forma)
2. Pelo menos um vértice do *gadget* d_{c_j} quando a cláusula tem até 2 literais deve estar em S_A e pelo menos 3 vértices do *gadget* d_{c_j} quando a cláusula tem exatamente 3 literais devem estar em S_A. Como $|S_A| = k$, temos que exatamente 4 vértices do *gadget* d_{x_i} devem estar em S_A. Pela construção do digrafo D, vemos que as únicas configurações possíveis são: Adicionar os vértices $\{t_{x_i}^1, t_{x_i}^2, a_{x_i}^2, a_{x_i}^4\}$ ao conjunto S_A ou adicionar os vértices $\{f_{x_i}^1, f_{x_i}^2, a_{x_i}^1, a_{x_i}^3\}$.
3. Com isso, $x_i = \textit{verdadeiro}$ se e somente se $\{t_{x_i}^1, t_{x_i}^2, a_{x_i}^2, a_{x_i}^4\} \in S_A$. Desta forma, temos que cada *gadget* d_{c_j} deve ter um vizinho em S_A, se não, S_A não seria um conjunto de intervalo do digrafo D ou $|S_A| > k$, já que mais vértices em cada *gadget* de cláusula estariam em S_A. Portanto, se D tem um conjunto de intervalo de tamanho $4n + m_1 + 3m_2$, então, a fórmula F é satisfeita.

□

Naturalmente, temos que além do número de intervalo, outro parâmetro bastante estudado é o número de envoltória que também se estende aos grafos orientados. Tendo com base o resultado de (PENSO *et al.*, 2015) faremos uma redução do problema PLANAR SAT-AM3 para o problema NÚMERO DE ENVOLTÓRIA $\overrightarrow{hn_{P_3}}$.

NÚMERO DE ENVOLTÓRIA $\overrightarrow{hn_{P_3}}$

Entrada: Um grafo planar orientado D e um inteiro positivo k
Problema: $\overrightarrow{hn_{P_3}} \leq k$?

Teorema 6.3. NÚMERO DE ENVOLTÓRIA $\overrightarrow{hn_{P_3}}$ *é* NP*-completo*

Demonstração. □

7 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J.; DOURADO, M.; PROTTI, F.; SAMPAIO, R. **Uma introdução à convexidade em grafos**. [S.l.]: Editora do IMPA, 2023.

BANG-JENSEN, J.; GUTIN, G. **Digraphs: Theory, Algorithms, and Applications**. Springer, 2001. (Monographs in Mathematics). ISBN 9781852332686. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=d3gpAQAAMAAJ>.

CENTENO, C. C.; DOURADO, M. C.; SZWARCFITER, J. L. On the convexity of paths of length two in undirected graphs. **Electronic Notes in Discrete Mathematics**, v. 32, p. 11–18, 2009. ISSN 1571-0653. DIMAP Workshop on Algorithmic Graph Theory. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571065309000043>.

CHANG, G. J.; TONG, L.-D.; WANG, H.-T. Geodetic spectra of graphs. **European Journal of Combinatorics**, v. 25, n. 3, p. 383–391, 2004. ISSN 0195-6698.

CHARTRAND, G.; Frederick Fink, J.; ZHANG, P. Convexity in oriented graphs. **Discrete Applied Mathematics**, v. 116, n. 1, p. 115–126, 2002. ISSN 0166-218X. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X00003826>.

ERDöS, P.; FRIED, E.; HAJNAL, A.; MILNER, E. Some remarks on simple tournaments. **Algebra Universalis**, v. 2, p. 238–245, 12 1972.

GARY, C.; FINK, J.; PING, Z. The hull number of an oriented graph. **International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences**, v. 2003, 06 2003.

HARARY, F.; LOUKAKIS, E.; TSOUROS, C. The geodetic number of a graph. **Mathematical and Computer Modelling**, v. 17, n. 11, p. 89–95, 1993. ISSN 0895-7177. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0895717793902592>.

HARARY, F.; NIEMINEN, J. Convexity in graphs. **Journal of Differential Geometry**, v. 16, p. 185–190, 1981.

PENSO, L. D.; PROTTI, F.; RAUTENBACH, D.; dos Santos Souza, U. Complexity analysis of p3-convexity problems on bounded-degree and planar graphs. **Theoretical Computer Science**, v. 607, p. 83–95, 2015. Algorithmic Aspects in Information and Management.

WEST, D. **Introduction to Graph Theory**. Prentice Hall, 2001. (Featured Titles for Graph Theory). ISBN 9780130144003. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=TuvuAAAAMAAJ>.