

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
2.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
3.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
4.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
5.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
6.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
7.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
8.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
9.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
10.

(a)

X

(b)

(c)


(d)

1. Escenario:


El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 12000 - Cuando el ticket cuesta 56, el snack cuesta 6000
Esto muestra una relacion lineal decreciente entre las variables.


- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente mostrada en los datos.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion lineal continua.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion decreciente mostrada en la tabla.

2. Escenario:


El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 12000 - Cuando el ticket cuesta 56, el snack cuesta 6000
Esto muestra una relacion lineal decreciente entre las variables.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente mostrada en los datos.


- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion lineal continua.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion decreciente mostrada en la tabla.

3. Escenario:


El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla. Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 12000 - Cuando el ticket cuesta 56, el snack cuesta 6000 Esto muestra una relacion lineal decreciente entre las variables.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente mostrada en los datos.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion lineal continua.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion decreciente mostrada en la tabla.


4. Escenario:

El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B




a)


Opción D



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 12000 - Cuando el ticket cuesta 56, el snack cuesta 6000
Esto muestra una relacion lineal decreciente entre las variables.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente mostrada en los datos.


- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion lineal continua.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion decreciente mostrada en la tabla.

5. Escenario:


El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla. Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 12000 - Cuando el ticket cuesta 56, el snack cuesta 6000 Esto muestra una relacion lineal decreciente entre las variables.


- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente mostrada en los datos.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion lineal continua.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion decreciente mostrada en la tabla.

6. Escenario:


El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 12000 - Cuando el ticket cuesta 56, el snack cuesta 6000
Esto muestra una relacion lineal decreciente entre las variables.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente mostrada en los datos.


- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion lineal continua.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion decreciente mostrada en la tabla.

7. Escenario:


El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 12000 - Cuando el ticket cuesta 56, el snack cuesta 6000
Esto muestra una relacion lineal decreciente entre las variables.


- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente mostrada en los datos.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion lineal continua.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion decreciente mostrada en la tabla.

8. Escenario:


El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 12000 - Cuando el ticket cuesta 56, el snack cuesta 6000
Esto muestra una relacion lineal decreciente entre las variables.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente mostrada en los datos.


- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion lineal continua.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion decreciente mostrada en la tabla.

9. Escenario:


El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla. Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 12000 - Cuando el ticket cuesta 56, el snack cuesta 6000 Esto muestra una relacion lineal decreciente entre las variables.


- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente mostrada en los datos.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion lineal continua.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion decreciente mostrada en la tabla.

10. Escenario:


El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 12000 - Cuando el ticket cuesta 56, el snack cuesta 6000
Esto muestra una relacion lineal decreciente entre las variables.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente mostrada en los datos.

- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion lineal continua.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion decreciente mostrada en la tabla.