

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

X

(b)

X

(c)

(d)

X

(e)

X
2.

(a)

X

(b)

X

(c)

(d)

X

(e)
3.

(a)

(b)

(c)

(d)

X

(e)

X
4.

(a)

X

(b)

X

(c)

(d)

X

(e)
5.

(a)

X

(b)

X

(c)


(d)

X

(e)

1. **Escenario:**

En la siguiente figura se representan las distribuciones de una variable dada por dos muestras (A y B) mediante diagramas de caja paralelos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? *(Comentario: Las afirmaciones son o bien correctas o claramente incorrectas.)*




- a) La ubicación de ambas distribuciones es aproximadamente la misma.
- b) Ambas distribuciones no contienen valores atípicos.
- c) La dispersión en la muestra A es claramente mayor que en B.
- d) La asimetría de ambas muestras es similar.
- e) La distribución B es aproximadamente simétrica.

Retroalimentación:

- a) Verdadero. Ambas distribuciones tienen una ubicación similar.
- b) Verdadero. Ambas distribuciones no tienen observaciones que se desvíen más de 1.5 veces el rango intercuartílico desde la caja.
- c) Falso. El rango intercuartílico en la muestra A es textitno claramente mayor que en B.
- d) Verdadero. La asimetría de ambas distribuciones es similar, ambas son aproximadamente simétricas.
- e) Verdadero. La distribución B es aproximadamente simétrica.

2. **Escenario:**

En la siguiente figura se representan las distribuciones de una variable dada por dos muestras (A y B) mediante diagramas de caja paralelos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? *(Comentario: Las afirmaciones son o bien correctas o claramente incorrectas.)*




- a) La ubicación de ambas distribuciones es aproximadamente la misma.
- b) Ambas distribuciones no contienen valores atípicos.
- c) La dispersión en la muestra A es claramente mayor que en B.
- d) La asimetría de ambas muestras es similar.
- e) La distribución A es sesgada a la derecha.

Retroalimentación:

- a) Verdadero. Ambas distribuciones tienen una ubicación similar.
- b) Verdadero. Ambas distribuciones no tienen observaciones que se desvíen más de 1.5 veces el rango intercuartílico desde la caja.
- c) Falso. El rango intercuartílico en la muestra A es textitno claramente mayor que en B.
- d) Verdadero. La asimetría de ambas distribuciones es similar, ambas son aproximadamente simétricas.
- e) Falso. La distribución A es aproximadamente simétrica.

3. Escenario:

En la siguiente figura se representan las distribuciones de una variable dada por dos muestras (A y B) mediante diagramas de caja paralelos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? *(Comentario: Las afirmaciones son o bien correctas o claramente incorrectas.)*




- a) La ubicación de ambas distribuciones es aproximadamente la misma.
- b) Ambas distribuciones no contienen valores atípicos.
- c) La dispersión en la muestra A es claramente mayor que en B.
- d) La asimetría de ambas muestras es similar.
- e) La distribución A es aproximadamente simétrica.

Retroalimentación:

- a) Falso. La distribución A tiene en promedio valores más altos que la distribución B.
- b) Falso. Hay observaciones que se desvían más de 1.5 veces el rango intercuartílico desde la caja.
- c) Falso. El rango intercuartílico en la muestra A es textitno claramente mayor que en B.
- d) Verdadero. La asimetría de ambas distribuciones es similar, ambas son aproximadamente simétricas.
- e) Verdadero. La distribución A es aproximadamente simétrica.

4. Escenario:

En la siguiente figura se representan las distribuciones de una variable dada por dos muestras (A y B) mediante diagramas de caja paralelos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? *(Comentario: Las afirmaciones son o bien correctas o claramente incorrectas.)*




- a) La ubicación de ambas distribuciones es aproximadamente la misma.
- b) Ambas distribuciones no contienen valores atípicos.
- c) La dispersión en la muestra A es claramente mayor que en B.
- d) La asimetría de ambas muestras es similar.
- e) La distribución A es sesgada a la derecha.

Retroalimentación:

- a) Verdadero. Ambas distribuciones tienen una ubicación similar.
- b) Verdadero. Ambas distribuciones no tienen observaciones que se desvíen más de 1.5 veces el rango intercuartílico desde la caja.
- c) Falso. El rango intercuartílico en la muestra A es textitno claramente mayor que en B.
- d) Verdadero. La asimetría de ambas distribuciones es similar, ambas son aproximadamente simétricas.
- e) Falso. La distribución A es aproximadamente simétrica.

5. Escenario:

En la siguiente figura se representan las distribuciones de una variable dada por dos muestras (A y B) mediante diagramas de caja paralelos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? *(Comentario: Las afirmaciones son o bien correctas o claramente incorrectas.)*



- a) La ubicación de ambas distribuciones es aproximadamente la misma.
- b) Ambas distribuciones no contienen valores atípicos.
- c) La dispersión en la muestra A es claramente mayor que en B.
- d) La asimetría de ambas muestras es similar.
- e) La distribución B es sesgada a la izquierda.

Retroalimentación:

- a) Verdadero. Ambas distribuciones tienen una ubicación similar.
- b) Verdadero. Ambas distribuciones no tienen observaciones que se desvíen más de 1.5 veces el rango intercuartílico desde la caja.
- c) Falso. El rango intercuartílico en la muestra A es textitno claramente mayor que en B.
- d) Verdadero. La asimetría de ambas distribuciones es similar, ambas son sesgadas a la derecha.
- e) Falso. La distribución B es sesgada a la derecha.