

INFORME EVOLUTIVO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Paciente: Fernández Soto, Andrés (67 años) | Historia Clínica: HC-992014 | Fecha: 22/06/2026 | PSA Sérico: 18.50 ng/mL

Estudio histológico de biopsia prostática por punción ecoguiada remitida en diez cilindros cilíndricos de tejido. Al examen microscópico se evidencia en la práctica totalidad de los cilindros del lóbulo derecho (4 cilindros) y en dos cilindros del lóbulo izquierdo una neoplasia epitelial maligna indiferenciada constituida por sábanas sólidas y cordones de células atípicas con marcada anaplasia nuclear y mitosis frecuentes. Dicha arquitectura histológica se corresponde con un patrón cribiforme con áreas de necrosis comedocarcionatosa, catalogándose como adenocarcinoma acinar de próstata con un Gleason score primario 4 y secundario 5, alcanzando una suma de Gleason de 9 (4+5) correspondiente al grupo ISUP grado 5. El porcentaje máximo de ocupación tumoral se sitúa en el 80% en los cilindros apicales derechos. Se comprueba de manera inequívoca la infiltración de espacios perineurales en 3 de las muestras, así como sospecha de afectación del tejido adiposo peri-prostático. En total se computan 6 cilindros afectados sobre un total de 10 evaluados, catalogándose el cuadro dentro del grupo de Alto Riesgo oncológico según las guías clínicas de la EAU.

Informe validado electrónicamente.