

INFORME DE RIESGOS DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

SISTEMA AGRO-PREDICT

Fecha del informe: 23/06/2026

Cultivos analizados: 1

Total plagas/enfermedades: 24

Nivel ALTO: 11 Nivel MEDIO: 11 Nivel BAJO: 2

■ ALTA ■ MEDIA ■ BAJA

FUENTES DE DATOS UTILIZADAS

Los datos utilizados para el cálculo de predicciones de riesgos proceden de el ente público del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). Su servicio de predicciones ante plagas se ve limitado únicamente para cultivos que pertenezcan a grupos de cultivo como CEREALES y LEGUMINOSOS. Internamente utiliza datos meteorológicos de sus estaciones meteorológicas que transforma en riesgos semanales por cada plaga, de forma anual.

Fuente de datos	Descripción	Detalle
Servicio público meteorológico (ITACyL)	Entidad pública dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.	Provincia Castilla y León - Datos plagas

1. CULTIVO: MAIZ (Cereales)

Total amenazas identificadas: 24 | Alta: 11 | Media: 11 | Baja: 2

Tabla resumen

Nombre	Tipo	Agente Causante	Riesgo
CHINCHES	Plaga	Aelia spp., Eurygaster spp.,...	MEDIA
CONCHUDOS	Plaga	Tropinota spp., Oxythyrea spp.	ALTA
FUSARIOSIS de espiga	Enfermedad	Fusarium spp., Microdochium spp.	MEDIA
GORGHOJO DEL TRIGO	Plaga	Sitophilus granarius L.	ALTA
GUSANO DE ALAMBRE	Plaga	Agriotes spp., Gonocephalum spp.,...	BAJA
HELMINTOSPORIOSIS	Enfermedad	Drechslera teres	MEDIA
LEMA	Plaga	Oulema melanopa	BAJA

Nombre	Tipo	Agente Causante	Riesgo
MANCHA OVAL u OCELAR	Enfermedad	Oculimacula sp.	MEDIA
NEFASIA	Plaga	Cnephasia pumicana	ALTA
NEMÁTODO DE LA ESPIGA	Plaga	Anguina sp.	ALTA
OÍDIO	Enfermedad	Blumeria (Erysiphe) graminis	MEDIA
OSCINELLA	Plaga	Oscinella frit	MEDIA
PIE NEGRO	Enfermedad	Gaeumannomyces spp.	ALTA
PULGÓN	Plaga	Rhopalosiphum spp., Sitobium avenae,...	MEDIA
RINCOSPORIOSIS	Enfermedad	Rhynchosporium secalis	MEDIA
RIZOCTONIA	Enfermedad	Rhizoctonia spp.	ALTA
ROYA AMARILLA	Enfermedad	Puccinia striiformis f. sp. tritici	ALTA
ROYA NEGRA o ROYA DEL TALLO	Enfermedad	Puccinia graminis	ALTA
ROYA PARDA	Enfermedad	Puccinia recondita, Puccinia hordei	ALTA
SEPTORIA	Enfermedad	Septoria tritici y Septoria nodorum	ALTA
Tronchaespigas, CALAMOBIUS	Plaga	Calamobius filum	ALTA
Tronchaespigas, CÉFIDOS	Plaga	Trachelus tabidus y Cephus pygmaeus	MEDIA
VIRUS DEL ENANISMO EN TRIGO (WDV)	Enfermedad	Psammotettix alienus Dahlb.; Macrosteles laevis Rib.	MEDIA
ZABRO	Plaga	Zabrus tenebrioides	MEDIA

Fichas de plaga/enfermedad detalladas por nivel de riesgo

CONCHUDOS — Plaga — Riesgo: ALTA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Tropinota spp., Oxythyrea spp.	Primavera a primeros de julio	Periodo crítico de primavera a primeros de julio	https://plagas.itacyl.es/conchudos	ALTA

GORGHO DEL TRIGO — Plaga — Riesgo: ALTA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Sitophilus granarius L.	Permanecen en el granero durante todo el año, pero necesitan temperaturas de 13-35° C, humedad ambiental > del 50% y en granos con un contenido de humedad > del 9,5% (marzo-septiembre)	Los gorgojos necesitan temperaturas superiores a 13° C para reproducirse, y permanecen en el almacén durante todo el año	https://plagas.itacyl.es/gorgojo-del-trigo	ALTA

NEFASIA — Plaga — Riesgo: ALTA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Cnephasia pumicana	Antes del espigado-maduración	Periodo crítico desde antes del espigado o maduración	https://plagas.itacyl.es/nefasia	ALTA

NEMÁTODO DE LA ESPIGA — Plaga — Riesgo: ALTA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Anguina sp.	Todo el ciclo del cultivo (para su detección realizar observaciones de las espigas en maduración)	En lugar del grano, presenta una agalla con miles de nemátodos en su interior, que no son visibles	https://plagas.itacyl.es/anguina	ALTA

PIE NEGRO — Enfermedad — Riesgo: ALTA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Gaeumannomyces spp.	Especial riesgo de espigado hasta maduración del grano	Primaveras e inviernos lluviosos con encharcamientos favorecen su expansión. Condiciones favorables entre 5-28° C, con un óptimo de 15-20° C, y humedad alta (50-80%).	https://plagas.itacyl.es/pie-negro_cereal	ALTA

RIZOCTONIA — Enfermedad — Riesgo: ALTA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Rhizoctonia spp.	Desde ahijado hasta maduración del grano	Las condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de la enfermedad son temperaturas de 28-30°C y humedad del 90%	https://plagas.itacyl.es/rizoctonia_cereal	ALTA

ROYA AMARILLA — Enfermedad — Riesgo: ALTA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Puccinia striiformis f. sp. tritici	En todas las fases del cultivo, con especial atención a la aparición de primeros síntomas al inicio de la primavera	Las condiciones óptimas son primaveras con temperaturas frescas (10-15° C) y lluvias frecuentes que proporcionen humedad sobre las hojas.	https://plagas.itacyl.es/roya-amarilla	ALTA

ROYA NEGRA o ROYA DEL TALLO — Enfermedad — Riesgo: ALTA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Puccinia graminis	Estado reproductivo del cultivo	Puede desarrollarse rápidamente en periodos de lluvia o rocío (agua sobre las hojas durante 6-8 horas) y temperaturas moderadas (15-25° C)	https://plagas.itacyl.es/roya-negra-o-roya-del-tallo	ALTA

ROYA PARDAS — Enfermedad — Riesgo: ALTA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Puccinia recondita, Puccinia hordei	Final de encañado hasta maduración del grano	El cultivo es sensible en todas las fases de desarrollo. Las condiciones climáticas favorables son: temperaturas de 15-22° C, siendo 20° C la temperatura óptima, y alta humedad (un periodo de mojado de hoja o rocío de al menos 6 horas)	https://plagas.itacyl.es/roya-parda	ALTA

SEPTORIA — Enfermedad — Riesgo: ALTA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Septoria tritici y Septoria nodorum	Desde final de ahijado hasta la maduración de grano (proteger 2-3 últimas hojas)	Final del ahijado a maduración del grano con condiciones climáticas favorables de elevada humedad y temperatura de 15-20° C para comenzar a evidenciarse, con un óptimo de 20-25° C	https://plagas.itacyl.es/septoriosis	ALTA

Tronchaespigas, CALAMOBIOUS — Plaga — Riesgo: ALTA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Calamobius filum	Atención a los primeros vuelos de adultos (antes de las puestas)	Especial atención a los primeros vuelos de adultos, antes de las puestas	https://plagas.itacyl.es/tronchaespigas-calamobius	ALTA

CHINCHES — Plaga — Riesgo: MEDIA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Aelia spp., Eurygaster spp.,...	Primavera (especialmente hacia final del encañado)	Con temperaturas sobre 22° C inician la migración hacia las zonas de cereal	https://plagas.itacyl.es/chinches-de-los-cereales	MEDIA

FUSARIOSIS de espiga — Enfermedad — Riesgo: MEDIA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Fusarium spp., Microdochium spp.	Cualquier momento del ciclo con especial riesgo de espigado a floración	Las lluvias frecuentes que provocan una elevada humedad en el aire favorecen la aparición de fusariosis	https://plagas.itacyl.es/fusariosis	MEDIA

HELMINTOSPORIOSIS — Enfermedad — Riesgo: MEDIA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Drechslera teres	Desde encañado hasta llenado de grano (proteger 2-3 últimas hojas)	Infección en otoño-invierno, explotando en primavera (la fase inicial se produce en el momento de germinación de las semillas), bajo condiciones óptimas: inviernos y primaveras suaves (tª de 8 a 33° C, con un óptimo de 15 a 25° C) y humedad (de 10 a 30 horas de humedad en las hojas)	https://plagas.itacyl.es/helmintosporiosis	MEDIA

MANCHA OVAL u OCELAR — Enfermedad — Riesgo: MEDIA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Oculimacula sp.	Desde final de ahijado hasta encañado (dos nudos)	La infección se produce durante el ahijamiento pero los síntomas son visibles en estadios próximos a hoja bandera	https://plagas.itacyl.es/mancha-oval	MEDIA

OÍDIO — Enfermedad — Riesgo: MEDIA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Blumeria (Erysiphe) graminis	Desde encañado hasta llenado de grano	Temperaturas entre 15-22° C y humedad elevada (próxima al 100%) son las condiciones óptimas para su desarrollo	https://plagas.itacyl.es/oidio-en-cereal	MEDIA

OSCINELLA — Plaga — Riesgo: MEDIA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Oscinella frit	Especial atención en espigado	En Castilla y León la tendencia es 3 generaciones: Junio a octubre (daños granos)	https://plagas.itacyl.es/oscinella	MEDIA

PULGÓN — Plaga — Riesgo: MEDIA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Rhopalosiphum spp., Sitobium avenae,...	Especial atención en germinación y espigado (se puede alargar el ciclo por condiciones ambientales hasta el momento de la siembra, transmitiendo virus)	Especialmente transmisión del virus del enanismo amarillo de la cebada "BYDV"	https://plagas.itacyl.es/pulgones	MEDIA

RINCOSPORIOSIS — Enfermedad — Riesgo: MEDIA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Rhynchosporium secalis	Etapas de encañado (proteger 2-3 últimas hojas)	Infección en otoño-invierno, explotando en primavera, sobre todo en la etapa de encañado si coincide con las condiciones favorables: temperaturas frescas o moderadas (6-24° C) y lluvias frecuentes o humedad elevada	https://plagas.itacyl.es/rincosporiosis	MEDIA

Tronchaespigas, CÉFIDOS — Plaga — Riesgo: MEDIA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Trachelus tabidus y Cephus pygmaeus	Atención a los primeros vuelos hasta espigado	Periodo crítico desde marzo (inicio de vuelos y puestas), hasta espigado	https://plagas.itacyl.es/tronchaespigas-cefidis	MEDIA

VIRUS DEL ENANISMO EN TRIGO (WDV) — Enfermedad — Riesgo: MEDIA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Psammotettix alienus Dahlb.; Macrosteles laevis Rib.	En primavera y otoño. Transmitido por pulgones de forma persistente (asociado a la presencia de pulgones)	El virus se localiza en el núcleo de hojas y raíces del cereal	—	MEDIA

ZABRO — Plaga — Riesgo: MEDIA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Zabrus tenebrioides	Desde nascencia hasta encañado (a medida que se desarrolla el cereal los daños tienen menor efecto)	Principalmente entre nascencia del cultivo y encañado (durante los estados de larva). Aconsejable observar en la otoñada, previo a la siembra. Especial atención tras otoños suaves y lluviosos. Los adultos se alimentan de flores y granos bien formados o en estado lechoso, sin ocasionar pérdidas significativas	https://plagas.itacyl.es/zabro	MEDIA

GUSANO DE ALAMBRE — Plaga — Riesgo: BAJA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Agriotes spp., Gonocephalum spp.,...	En las primeras etapas de desarrollo del cultivo de girasol, durante la siembra y germinación de las semillas hasta los primeros estadios vegetativos de la emergencia, desde finales de abril a junio	En los meses de verano las larvas bajan a estratos más profundos buscando humedad, debido a que son muy sensibles al calor y sequía (mortalidad de larvas con la sequía)	https://plagas.itacyl.es/gusano-de-alambre	BAJA

LEMA — Plaga — Riesgo: BAJA

Agente Causante	Momento Crítico	Observaciones	Más información	Nivel Riesgo
Oulema melanopa	Primavera	Los adultos comienzan los vuelos a principios de primavera y realizan la puesta escalonadamente de abril a junio	https://plagas.itacyl.es/lema	BAJA