LABORATÓRIO



Atendimento.: 1385513

Paciente....: 403657 - ALYCE DOS SANTOS MARCULINO Sexo: F Data de Nasc: 04/09/2000 Idade: 20a 8m 28d

Convenio....: UNIMED EMPRESARIAL REGULAMENT.

Medico Sol..: UNIMED CAMPO GRANDE COOP TRAB MEDICOS

Pedido....: 931288 Origem Coleta: 35110102-POSTO COLETA I

Leito....:

Data do pedido: 02 de Junho de 2021 - 09:08 Data do laudo.: 02 de Junho de 2021 - 12:41

Data da coleta:02/06/2021 Hora da coleta:09:15

SOROLOGIA ANTICORPOS TOTAIS -SARS COV-2

Lote:545492 **validade:**06/2021

RESULTADO: Não reagente

INDICE: 0,079

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Valor de referência: Não reagente.: Inferior a 1,0

Indeterminado: 1,0

Reagente....:Superior a 1,0

NOTA:

· Um resultado não reagente para anticorpos anti-SARS-CoV-2 não excluiu a COVID-19 e não deve ser utilizado isoladamente para a susensão

do isolamento domiciliar. Resultados não reagentes podem ocorrer em paciente assintomáticos ou sintomáticos com SARS-CoV-2 detectado no exame de RT-PCR em qualquer

momento durante a evolução da infecção,principalmente, mas não exclusivamente, nos primeiros 20 dias do ínicio dos sintomas.

- Este exame não deve ser utilizado para avaliação de pacientes com sintomas respiratórios agudos. RT-PCR para SARS-CoV-2 e painel para vírus respiratórios são métodos laboratoiais indicados nesse contexto.
- No contexto clinico-epidemiológico apropriado, a detecção de anticorpos anti-SARS-CoV-2 ou demonstração de soroconversão pode indiar contato com o vírus, mas não necessariamente infecção e/ou transmissão atual.Portanto,resultados reagentes em exames sorológicos não podem ser usados como evid~encia absoluta da COVID-19, devendo ser interpretado por um médico com auxilio de dados clínicos e de responsabilidade do médico assistente.
- Até o presente momento, não há comprovação de que o surgimento de anticorpos após a infecção esteja associado com o desenvolvimento de imunidade de interrupção da transmissão do SARS-CoV-2.
- Raramente, esse exame pode sofrer inteferência de anticorpos circulantes que reagem com componentes do ensaio, podendo ocasionar resultados falsos-positivos ou falsos-negativos.

Apesar de improvável não se pode descartar a possibilidade de interfer~encia por suplementação de biotina.

- Este exame detecta anticorpos totais (IgA, IgG e IgM) contra o SARS-CoV-2.

Observação:

Camille Stefani Santos ferreira.

CAMILLE STEFANI SANTOS FERREIRA - CRBM: 29506

LABORATÓRIO



Atendimento.: 1385513

Paciente...: 403657 - ALYCE DOS SANTOS MARCULINO Sexo: F
Data de Nasc: 04/09/2000 Idade: 20a 8m 28d

Convenio....: UNIMED EMPRESARIAL REGULAMENT.

Medico Sol..: UNIMED CAMPO GRANDE COOP TRAB MEDICOS

Pedido.....: 931288 Origem Coleta: 35110102-POSTO COLETA I

Leito....:

Data do pedido: 02 de Junho de 2021 - 09:08 Data do laudo.: 02 de Junho de 2021 - 12:41

Camille Stefani Santos ferreira.

CAMILLE STEFANI SANTOS FERREIRA - CRBM: 29506