### Estimation and Hypothesis Testing 2 | Les estimateurs et les tests d'hypothèses 2

Christelle Zozoungbo

27 June/juin 2024



Covariate Adjustment | Ajustement des covariables

Cluster Randomization  $\mid$  Randomisation par grappe

Experiments with Multiple Arms | Les éxperiences avec plusiers bras

Factorial Design | La concéption factorielle



#### A Quick Reminder | *Un pétit rappel*

- Remember: Analyze as you randomize
- ► We prefer estimators that are unbiased and have greater precision

- ► N'oubliez pas : Analysez comme vous randomisez
- Nous préférons les estimateurs non biaisés et plus précis.



Covariate Adjustment | Ajustement des covariables



#### Estimator: Linear regression with covariates |

Estimateur : La régression linéaire avec des covariables

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 Z_i + \gamma X_i + e_i$$

- Including a **pre-treatment covariate** *X* that is *predictive of* the outcome variable in our regression model is called *covariate adjustment*.
- ► For example: pre-treatment measure of the outcome.
- ► This can bias our estimates, but improve their precision.

- L'inclusion d'une covariable pré-traitement X qui est prédictive de la variable de résultat dans notre modèle de régression est appelée ajustement des covariables.
- Par exemple: un mesure du résultat avant le traitement.
- Cela peut biaiser nos estimations, mais améliorer leur précision.



### Estimator: Linear regression with covariates | Estimateur : La régression linéaire avec des covariables

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 Z_i + \gamma X_i + e_i$$

- The coefficient on the treatment variable  $(\beta_1)$  is again our ATE.
- The coefficient on the covariate  $(\gamma)$  is *not* the causal effect of that variable.
- Le coefficient sur la variable de traitement  $(\beta_1)$  est encore notre ATE.
- Le coefficient de la covariable (γ) n'est pas l'effet causal de cette variable.



### Estimator: Linear regression with covariates | Estimateur : La régression linéaire avec des covariables

Table 4. Adoption for Parents Sampled for SAFI & Subsidy Programs			
	Used Fertilizer		
	Seas	on 1	
Panel A. 2004 Season 1 Treatments	(1)	(2)	
SAFI Season 1	0.114	0.143	
	(0.035)***	(0.038)***	
Starter Kit Farmer	0.059	0.080	
	(0.042)	(0.046)*	
Starter Kit Farmer * Demonstration Plot	-0.026	-0.061	
School	(0.060)	(0.066)	
Demonstration Plot School	0.006	0.441	
	(0.314)	(0.435)	
Household had Used Fertilizer Prior	0.369	0.315	
to Season 1	(0.031)***	(0.035)***	
Male		0.012	
		(0.033)	
Home has mud walls		-0.193	
		(0.081)**	
Education primary respondent		0.004	
		(0.004)	
Income in past month		0.004	
(in 1,000 Kenyan shillings)		(0.003)	
Mean Usage Among Season 1 Comparison	0.244	0.240	
Mean Usage Among Pure Comparison Group	0.296	0.227	
Observations	876	716	



## Estimator: Linear regression with covariates | *Estimateur : La régression linéaire avec des covariables*

```
library(estimatr)
# lm_robust(Y ~ treatment + Language + Gender)
```



Cluster Randomization | Randomisation par grappe



## Estimator: Regression with cluster-robust standard errors | Estimateur : La régression avec des erreurs types robustes au niveau du cluster

$$Y_{ic} = \beta_0 + \beta_1 Z_c + e_{ic}$$
  
$$Y_{ic} = \beta_0 + \beta_1 Z_c + \beta_2 X_{ic} + e_{ic}$$

- Our analysis has to take into account the fact that treatment is assigned at the cluster level with cluster-robust standard errors.
- $\triangleright$   $\beta_1$  is the ATE of the treatment at the individual level.
- We can also do covariate adjustment at the same time.

- Notre analyse doit prendre en compte le fait que le traitement est attribué au niveau du cluster avec des erreurs types robustes au niveau du cluster.
- $\triangleright \beta_1$  est l'ATE du traitement au niveau individuel.
- Nous pouvons également effectuer un ajustement covariable en même temps.



#### Cluster Randomization | Randomisation par grappe

```
# library(estimatr)
# lm_robust(Y ~ treatment, clusters=cluster_variable)
```



Experiments with Multiple Arms | Les éxperiences avec plusiers bras



## Estimator 1: Difference-in-Means | Estimateur 1 : La différence en moyennes

$Z_{\mathcal{A}}$ only	$Z_B$ only	Neither (control)
------------------------	------------	-------------------

- We can always take the difference-in-means between any two groups.
- ► But hypothesis testing is simpler with regression.
- Nous pouvons toujours tenir compte de la différence de moyens entre deux groupes.
- Mais le test d'hypothèse est plus simple avec la régression.



#### Estimator 2: Linear regression | Estimateur 2 : La régression linéaire

$$Y_i = \alpha + \beta_A Z_{Ai} + \beta_B Z_{Bi} + e_i$$

- Regression with an indicator variable for each of the two treatment arms.
- We can also do covariate adjustment at the same time.
- Régression avec une variable indicatrice pour chacun des deux bras de traitement.
- Nous pouvons également effectuer un ajustement covariable en même temps.



#### Estimator 2: Linear regression | Estimateur 2 : La régression linéaire

$$Y_i = \alpha + \beta_A Z_{Ai} + \beta_B Z_{Bi} + e_i$$

- $\triangleright$   $\beta_A$  is the ATE of  $Z_A$  (compared with control).
- $\blacktriangleright$   $\beta_B$  is the ATE of  $Z_B$  (compared with control).
- $\triangleright$   $\beta_A$  est l'ATE de  $Z_A$  (par rapport au contrôle).
- $\triangleright$   $\beta_B$  est l'ATE de  $Z_B$  (par rapport au contrôle).



## Estimators for Multi-arm Designs | Les estimateurs pour les éxperiences avec plusiers bras

```
library(estimatr)

# difference_in_means(Y ~ treatment, conditions=c("T2", "T1", "Control"),
# lm_robust(Y ~ as.factor(treatment))
```



Factorial Design | La concéption factorielle



## Estimator 1: Difference-in-Means | Estimateur 1 : La différence en moyennes

Neither	$Z_2$ only
$Z_1$ only	Both $Z_1$ and $Z_2$

- ▶ If we have a 2\*2 factorial design, we have four groups.
- We can always take the difference-in-means between any two groups.
- Si nous avons une concéption factorielle 2\*2, nous avons 4 groupes.
- Nous pouvons toujours tenir compte de la différence de moyens entre deux groupes.





# Estimator 2: Linear Regression with an Interaction Term | Estimateur 2 : La régression linéaire avec un terme d'interaction

$$Y_{i} = \beta_{0} + \beta_{1}Z_{1i} + \beta_{2}Z_{2i} + \beta_{3}Z_{1i} * Z_{2i} + e_{i}$$

$$Y_{i} = \beta_{0} + \beta_{1}Z_{1i} + \beta_{2}Z_{2i} + \beta_{3}Z_{1i} * Z_{2i} + \beta_{4}X_{i} + e_{i}$$

- ▶ Indicator variables for  $Z_1$  and  $Z_2$ .
- ► We can also do covariate adjustment at the same time.
- ▶ Variables indicatrices pour  $Z_1$  et  $Z_2$ .
- Nous pouvons également effectuer un ajustement covariable en même temps.



# Estimator 2: Linear Regression with an Interaction Term | Estimateur 2 : La régression linéaire avec un terme d'interaction

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 Z_{1i} + \beta_2 Z_{2i} + \beta_3 Z_{1i} Z_{2i} + e_i$$

Neither	$Z_2$ only
$Z_1$ only	Both $Z_1$ and $Z_2$

- $\beta_1$  is the ATE of  $Z_1$  conditional on  $Z_2 = 0 \mid I'ATE \ de \ Z_1$  conditionnel à  $Z_2 = 0$ ,  $(E[Y(Z_1 = 1) Y(Z_1 = 0)|Z_2 = 0])$
- $\triangleright$   $\beta_2$  is the ATE of  $Z_2$  conditional on  $Z_1=0$  | *l'ATE de*  $Z_2$  conditionnel à  $Z_1=0$ ,  $(E[Y(Z_2=1)-Y(Z_2=0)|Z_1=0])$

### Estimator 3: Linear Regression with an Interaction Term | Estimateur 3 : La régression linéaire avec un terme d'interaction

$$Y_{i} = \beta_{0} + \beta_{1} Z_{1i} + \beta_{2} Z_{2i} + \beta_{3} Z_{1i} Z_{2i} + e_{i}$$

Neither	$Z_2$ only
$Z_1$ only	Both $Z_1$ and $Z_2$

- $\beta_1 + \beta_3 = ATE$  of  $Z_1$  conditional on  $Z_2 = 1 \mid I'ATE$  de  $Z_1$  conditionnel à  $Z_2 = 1$ ,  $(E[Y(Z_1 = 1) Y(Z_1 = 0)|Z_2 = 1])$
- $\beta_2 + \beta_3 = ATE$  of  $Z_2$  conditional on  $Z_1 = 1 \mid I'ATE$  de  $Z_2$  conditionnel à  $Z_1 = 1$ ,  $(E[Y(Z_2 = 1) Y(Z_2 = 0)|Z_1 = 0])$
- $\triangleright$   $\beta_3$  is called the interaction effect.  $\beta_3$  est appelé l'effet d'interaction.

### Estimator 2: Linear Regression with an Interaction Term | Estimateur 2: La régression linéaire avec un terme d'interaction

Table 4. Adoption for Parents Sampled for SAFI & Subsidy Programs			
	Used Fertilizer		
	Season 1		
Panel A. 2004 Season 1 Treatments	(1)	(2)	
SAFI Season 1	0.114	0.143	
	(0.035)***	(0.038)***	
Starter Kit Farmer	0.059	0.080	
	(0.042)	(0.046)*	
Starter Kit Farmer * Demonstration Plot	-0.026	-0.061	
School	(0.060)	(0.066)	
Demonstration Plot School	0.006	0.441	
	(0.314)	(0.435)	
Household had Used Fertilizer Prior	0.369	0.315	
to Season 1	(0.031)***	(0.035)***	
Male		0.012	
		(0.033)	
Home has mud walls		-0.193	
		(0.081)**	
Education primary respondent		0.004	
		(0.004)	
Income in past month		0.004	
(in 1,000 Kenyan shillings)		(0.003)	
Mean Usage Among Season 1 Comparison	0.244	0.240	
Mean Usage Among Pure Comparison Group	0.296	0.227	
Observations	876	716	



# Estimator 2: Linear Regression with an Interaction Term | Estimateur 2 : La régression linéaire avec un terme d'interaction

```
library(estimatr)
# lm_robust(Y ~ Z1 + Z2 + Z1*Z2)
# lm_robust(Y ~ Z1*Z2)
```

