


**Rješenja zadataka jesenskog ispitnog roka iz Fizike 2
srijeda, 9. rujna 2015.**

1. Tanki homogeni štap mase 10 kg je pričvršćen na os koja prolazi kroz središte štapa i okomita je na štap. Opruga konstante elastičnosti 80 Nm^{-1} jednim krajem je pričvršćena na donji kraj štapa, a drugi kraj opruge je pričvršćen za čvrsti oslonac (vidi sliku). Štap se otkloni za mali kut od vertikale i otpusti. Odredite kružnu frekvenciju harmoničkog titranja štapa.

(7 bodova)



Rješenje:

$$-kx \frac{l}{2} = I \ddot{\theta}$$

$$-k \frac{l}{2} \sin \theta \frac{l}{2} = \frac{m l^2}{12} \ddot{\theta}$$

$$-k \frac{l^2}{4} \theta = \frac{m l^2}{12} \ddot{\theta}$$


$$\ddot{\theta} + \frac{3k}{m} \theta = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3 \cdot 80}{10}} \text{ s}^{-1} = 4,899 \text{ s}^{-1}$$

2. Tijelo mase 2 kg nalazi se na horizontalnoj podlozi i pričvršćeno je oprugom konstante elastičnosti $3k$ s jedne i oprugom konstante elastičnosti $k = 30 \text{ Nm}^{-1}$ s druge strane (vidi sliku). Površina pruža otpor gibanju tijela silom $F_x = -b \dot{x}$. Tijelo se otkloni iz ravnotežnog položaja i pusti da se giba. Nakon četiri puna titraja amplituda padne na tri četvrtine početne vrijednosti. Koliko iznosi b ?

(7 bodova)



Rješenje:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{4k}{m}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{4k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}$$

$$e^{-\frac{b}{2m} 4T} = \frac{3}{4} \Rightarrow T = \frac{m}{2b} \ln \frac{4}{3}$$


$$\sqrt{\frac{4k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}} = \frac{2\pi}{T}$$

$$\sqrt{\frac{4k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}} = \frac{2\pi}{m} 2b \frac{1}{\ln \frac{4}{3}}$$

$$b = \sqrt{\frac{4km}{\frac{1}{4} + \left(\frac{4\pi}{\ln \frac{4}{3}}\right)^2}}$$

$$b = \sqrt{\frac{4 \cdot 30 \cdot 2}{\frac{1}{4} + \left(\frac{4\pi}{\ln \frac{4}{3}}\right)^2}} \frac{\text{kg}}{\text{s}} = 0,355 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

3. Žica duljine 5,00 m i mase 0,732 kg je razapeta između dva jednaka štapa svaki težine 235 N. Štapovi su nagnuti pod kutem 57,0° prema površini Zemlje (vidi sliku). Vjetar uzrokuje da žica titra u šestom harmoniku stojnog vala (n=6). Kolika je frekvencija stojnog vala na žici? (6 bodova)



Rješenje:

$$G \frac{l}{2} \sin(90^\circ + \theta) - Fl \sin(180^\circ - \theta) = 0$$

$$F = \frac{G}{2} \cot \theta$$

$$F = \frac{1}{2} \cdot 235 \cot 57,0^\circ \text{ N} = 76,305 \text{ N}$$

$$v = \sqrt{\frac{F}{m/L}}$$

$$L = 6 \frac{\lambda}{2} = 3\lambda$$

$$\lambda = \frac{L}{3}$$


$$f = \frac{v}{\lambda}$$

$$f = \sqrt{\frac{FL}{m} \frac{1}{\lambda}}$$

$$f = \sqrt{\frac{76,305 \cdot 5}{0,732}} \cdot \frac{3}{5} \text{ Hz} = 13,698 \text{ Hz}$$

4. U dijelu prostora postoji homogeno magnetsko polje $B = 0.1 \text{ T}$. Silnice polja su vodoravne (na skici okomito na stranicu, tj. pokazuje van iz papira). Metalni prsten mase $m = 10 \text{ g}$ i polumjera $R = 30 \text{ cm}$ stavi se u prostor, tako da samo jednom polovicom obuhvaća dio prostora gdje postoji magnetsko polje (vidi skicu). Kolika struja treba teći kroz prsten da bi prsten mogao na takav način „levitirati” u prostoru?

(8 bodova)



Rješenje:


Smjer struje i magnetskog polja su uvijek okomiti jedan na drugoga, pa je iznos sile na mali element duljine uvijek isti:

$$|d\vec{F}_m| = IBdl .$$

Smjer sile ovisi o smjeru struje. Da bi prsten mogao 'levitirati', ukupna sila mora imati komponentu usmjerenu prema gore. Dakle, smjer struje mora biti suprotno od kazaljke na satu. U tom slučaju sila je u svakoj točki prstena usmjerena radijalno prema van.

Pogledajmo silu na mali dio prstena označen na slici. Komponenta te sile usmjerena prema gore, tj. suprotno od sile teže je $dF_{m,y} = IBdl \sin(\theta)$. Duljina označenog segmenta je $dl = Rd\theta$, pa je sila na segment:

$$dF_{m,y} = IBR \sin(\theta) d\theta .$$



Za polovicu prstena, koja se nalazi u magnetskom polju, ukupna sila nalazi se 'zbiranjem' doprinosa svih segmenata, koji su određeni kutevima $0 \leq \theta \leq \pi$:

$$F_{m,y} = IBR \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta = -IBR \cos(\theta)|_0^\pi = 2IBR .$$

Ta sila mora uravnotežiti silu teže, $F_{m,y} = mg$, pa slijedi da struja mora iznositi $I = \frac{mg}{2BR}$.

Za zadane brojeve $I = 1.64$ A.

5. Cilindričnu posudu polumjera 10 cm napunite vodom ($n = 1.33$). Zbog Vašeg položaja na Zemlji, kutna udaljenost Sunca od zenita (zamišljena točka na nebu vertikalno iznad Vas) nikada nije manja od 19.2° . Koliko duboka treba biti posuda da Sunce nikada direktno ne osvjetljava nijednu točku njezina dna?

(6 bodova)

Rješenje:

Za dani granični kut $\alpha = 19.2^\circ$, kut koji lomljena zraka svjetlosti čini sa okomicom je $\beta = \arcsin(\frac{\sin \alpha}{n}) = 14.3^\circ$.

Za potrebnu dubinu posude razmatramo zrake koje prolaze tik uz rub posude, pa je veza kuta zraka u vodi β , polumjera R i dubine h dana sa $\tan \beta = 2R/h$. Slijedi da je najmanja potrebna dubina $h = 78.4$ cm.

6. Snop monokromatske svjetlosti valne duljine 532 nm i snage 5 mW pada na pločicu cezija (izlazni rad je 2.14 eV). Ako je između pločice cezija (fotokatoda) i anode narinut napon koji ubrzava izbačene elektrone, te ako je vjerojatnost da će upadni foton uzrokovati fotoelektrični efekt 60%, kolika je struja koja teče između katode i anode?

(6 bodova)

Rješenje:

Prvo usporedimo energiju fotona i izlazni rad cezija: $E_\gamma = hc/\lambda = 2.33 \text{ eV}$, što je veće od izlaznog rada. Zaključujemo da fotoni imaju dovoljnu energiju za fotoelektrični efekt na ceziju.

Na fotokatodu upada $\frac{dN_\gamma}{dt} = \frac{P}{h\nu} = \frac{P\lambda}{hc}$ fotona u jedinici vremena. Samo 60% upadnih fotona će izazvati fotoefekt, dakle iz katode izlazi $\frac{dN_e}{dt} = 0.6 \frac{dN_\gamma}{dt}$ elektrona u jedinici vremena. Budući je između katode i anode narinut napon koji ubrzava elektrone, možemo uzeti da svi izbačeni elektroni stižu na anodu, pa je struja između katode i anode:

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{e \cdot dN_e}{dt} = 0.6 \frac{e P \lambda}{hc} .$$

Za zadane brojeve $I = 1.29 \text{ mA}$.