

5

Solving Linear System

direct method

Quick Review

Matrices

A 2×2 matrix is

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

A vector is

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

The identity is

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

For any matrix A we have

$$AI = IA = A$$

For any vector v we have

$$Iv = v$$

Matrix Multiplication

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + bz & ay + bu \\ cx + dz & cy + du \end{bmatrix}$$

Vector Multiplication (usually $AB \neq BA$)

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$

Determinant

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Inverse of A exists if and only if $\det(A) \neq 0$

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Eigenvalues and Eigenvectors

Definition. λ is an eigenvalue of A and $v \neq 0$ is an eigenvector associated to λ if

$$Av = \lambda v$$

Theorem. The eigenvalues of A are the roots of

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

The eigenvector v associated to λ solves

$$(A - \lambda I)v = 0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Linear System

We have

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 = u \\ cx_1 + dx_2 = v \end{cases} \iff Ax = b \quad \text{where } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

LU and Cholesky Factorization

LU Factorization

$$A = LU$$

where L is lower triangular

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ l_{n,1} & \cdots & l_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix}$$

where U is upper triangular

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & 0 & \ddots & u_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix}$$

Cholesky Factorization

If A is symmetric definite positive

$$A = LL^T$$

where L is lower triangular

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ l_{n,1} & \cdots & l_{n,n-1} & l_{nn} \end{bmatrix}$$