

Número de diapositiva y explicación:

- 1) *
- 2) *
- 3) Carcinoma espinocelular o epidermoide
- 4) Carcinoma basocelular
- 5) Enfermedad de Bowen (Cáncer espinocelular in situ: premaligna)
- 6) Queratosis actínica
- 7) Queratosis seborreica
- 8) Quiste sebáceo o epidérmico
- 9) Quiste dérmico (en este caso de la cola de la ceja)
- 10) Acné (tanto comedoniano, como papulopustular, como nóduloquístico). También acné conglobata (inferior derecho).
- 11) Angioedema o angioedema de Quincke
- 12) Eritema nodoso (más en la cara anterior de las piernas)
- 13) Pioderma gangrenoso
- 14) Eritema indurado de Bazin (más en la cara posterior de las piernas: es una manifestación de tuberculosis)
- 15) Alopecia androgénica (en mujeres y hombres)
- 16) Alopecia universal (sin cejas)
- 17) Alopecia areata
- 18) Dermatitis atópica
- 19) Pitiriasis alba (signo de atopía)
- 20) Queratosis pilar (signo de atopía)
- 21) Candidiasis del pañal
- 22) Dermatitis del pañal
- 23) Dermatitis seborreica (infantil: arriba; y del adulto: abajo).
- 24) Dermatitis de contacto alérgica. La foto inferior derecha es similar a una dermatomiositis (rash heliotropo), pero en este caso es una reacción al maquillaje.
- 25) Dermatitis de contacto alérgica
- 26) Chancro o sífilis primaria en pene y vulva
- 27) Sífilis secundaria
- 28) Chancro blando o chancroide, con la típica adenopatía fistulizada
- 29) Impétigo vulgar
- 30) Impétigo buloso
- 31) Síndrome de piel escaldada
- 32) Pénfigo
- 33) Penfigoide
- 34) Necrosis epidermolítica tóxica y signo de Nicolski

- 35) Síndrome de Steven Johnson
- 36) Eritema multiforme menor o erupción multiforme menor
- 37) Eritema fijo o erupción fija o toxicodermia fija (aparece en relación a fármacos y se repite en el mismo lugar, al volver a usar el fármaco)
- 38) Exantema morbiliforme (morbiliforme significa “similar al sarampión”; se ve tanto en mononucleosis, como en reacciones adversas a medicamentos.
- 39) Fitofotodermatitis o reacción fotoalérgica (ej. Litre)
- 40) Erupción fotoalérgica (alergia al sol)
- 41) Prurigo insectario (Aparecen múltiples vesículas pruriginosas, que se rompen, luego de haber sido picado por algún insecto o haberse expuesto a una planta: es común en pediatría y se observa o bien se le da un poco de antiH1 y de prednisona)
- 42) Loxoscelismo cutáneo (picadura de araña de rincón o Loxosceles laeta)
- 43) Condiloma acuminado
- 44) Verrugas planas
- 45) Herpes simple ocular y bucal
- 46) Herpes zóster
- 47) Herpes genital: primoinfección (arriba) y recurrencias (abajo)
- 48) Hemangiomas (pueden no estar presentes al nacer y crecen muy rápido; luego pueden involucionar espontáneamente, pero mejor darles propranolol).
- 49) Malformación vascular (están presentes al nacer y crecen a la misma velocidad que el niño; por regla general no desaparecen). Incluyen al nevus flammeus o mancha de oporto o vino tinto (abajo a la derecha)
- 50) Granuloma piógeno (frecuente en boca, manos y pies; sangran fácil al tocarlos)
- 51) Micosis fungoide (linfoma T cutáneo)
- 52) Síndrome de Sezary (linfoma T cutáneo generalizado)
- 53) Erisipela
- 54) Erisipela
- 55) Fascitis necrosante o fasciitis necrotizante
- 56) Celulitis
- 57) Liquen simple crónico
- 58) Liquen plano
- 59) Liquen plano (50% tiene compromiso oral)
- 60) Se repite la diapositiva anterior
- 61) Liquen escleroso o liquen escleroatrófico (puede ser muy pruriginoso)
- 62) Pitiriasis rosada de Gibert
- 63) Micosis fungoide