Дискретная математика

том 16 выпуск 1 * 2004

УДК 519.14

Об автоморфизмах сильно регулярных графов с параметрами $\lambda = 1$, $\mu = 2$

© 2004 г. А. А. Махнев, И. М. Минаков

Пусть Γ — сильно регулярный граф с параметрами $(v, k, 1, 2)$. Тогда $k = u^2 + u + 2$ и $u = 1, 3, 4, 10$ или 31. Известно существование таких графов для $u = 1$ и 4. Это (3×3)-решетка и граф смежных классов тернарного кода Голея. Если $u = 3$, то Γ имеет параметры $(99, 14, 1, 2)$. Вопрос о существовании таких графов поставлен Д. Зейделем.

С помощью теории характеров конечных групп выяснены возможные порядки и строение подграфов неподвижных точек автоморфизмов графа Γ с параметрами $(99, 14, 1, 2)$. Доказано, что если группа $\mathrm{Aut}(\Gamma)$ содержит инволюцию, то ее порядок делит 42.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 02–01–00722.

Мы рассматриваем неориентированные графы без петель и кратных ребер. Если a, b — вершины графа Γ, то через $d(a, b)$ обозначается расстояние между a и b, а через $\Gamma_i(a)$ — подграф графа Γ, индуцированный множеством вершин, которые находятся на расстоянии i в Γ от вершины a. Подграф $\Gamma_1(a)$ называется окрестностью вершины a и обозначается через $[a]$. Через $a^\perp$ обозначается подграф, являющийся шаром радиуса 1 с центром a.

Граф Γ называется регулярным графом степени k, если $[a]$ содержит точно k вершин для любой вершины a из Γ. Граф Γ называется реберно регулярным графом с параметрами (v, k, λ), если Γ содержит v вершин, является регулярным степени k и каждое ребро из Γ лежит в λ треугольниках. Граф Γ называется вполне регулярным графом с параметрами (v, k, λ, μ), если Γ реберно регулярен с соответствующими параметрами и подграф $[a] \cap [b]$ содержит μ вершин в случае $d(a, b) = 2$. Вполне регулярный граф диаметра 2 называется сильно регулярным графом. Граф Γ называется сильным с параметрами (λ, μ), если каждое ребро из Γ лежит точно в λ треугольниках и подграф $[a] \cap [b]$ содержит μ вершин для любых несмежных a, b. Число вершин в $[a] \cap [b]$ обозначим через $\lambda(a, b)$ (через $\mu(a, b)$), если $d(a, b) = 1$ (если $d(a, b) = 2$), а соответствующий подграф назовем (μ-) λ-подграфом.

Подграфы неподвижных точек автоморфизмов сильно регулярного графа с малыми значениями параметров λ и μ имеют жестко заданное строение. Так подграф неподвижного множества автоморфизма графа Мура сам является графом Мура или звездой (см. лемму 1 в [1]).

Хорошо известно (предложение 1.1.2 в [2]), что сильный граф с $\mu \geqslant 2$ сильно регулярен. Поэтому связные компоненты подграфов неподвижных точек 2-автоморфизмов сильно регулярного графа с $\max\{\lambda, \mu\} \leqslant 2$ сильно регулярны с этими же параметрами.

В работе выясняются возможные порядки и подграфы неподвижных точек сильно регулярных графов с $(\lambda, \mu) = (1, 2)$. Основным результатом работы является следующая теорема.

Теорема 1. *Пусть* Γ *— сильно регулярный граф с параметрами* $(99, 14, 1, 2)$, $G = \mathrm{Aut}(\Gamma)$. *Если* g *— элемент простого порядка из* G, $\Delta = \mathrm{Fix}(g)$, *то выполняется одно из утверждений:*

(1) Δ *— одновершинный граф и* $|g| = 2$ *или* 7;

(2) Δ *— пустой граф и* $|g| = 3$ *или* 11;

(3) Δ *— треугольник и* $|g| = 3$.

В частности, порядок группы автоморфизмов сильно регулярного графа с параметрами $(99, 14, 1, 2)$ делит $2 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11$.

Следствие 1. *Пусть* Γ *— сильно регулярный граф с параметрами* $(99, 14, 1, 2)$, $G = \mathrm{Aut}(\Gamma)$. *Если* G *содержит инволюцию* t, *то выполняется одно из утверждений:*

(1) $|G|$ *делится на* 7 *и делит* 42, *причем* $[O(G), t] = 1$ *и в случае* $|G| = 42$ *подгруппа* $O(G)$ *неабелева;*

(2) $|G|$ *делит* 6.

Работа построена следующим образом. Сначала теоретико-графовыми методами выясняются возможные порядки и строение подграфов неподвижных точек автоморфизмов графа с параметрами $(99, 14, 1, 2)$. Затем с помощью теории характеров конечных групп полученные результаты существенно уточняются. В конце работы найдено возможное строение группы G автоморфизмов графа с параметрами $(99, 14, 1, 2)$ при условии, что эта группа содержит инволюцию.

Следующая лемма используется в доказательстве теоремы.

Лемма 1. *Пусть* Γ *— сильно регулярный граф, имеющий параметры* (v, k, λ, μ), Δ *— индуцированный подграф с* N *вершинами,* M *ребрами и степенями вершин* $d_1, \ldots, d_N$. *Тогда*

$$(v - N) - (kN - 2M) + \left(\lambda M + \mu\binom{N}{2} - M\right) - \sum_{i=1}^{N}\binom{d_i}{2} = x_0 + \sum_{i=3}^{N}\binom{i-1}{2}x_i,$$

где x_i *— число вершин в* $\Gamma - \Delta$, *смежных точно с* i *вершинами в* Δ, $i = 0, 1, \ldots, x_N$.

Доказательство. Подсчитав число вершин вне Δ, число ребер между Δ и $\Gamma - \Delta$, а также число 2-путей с концами в Δ и средней вершиной вне Δ, получим уравнения

$$v - N = \sum_{i=1}^{N} x_i,$$

$$kN - 2M = \sum_{i=1}^{N} i x_i,$$

$$\lambda M + \mu\left(\binom{N}{2} - M\right) - \sum_{i=1}^{N}\binom{N}{2} = \sum_{i=1}^{N}\binom{i}{2}x_i.$$

Вычитая второе уравнение из суммы первого и третьего уравнений, получим требуемое. Лемма доказана.

Рассмотрим сильно регулярный граф Γ с параметрами $\lambda = 1, \mu = 2$. Пусть $G = \mathrm{Aut}(\Gamma)$ — группа автоморфизмов Γ. Выберем подгруппу X нечетного порядка из G. Пусть $\Omega = \mathrm{Fix}(X)$ — множество вершин графа Γ, неподвижных относительно каждого элемента из X. Если a, b — несмежные вершины из Ω, то $[a] \cap [b]$ — подграф, допустимый относительно X, поэтому $[a] \cap [b] \subset \Omega$. Значит Ω — либо сильно регулярный граф с $\lambda = 1$, $\mu = 2$, либо является кликой или пустым графом.

Пусть t — инволюция из G, $a, b \in \mathrm{Fix}(t)$. Тогда, $[a] \cap [b] = c, d$ и либо $c, d \in \mathrm{Fix}(t)$, либо $c^t = d$. Если $[b] \cap \mathrm{Fix}(t)$ содержит несмежные вершины e, f, то вторая вершина подграфа $[e] \cap [f]$ также попадает в $\mathrm{Fix}(t)$.

Пусть Γ — сильно регулярный граф с параметрами $(v, k, 1, 2)$. Если X — подгруппа нечетного порядка из $G = \mathrm{Aut}(\Gamma)$, то $\mathrm{Fix}(X)$ является пустым графом, сильно регулярным графом с $\lambda = 1$, $\mu = 2$, одновершинным подграфом или треугольником. Пусть t — инволюция из G, причем $\Delta = \mathrm{Fix}(t)$ — непустой граф. Если a, b — несмежные вершины из Δ, $\{c, d\} = [a] \cap [b]$, то либо $c, d \in \Delta$, либо $c^t = d$ и вершины a, b находятся на расстоянии, не меньшем 3, в графе Δ.

В половинном случае Γ имеет параметры $(9, 4, 1, 2)$. Этим параметрам соответствует единственный граф, а именно, (3×3)-решетка. В случае $k > 4$, используя равенство $(\lambda - \mu)^2 + 4(k - \mu) = n^2$, получим, что $n = 2u + 1$, $k = u^2 + u + 2$, $n - m = u$, и $-m = -u - 1$. По условию целочисленности для сильно регулярных графов $\mu n = 2(2u+1)$ делит $(m-1)k(k+m) = u(u^2+u+2)(u^2+2u+3)$. Поэтому $2u+1$ делит 63, и $u = 1, 3, 4, 10$ или 31. При $u = 1$ снова возникает (3×3)-решетка. При $u = 3$ получается граф с параметрами $(99, 14, 1, 2)$, вопрос о существовании которого поставил Д. Зейдель.

Пример 1. Рассмотрим автоморфизмы (3×3)-решетки. Пусть X — группа нечетного порядка из $\mathrm{Aut}(\Gamma)$, $\Omega = \mathrm{Fix}(X)$. Так как $|[a]| = 4$, случаи $|\Omega| = 1$ или 3 невозможны. Поэтому X действует без неподвижных точек на Γ и порядок группы автоморфизмов графа Γ делит $2^l \cdot 3^2$ (группа автоморфизмов (3×3)-решетки является расширением группы E_9 с помощью диэдральной группы порядка 8).

Пусть до конца работы Γ является графом Зейделя с параметрами $(99, 14, 1, 2)$, $G = \mathrm{Aut}(\Gamma)$.

Предложение 1. *Пусть* Γ *является графом Зейделя с параметрами* $(99, 14, 1, 2)$, y *— элемент нечетного простого порядка из* $\mathrm{Aut}(\Gamma)$ *и* $\Omega = \mathrm{Fix}(y)$. *Тогда выполняется одно из следующих утверждений:*

(1) Ω *пусто (*y *не имеет неподвижных вершин) и* $|y| = 3$ *или* 11,

(2) Ω *является одновершинным графом и* $|y| = 7$,

(3) Ω *является треугольником и* $|y| = 3$;

(4) Ω *является* (3×3)*-решеткой и* $|y| = 5$.

Доказательство. Если $\Omega = \{a\}$ является одновершинным графом, то $|y|$ делит 14. Если Ω является треугольником $\{a, b, c\}$, то $|[a] - \{b, c\}| = 12$ и $|y| = 3$. Если Ω является (3×3)-решеткой, а $a \in \Omega$, то $|[a] - \Omega| = 10$ и $|y| = 5$.

Предложение 1 доказано.

Строение подграфов неподвижных точек инволютивных автоморфизмов выяснено в предложении 2.

Предложение 2. *Пусть* Γ *— сильно регулярный граф с параметрами* $(99, 14, 1, 2)$, *имеющий инволютивный автоморфизм* t. *Тогда* $\mathrm{Fix}(t)$ *является одним из следующих подграфов:*

(1) *одновершинный граф,*

(2) *треугольник,*

(3) *три изолированных треугольника,*

(4) *вершина и два изолированных треугольника,*

(5) *четыре изолированных вершины и треугольник,*

(6) n*-коклика,* $n = 3, 5$ *или* 7,

(7) (3×3)*-решетка.*

Доказательство предложения 2 разобьем на ряд лемм. Пусть t — инволюция из G, $\Delta = \mathrm{Fix}(t)$. Для ребра $\{x, y\}$ графа Γ через xy будем обозначать единственную вершину из $[x] \cap [y]$.

Лемма 2. *Пересечение двух* (3×3)*-решеток из* Γ *является пустым графом, вершиной или треугольником.*

Доказательство. Заметим, что пересечение двух (3×3)-решеток Σ и Σ' из Γ пусто или является кликой.

Если $\Sigma \cap \Sigma'$ является ребром $\{x, y\}$, то $[x] \cap [y]$ содержит по вершине из Σ и из Σ'. Получаем противоречие с тем, что $\lambda = 1$.

Лемма 3. *Связная компонента графа* Δ, *имеющая более трех вершин, является* (3×3)*-решеткой и совпадает с* Δ.

Доказательство. Заметим, что окрестность вершины x из $\Gamma - \Delta$ содержит не более двух вершин из Δ, иначе $\mu(x, x^t) > 2$.

Связная компонента Σ графа Δ является одновершинным графом, треугольником или вполне регулярным графом степени α с $\lambda = 1$ и $\mu = 2$. Если Σ имеет более трех вершин, то Σ содержит четырехугольник $\{a, b; c, d\}$ и еще четыре вершины ac, ad, bc, bd. Положим

$$[ac] \cap [ad] = \{a, e\}, \qquad [bc] \cap [bd] = \{b, f\}.$$

Если $e = f$, то Δ является (3×3)-решеткой. Так как каждая вершина вне (3×3)-решетки смежна с единственной вершиной этой решетки, то $\Sigma = \Delta$. Число ребер между Δ и $\Gamma - \Delta$ равно $|\Delta|(14 - \alpha)$. С другой стороны, указанное число не больше $2|\Gamma - \Delta|$. Поэтому $|\Delta| \leqslant 99/(8 - \alpha/2)$. Если $\alpha = 6$, то $|\Delta| \leqslant 99/5$, получаем противоречие с тем, что $|\Delta| \geqslant 20$. Если $\alpha = 8$, то $|\Delta| \leqslant 99/4$, получаем противоречие с тем, что $|\Delta| \geqslant 1 + 8 + 8 \cdot 6/2 + 2 = 35$. Если $\alpha = 10$, то $|\Delta| \leqslant 99/3$, получаем противоречие с тем, что $|\Delta| \geqslant 1 + 10 + 10 \cdot 8/2 + 2 = 53$. Наконец, если $\alpha = 12$, то $|\Delta| \leqslant 99/2$, получаем противоречие с тем, что $|\Delta| \geqslant 1 + 12 + 12 \cdot 10/2 + 2 = 75$.

Значит, $\alpha = 4$. Тогда для $a \in \Sigma$ справедливо равенство $|\Sigma_2(a)| = 4$. Каждая вершина b из Δ, находящаяся на расстоянии, не меньшем 3, от a в графе Δ смежна с концами двух

ребер из $[a]$, переставляемых t. Получаем противоречие с тем, что число треугольников в Σ равно $|\Sigma|4/6$.

Лемма 4. *Если Δ является δ-кокликой, то выполняются следующие утверждения:*

(1) *δ — нечетное число, не большее 7,*

(2) *если $\delta = 3$, то подграф $\Delta \cup (\bigcup_{x,y\in\Delta, x\neq y}[x] \cap [y])$ является (3×3)-решеткой.*

Доказательство. Пусть Δ является δ-кокликой, $\delta > 1$. Для различных вершин $a, b \in \Delta$ подграф $[a] \cap [b]$ содержит пару вершин x, x^t переставляемых t. Общее число таких пар равно $\delta(\delta - 1)/2$. Далее, t переставляет ребра $\{x, y\}$ и $\{x^t, y^t\}$ из $[a]$, причем паре y, y^t отвечает третья вершина из Δ. Таким образом, $\delta - 1$ равно удвоенному числу пар ребер из $[a]$, переставляемых t, и $\delta = 3, 5$ или 7. Утверждение (1) доказано.

Пусть $\{x, y\}$ — ребро из $[a]$, $\{x, z\}$ — ребро из $[b]$. Тогда $[y] \cap [y^t]$ содержит вершину c из Δ, $[z] \cap [z^t]$ содержит вершину d из Δ. Если $\delta = 3$, то $c = d$ и подграф $\Delta \cup \left(\bigcup_{x,y\in\Delta, x\neq y}[x] \cap [y]\right)$ является (3×3)-решеткой.

Лемма доказана.

Лемма 5. *Если Δ содержит треугольник $\{a, b, c\}$ и еще вершину d, то Δ является одним из следующих подграфов:*

(1) *три изолированных треугольника,*

(2) *вершина и два изолированных треугольника,*

(3) *четыре изолированных вершины и треугольник,*

(4) *(3×3)-решетка.*

Доказательство. Допустим, что Δ не является (3×3)-решеткой. Тогда связные компоненты Δ являются одновершинными графами или треугольниками.

Пусть $[a] \cap [d] = \{x, x^t\}$, $\{x, y\}$ — ребро из $[a]$. Тогда $[y] \cap [y^t]$ содержит новую вершину p из Δ. Назовем эту процедуру выталкиванием неподвижных точек относительно (a, d).

Предположим, что каждая связная компонента Δ является треугольником и $\{d, e, f\}$ — треугольник из Δ. Если в результате выталкивания неподвижных точек относительно (a, d) получим вершину e, то после выталкивания относительно (a, f) получится седьмая вершина из Δ. В этом случае заключение леммы выполняется.

Теперь Δ содержит изолированную вершину и $|\Delta| \leqslant 7$. Допустим, что $|\Delta| = 5$. Тогда Δ содержит треугольник $\{a, b, c\}$ и две изолированные вершины d, e. Без ограничения общности, $[d]$ содержит такое ребро $\{x, z\}$, что $a \in [x] \cap [x^t]$, $b \in [z] \cap [z^t]$. Для ребра $\{x, y\}$ из $[a]$ и ребра $\{z, u\}$ из $[b]$ подграфы $[y] \cap [y^t]$ и $[u] \cap [u^t]$ содержат вершину e. Применим лемму 1 к подграфу $\Lambda = \{a, b, d, e, x, x^t, y, y^t, z, z^t, u, u^t\}$. Пусть x_i — число вершин из $\Gamma - \Lambda$, смежных точно с i вершинами из Λ. В этом случае $N = 12$, $M = 25$, $d_1 = d_2 = 5$, $d_i = 4$ для $i > 2$. Поэтому $\Sigma x_i = 87$, $\Sigma i x_i = 118$, $\Sigma\binom{i}{2}x_i = 27$. Получаем противоречие с тем, что $x_0 + \Sigma\binom{i-1}{2}x_i = -4$.

Лемма и предложение доказаны.

Доказательство теоремы опирается на метод Дональда Хигмена работы с автоморфизмами сильно регулярного графа, описанный в третьей главе монографии Камерона [3].

При этом граф Γ рассматривается как симметричная схема отношений $(X, \mathcal{R})$ с двумя классами. Если P и Q — первая и вторая матрицы собственных значений схемы, то

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ k & r & s \\ v-k-1 & -r-1 & -s-1 \end{pmatrix},$$

$PQ = QP = vI$. Здесь v — число вершин, k, r, s — собственные значения графа Γ кратностей 1, f, g соответственно (указанные кратности образуют первый столбец матрицы Q).

Подстановочное представление группы $G = \mathrm{Aut}(\Gamma)$ на вершинах графа Γ обычным образом дает матричное представление ψ группы G в $GL(v, \mathbf{C})$.

Пространство C^v является ортогональной прямой суммой собственных $\psi(G)$-инвариантных подпространств $W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$ матрицы смежности графа Γ. Пусть χ_i — характер представления ψ_{W_i}. Тогда для любого $g \in G$ получим, что

$$\chi_i(g) = v^{-1} \sum_{j=0}^{2} (Q)_{ij} \alpha_j(g),$$

где $\alpha_i(g)$ — число точек x из X таких, что $(x, x^g) \in R_i$. Заметим, что значения характеров являются целыми алгебраическими числами, поэтому если $\chi_i(g)$ — число рациональное, то оно должно быть целым.

Пусть Γ — граф Зейделя с параметрами (99, 14, 1, 2) и $G = \mathrm{Aut}(\Gamma)$. Тогда

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 14 & -4 & 3 \\ 84 & 3 & -4 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 44 & -88/7 & 11/7 \\ 54 & 81/7 & -18/7 \end{pmatrix}.$$

Поэтому значение характера, полученного при проектировании на подпространство размерности 54 равно

$$\chi_2(g) = \frac{1}{99}\left(54\alpha_0(g) + \frac{81}{7}\alpha_1(g) - \frac{18}{7}\alpha_2(g)\right) = \frac{1}{77}(42\alpha_0(g) + 9\alpha_1(g) - 2\alpha_2(g)).$$

Подставляя в эту формулу значение $\alpha_2(g) = 99 - \alpha_0(g) - \alpha_1(g)$, получим равенство $\chi_2(g) = (4\alpha_0(g) + \alpha_1(g) - 18)/7$.

Пусть t — инволюция из G, $\Delta = \mathrm{Fix}(g)$. Если $|\Delta| + 1$, $a \in \Delta$, то t переворачивает все 7 ребер из $[a]$, $\alpha_1(t) = 14$ и $\chi_2(t) = (4 + 14 - 18)/7 = 0$.

Если Δ — треугольник, то t переворачивает 6 ребер в окрестности любой вершины из Δ, $\alpha_1(t) = 36$ и $\chi_2(t) = (12 + 36 - 18)/7$, получаем противоречие.

Если Δ является 3-кокликой, то t имеет орбиту длины 2 на ребрах в окрестности вершины из Δ и переворачивает остальные 5 ребер из этой окрестности, поэтому $\alpha_1(t) = 3 \cdot 10 = 30$ и $\chi_2(t) = (12 + 30 - 18)/7$, получаем противоречие.

Если Δ является 5-кокликой, то t имеет две орбиты длины 2 на ребрах в окрестности вершины из Δ и переворачивает остальные 3 ребра из этой окрестности, поэтому $\alpha_1(t) = 5 \cdot 6 = 30$ и $\chi_2(t) = (20 + 30 - 18)/7$, получаем противоречие.

Если Δ является 7-кокликой, то t имеет три орбиты длины 2 на ребрах в окрестности вершины из Δ и переворачивает оставшееся ребро из этой окрестности, поэтому $\alpha_1(t) = 14$ и $\chi_2(t) = (28 + 14 - 18)/7$, получаем противоречие.

Если Δ состоит из 4-коклики и треугольника, то t имеет три орбиты длины 2 на ребрах в окрестности вершины из 4-коклики графа Δ и переворачивает оставшееся ребро из этой окрестности. Далее, t имеет две орбиты длины 2 на ребрах в окрестности вершины из треугольника графа Δ и переворачивает 2 ребра из этой окрестности, поэтому $\alpha_1(t) = 4 \cdot 2 + 3 \cdot 4 = 20$ и $\chi_2(t) = (28 + 20 - 18)/7$, получаем противоречие.

Если Δ состоит из вершины и двух изолированных треугольников, то t имеет три орбиты длины 2 на ребрах в окрестности изолированной вершины из Δ и переворачивает оставшееся ребро из этой окрестности. Далее, t имеет две орбиты длины 2 на ребрах в окрестности вершины из треугольника графа Δ и переворачивает 2 ребра из этой окрестности, поэтому $\alpha_1(t) = 2 + 6 \cdot 4 = 26$ и $\chi_2(t) = (28 + 26 - 18)/7$, получаем противоречие.

Если Δ состоит из трех изолированных треугольников, то t имеет три орбиты длины 2 на ребрах в окрестности любой вершины из Δ, $\alpha_1(t) = 0$ и $\chi_2(t) = (36 - 18)/7$, получаем противоречие.

Если Δ является (3×3)-решеткой, то для любой вершины $a \in \Delta$ инволюция t переворачивает все 5 ребер из $[a] - \Delta$, поэтому $\alpha_1(t) = 90$ и $\chi_2(t) = (36 + 90 - 18)/7$, получаем противоречие.

Пусть g — элемент нечетного простого порядка из G, $\Omega = \mathrm{Fix}(g)$.

Лемма 6. *Если Ω — пустой граф, то $|g| = 11 = \alpha_1(g)$ или $|g| = 3$, $\alpha_1(g) = 3w$ и $w - 1$ делится на 7.*

Доказательство. Если Ω пусто, то $\chi_2(g) = (\alpha_1(g) - 18)/7$. В случае $|g| = 11$ получим, что $\alpha_1(g) = 11w$ и $w - 1$ делится на 7. Если $w = 8$, то $\alpha_1(g) = 88$ и $\alpha_2(g) = 11$. Заметим, что если a — такая вершина из $\langle g \rangle$-орбиты, что вершины a, a^g смежны, то вершины a, a^{g^2} не смежны и $\alpha_2(g^2) = 88$, получаем противоречие. Значит, $w = 1$.

Пусть $a \in \Gamma$ и $\{a, a^g\}$ — ребро. Если $\langle g \rangle$-орбита точки a является графом степени 4, то a смежна с $a^{g^i}, a^{g^{-i}}$ для некоторого $i \in \{2, 3, 4, 5\}$. В случае $i = 2$ подграф $[a] \cap [a^g]$ содержит $a^{g^{-1}}$, a^{g^2} и $\lambda(a, a^g) \geqslant 2$, получаем противоречие. В случае $i = 5$ подграф $[a] \cap [a^{g^6}]$ содержит a^g, a^{g^5} и $\lambda(a, a^{g^6}) \geqslant 2$, получаем противоречие. В случае $i = 3$ подграф $[a^{g^{-1}}] \cap [a^g]$ содержит a, $a^{g^{-2}}$, a^{g^2} и $\mu(a^{g^{-1}}, a^g) = 2$, получаем противоречие. В случае $i = 4$ подграф $[a^{g^4}] \cap [a^{g^7}]$ содержит a, a^{g^3}, a^{g^8} и $\mu(a^{g^4}, a^{g^7}) = 2$, получаем противоречие. Таким образом, любая $\langle g \rangle$-орбита является 11-угольником или 11-кокликой.

Пусть α — число 11-кокликовых орбит, β — число 11-угольных орбит. Тогда $\alpha + \beta = 9$ и $2\beta = 10$, поэтому $\alpha = 4$, $\beta = 5$.

В случае $|g| = 3$ получим, что $\alpha_1(g) = 3w$ и $w - 6$ делится на 7. Поэтому $w = 6, 13, 20$ или 27.

Лемма 7. *Если Ω — треугольник, то $|g| = 3$, $a \in \Omega$, $\alpha_1(g) = 3w$ и $w = 2, 9$ или 16.*

Доказательство. Если Ω является треугольником, то $|g| = 3$, $\alpha_1(g) = 3w$ и $\chi_2(g) = (12 + 3w - 18)/7$. В этом случае $w - 2$ делится на 7.

Так как $\langle g \rangle$-орбиты на окрестностях вершин из Ω являются кокликами, то $\alpha_0(g) + \alpha_2(g) \geqslant 36$ и $w = 2, 9$ или 16.

Лемма 8. *Подграф Ω не является (3×3)-решеткой.*

Доказательство. Если Ω является (3×3)-решеткой, то $|g| = 5$, $\alpha_1(g) = 5w$ и $\chi_2(g) = (36 + 5w - 18)/7$. В этом случае $w - 2$ делится на 7 и $w = 2, 9$ или 16.

С другой стороны, если $a \in \Omega$, то $\langle g \rangle$ имеет 5-орбиту на ребрах из $[a]-\Omega$ и $\alpha_2(g) = 90$, получаем противоречие. Лемма, а вместе с ней и теорема 1 доказаны.

Докажем следствие 1. В леммах 9–11 предполагается, что элемент g нечетного простого порядка p из G инвертируется или централизуется инволюцией t. Положим $\{a\} = \mathrm{Fix}(t)$, $\alpha(g) = pw$.

Лемма 9. *Если* $\mathrm{Fix}(g)$ *— пустой граф, то* $|g| = 3$, t *инвертирует* g, *орбита* $a^{\langle g \rangle}$ *является либо треугольником, причем* $w = 13$, *либо 3-кокликой, причем* $w = 6$ *и подграф* $\{a, a^g, a^{g^2}\} \cup ([a] \cap [a^g]) \cup ([a] \cap [a^{g^2}]) \cup ([a^g] \cap [a^{g^2}])$ *является* (3×3)*-решеткой.*

Доказательство. Пусть $|g| = 3$, $\alpha_1(g) = 3w$. Так как $\mathrm{Fix}(g)$ — пустой граф, то t инвертирует g (иначе $a \in \mathrm{Fix}(g)$). Поэтому $w = 6, 13, 20$ или 27.

Если орбита $a^{\langle g \rangle}$ является треугольником, то t переставляет остальные треугольные орбиты и w нечетно. Если $\{x, y, z\}$ — такая орбита, то вершины x, x^t не смежны. В противном случае $\{x, x^t\}$ и $\{y, y^t\}$ — ребра из $[a]$ и вершины x, y смежны, получаем противоречие. Так как $([a] \cup [a^g] \cup [a^{g^2}]) - \{a, a^g, a^{g^2}\}$ содержит 36 вершин, лежащих в кокликовых $\langle g \rangle$-орбитах, то $w = 13$.

Через Σ обозначим множество вершин из Γ, попадающих в треугольные $\langle g \rangle$-орбиты, переставляемые t. Заметим, что для любой пары переставляемых t треугольных $\langle g \rangle$-орбит, каждая вершина из $[a] - \{a^g, a^{g^{-1}}\}$ смежна с единственной вершиной из объединения данных орбит. Так как $w = 13$, имеется 6 пар переставляемых t треугольных $\langle g \rangle$-орбит.

Если орбита $a^{\langle g \rangle}$ является 3-кокликой, то t переставляет треугольные орбиты и w четно. Как и выше, если $\{x, y, z\}$ — треугольная орбита, то вершины x, x^t не смежны. Так как $([a] \cup [a^g] \cup [a^{g^2}]) - \{a, a^g, a^{g^2}\}$ содержит 42 вершины, лежащие в кокликовых $\langle g \rangle$-орбитах, то $w = 6$.

Положим $\{x, y\} = [a] \cap [a^g]$. Тогда t^{g^2} переставляет a, a^g и $y = x^{t^{g^2}}$. В этом случае подграф $\{a, a^g, a^{g^2}; x, y^t, x^g; y, x^t, y^g\}$ является $\langle g, t \rangle$-инвариантной (3×3)-решеткой.

Пусть $|g| = 11$. По лемме 6 имеется пять 11-угольных орбит, одна из которых фиксируется t. Без ограничения общности, вершины a, a^g смежны. Отсюда a^{g^5}, a^{g^6} смежны и переставляются инволюцией t. Получаем противоречие с тем, что тогда $a^{g^5}, a^{g^6} \in [a]$.

Лемма 10. *Если* $\mathrm{Fix}(g)$ *— одновершинный граф, то* $|g| = 7$, t *централизует* g *и* t *действует полурегулярно на множестве из* 12 *орбит группы* $\langle g \rangle$ *на* $\Gamma - a^{\perp}$.

Доказательство. Пусть $\{b\} = \mathrm{Fix}(g)$. Тогда $|g| = 7$, t фиксирует b и $b = a$. Поэтому t централизует g и $\langle g \rangle$ действует транзитивно на множестве ребер из $[a]$. Далее, t переставляет $\langle g \rangle$-орбиты на $\Gamma - a^{\perp}$.

Лемма 11. *Если* $\mathrm{Fix}(g)$ *является треугольником, то* $|g| = 3$ *и* $w = 2$ *или* 16.

Доказательство. Пусть $\mathrm{Fix}(g)$ — треугольник. Тогда $|g| = 3$, t фиксирует вершину из $\mathrm{Fix}(g)$ и $\mathrm{Fix}(g) = \{a, b, b^t\}$ для подходящей вершины b из $[a]$. Поэтому t централизует g и $\langle g \rangle$ действует полурегулярно на множестве ребер из $[a] - \{b, b^t\}$. Через Σ обозначим множество вершин из Γ, попадающих в треугольные $\langle g \rangle$-орбиты.

Заметим, что если f — элемент порядка 3, централизующий g и $\mathrm{Fix}(f) = \mathrm{Fix}(g)$, то группа $\langle f, g \rangle$ действует на множестве из 6 ребер графа $[a] - \{b, b^t\}$. Если $|\langle f, g \rangle| = 9$, то можно считать, что f и g являются 3-циклами из S_6 и $|\mathrm{Fix}(g)| \geqslant 9$, получаем противоречие. Поэтому $f \in \langle g \rangle$.

Так как t переставляет треугольные $\langle g\rangle$-орбиты, то $w = 2$ или 16. Заметим, что для любой пары переставляемых t треугольных $\langle g\rangle$-орбит, каждая вершина из $[a] - \mathrm{Fix}(g)$ смежна с единственной вершиной из объединения данных орбит.

Лемма доказана.

Лемма 12. *Группа G не содержит элементов порядка* 9.

Доказательство. Пусть g — элемент порядка 9 из G, $\Delta = a^{\langle g\rangle}$. Тогда $\mathrm{Fix}(g^3)$ — пустой граф и каждая $\langle g\rangle$-орбита либо является 9-угольником или кокликой, либо имеет 3 связные компоненты, являющиеся треугольниками. Так как $\chi_2(g^i) = (\alpha_1(g^i) - 18)/7$ для $i = 1, 2, 4$, то имеются 6 девятиугольных $\langle g\rangle$-орбит. По лемме 9 получим, что $\alpha_1(g^3) = 18$ или 39, поэтому число $\langle g\rangle$-орбит, состоящих из трех треугольников, равно 2, и число 9-кокликовых орбит равно 3.

Заметим, что Δ является 9-кокликой. Через X_i обозначим множество вершин из $\Gamma - \Delta$, смежных точно с i вершинами из Δ, и положим $x_i = |X_i|$. Тогда число 2-путей с концами в Δ равно 72.

Пусть $a_0 = a$, $a_1 = a^9$, $a_2 = a^{g^2}$, Σ_i является (3×3)-решеткой, полученной в лемме 9 с помощью орбиты $a_i^{\langle g^3\rangle}$. Тогда каждая вершина из $\Delta - \Sigma_0$ смежна с единственной вершиной из $\Sigma_0 - \Delta$ и $x_4 = 18$. Получаем противоречие с тем, что тогда число 2-путей с концами в Δ не меньше 108.

Завершим доказательство следствия. Мы показали, что $|[G, t]|$ делит 9 и $|G_G(t)|$ делит 42. Если G содержит перестановочные элементы f и g порядков 3 и 7, то f фиксирует вершину a из $\mathrm{Fix}(g)$. Поэтому $\mathrm{Fix}(f)$ — треугольник, попадающий в $\mathrm{Fix}(g)$, получаем противоречие. Если 21 делит $|G|$, то G содержит такие элементы f и g порядков 3 и 7, что $g^f = g^2$. Для вершины b такой, что $\{a, b, b^t\} = \mathrm{Fix}(f)$ подграф $b^{\langle g\rangle}$ является 7-кокликой (иначе можно считать, что вершины b, b^g смежны, $(b^g)^f = b^{g^2}$, но $(b^{g^2})^f = b^{g^4}$, получаем противоречие). Итак, если 7 делит $|G|$, то $O(G)$ — группа порядка 7 или неабелева группа порядка 21.

Пусть теперь $|G|$ не делится на 7. Допустим, что G содержит перестановочные элементы f и g порядка 3 такие, что $f^t = f$, $g^t = g^{-1}$. Тогда $\mathrm{Fix}(f) = \{a, b, b^t\}$ — треугольная $\langle g\rangle$-орбита. По лемме 9 имеется 13 треугольных и двадцать 3-кокликовых $\langle g\rangle$-орбит. Поэтому некоторая 3-кокликовая $\langle g\rangle$-орбита Σ является $\langle f, g\rangle$-допустимой. Получаем противоречие с тем, что тогда $\Sigma \subset \mathrm{Fix}(h)$ для некоторого элемента h порядка 3 из $\langle f, g\rangle$.

Допустим, наконец, что $O(G)$ порождается элементами f и g порядка 3 такими, что $f^t = f^{-1}$, $g^t = g^{-1}$. Ввиду леммы 9 имеется 20 или 27 кокликовых $\langle g\rangle$-орбит. Из действия $\langle f\rangle$ на этих орбитах следует, что первый случай невозможен. Поэтому $a^{\langle x\rangle}$ является кокликовой орбитой для любого элемента x порядка 3 из G. По лемме 9 подграф $\{a, a^x, a^{x^2}\} \cup ([a] \cap [a^x]) \cup ([a] \cap [a^{x^2}]) \cup ([a^x] \cap [a^{x^2}])$ является (3×3)-решеткой. Таким образом, Γ содержит четыре (3×3)-решетки этого типа, содержащие a. Если любые две из этих решеток пересекаются по единственной вершине a, то степень a в графе Γ не меньше 16. Поэтому можно считать, что решетки, отвечающие f и g пересекаются по треугольнику $\{a, u, w\}$, где $u \in [a] \cap [a^f] \cap [a^g]$, $w \in [a] \cap [a^{f^2}] \cap [a^{g^2}]$, $u^t = w$. Действуя элементами f^{-1}, g^{-1} на первое включение, получим, что

$$u^{f^{-1}} \in [a^{f^{-1}}] \cap [a] \cap [a^{f^{-1}g}], \qquad u^{g^{-1}} \in [a^{g^{-1}}] \cap [a^{fg^{-1}}] \cap [a].$$

Действуя элементами f, g на второе включение, получим, что

$$w^f \in [a^f] \cap [a] \cap [a^{g^{-1}f}], \qquad w^g \in [a^g] \cap [a^{gf^{-1}}] \cap [a].$$

Поэтому любые две из трех (3 × 3)-решеток, отвечающих орбитам $a^{\langle f\rangle}$, $a^{\langle g\rangle}$, $a^{\langle f^{-1}g\rangle}$, пересекаются по треугольнику. Эти три решетки можно представить в виде трех граней куба с общей вершиной a. При этом вершины w^f, w^g попадают в μ-подграф a и вершины из $\{a^{fg^{-1}}, a^{f^{-1}g}\}$, получаем противоречие. Таким образом, $|O(G)|$ делит 3. Следствие доказано.

Список литературы

1. Махнев А. А., Падучих Д. В., Об автоморфизмах графа Ашбахера. *Алгебра и логика* (2001) **40**, №2, 125–134.
2. Brouwer A. E., Cohen A. M., Neumaier A. *Distance-regular graphs.* Springer, Berlin, 1989.
3. Cameron P., *Permutation groups.* Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1999.

Статья поступила 18.12.2002.