

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕТРА  
ВЕЛИКОГО

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ

**Отчет по лабораторной работе №3  
по дисциплине "Интервальный анализ"**

Выполнил:

Студент: Попов Павел Сергеевич

Группа: 5030102/00201

Принял:

к. ф.-м. н., доцент

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург  
2023 г.

# Содержание

<b>1</b>	<b>Постановка задачи</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Теория</b>	<b>2</b>
2.1	Внешнее множество решений . . . . .	2
2.2	Метод Кравчика . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Результаты</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Вывод</b>	<b>3</b>

# 1 Постановка задачи

Задана система нелинейных уравнений:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x = y^2 \end{cases}$$

Необходимо найти корни данной системы точечных нелинейных уравнений, используя интервальный метод Кравчика.

## 2 Теория

### 2.1 Внешнее множество решений

Внешним множеством решений называется объединенное множество решений, образованное решениями всех точечных систем  $F(a, x) = b$

$$\Xi_{\text{uni}}(\mathbf{F}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (\exists a \in \mathbf{a})(\exists b \in \mathbf{b})(F(a, x) = b)\} \quad (1)$$

### 2.2 Метод Кравчика

Метод Кравчика предназначен для уточнения двухсторонних границ решений систем уравнений, в общем случае нелинейных, заданных на некотором брус  $\mathbf{X} \subset \mathbb{IR}$ , вида

$$F(x) = 0, \quad \text{где } F(x) = \{F_1(x), \dots, F_n(x)\}^T, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \quad (2)$$

Также данный метод может быть использован для того, чтобы понять, что решений нет.

Отображение  $\mathcal{K} : \mathbb{ID} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{IR}^n$ , задаваемое выражением

$$\mathcal{K}(\mathbf{X}, \bar{x}) := \bar{x} - \Lambda * F(\bar{x}) - (I - \Lambda * \mathbf{L} * (\mathbf{X} - \bar{x})) \quad (3)$$

называется оператором Кравчика на  $\mathbb{ID}$  относительно точки  $\bar{x}$ .

Итерационная схема данного метода выглядит следующим образом

$$\mathbf{X}^{k+1} \leftarrow \mathbf{X}^k \cap \mathcal{K}(\mathbf{X}^k, \bar{x}^k), \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad x^k \in \mathbf{X}^k \quad (4)$$

Сходимость данного метода гарантирована при выполнении условия

$$\rho(|I - \Lambda * \mathbf{L}|) < 1 - \text{спектральный радиус меньше единицы} \quad (5)$$

Частным случаем данного метода является линейный метод Кравчика, итерационная схема которого выглядит следующим образом:

$$\mathbf{x}^{k+1} = (\Lambda * \mathbf{b} + (I - \Lambda * \mathbf{A}) * \mathbf{x}^k) \cap \mathbf{x}^k \quad (6)$$

$\mathbf{A}$  в данном случае является интервальной матрицей коэффициентов соответствующей ИСЛАУ, а  $\mathbf{b}$  - вектором свободных членов.

В случае линейности системы и выполнения условия  $\eta = \|I - \Lambda * \mathbf{A}\|_{\infty} \leq 1$  в качестве начального приближения можно взять брус

$$\mathbf{x}^0 = ([-\theta, \theta], \dots, [-\theta, \theta])^T, \quad \text{где } \theta = \frac{\|\Lambda \mathbf{b}\|_{\infty}}{1 - \eta} \quad (7)$$

### 3 Результаты




Рис. 1: Метод Кравчика - пересечение параболы и окружности

Получим таблицу результатов для некоторых  $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$

№	$\mathbf{X}_1$	$\mathbf{X}_2$	ширина $\mathbf{X}_1$	ширина $\mathbf{X}_2$
1	[0, 1]	[0, 1]	1.0	1.0
2	[0.125, 1]	[0, 1]	0.875	1.0
3	[0.406219, 1]	[0.111684, 1]	0.5937	0.8883
4	[0.534126, 1]	[0.266059, 0.973673]	0.4658	0.7076
5	[0.64279, 0.92999]	[0.409351, 0.82672]	0.2871	0.4173
6	[0.735163, 0.83714]	[0.542195, 0.693873]	0.1020	0.1517
7	[0.779572, 0.79273]	[0.608239, 0.627829]	0.0132	0.0196
8	[0.786042, 0.786261]	[0.617871, 0.618197]	0.000219	0.0003264
9	[0.786151, 0.786151]	[0.618034, 0.618034]	$6.08 \cdot 10^{-8}$	$9.06 \cdot 10^{-8}$

### 4 Вывод

- Точное решение данной системы  $x = 0.6180339, y = 0.7861513$  совпадает с полученным результатом. Полученные результаты подтверждают эффективность и сходимость интервального метода Кравчика для решения системы нелинейных уравнений.
- На 9 итерации метод дошел до  $2.52 \cdot e^{-8}$  и  $2.46 \cdot e^{-7}$  соответственно
- Сходимость метода обеспечивается выполнением условия  $\rho(I - \Lambda * \mathbf{L}) < 1$ , что подчеркивает важность выбора подходящих параметров и начальных условий для успешной работы метода.