hormones	Profil de sécrétion	Origine : structure sécrétrice	Structure cible	Effets biologique
œstrogènes	il présente 2 pics *un grand pic 12éme jour. *un petit pic au 21éme jour.	- thèques internes du follicule tertiaire et mûr -granulosa (au cours de la phase folliculaire) - corps jaune (phase lutéale)	-l'endomètre -le myomètre -col de l'utérus -Structure responsables des caractères sexuelles - structure responsable de la régulation de température (thermostat) -complexe(H.H)	-Prolifération de l'endomètre -sensibilise les cellules de l'endomètre à l'action intérieur de la progestérone. -stimule la contraction de myomètre -il assure une sécrétion abondante et filante de la glaire cervicale au cours de l'ovulation -développement et maintien du (CSII). - baisse de la température corporelle inférieure à 37 °c. RC(-) à faible dose d'œstrogène et RC(+) à forte dose
progestérone	Il est secrété que pendant la phase lutéinique et présente 1 seul pic au 21é jours	corps jaune	-endomètre proliféré -myomètre -col de l'utérus assure le bon déroulement de la grossesse - structure responsable de la régulation de température (thermostat)	-maturation de l'endomètre (dentelle et glandes sécrétrices) -inhibe la contraction de myomètre (silence utérin) -responsable d'une sécrétion peu-abondante et dense de la glaire cervicale. -augmentation de la température corporelle supérieure à 37 °c.
testostérone	Presque constant	Testicule (tissu interstitiel)	-Structure responsables des caractères sexuelles CSI et CSII. -testicule. -complexe(H.H)	-développement et maintien du (CSI et CSII). -déroulement de la spermatogenèse avec l'action de l'ABP. -RC (-) à forte dose de testostérone

SÉRIYATAK.COM
SÉRIYATAK.COM
+222 34343520