

TRABAJO INDIVIDUAL — ANIMALES VERTEBRADOS

Fichas Técnicas: Mamífero y Reptil

FICHA 1 — MAMÍFERO

FICHA TÉCNICA: JAGUAR	
NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Jaguar	Panthera onca
TAXONOMÍA	
Dominio	Eukarya
Reino	Animalia
Filo	Chordata
Clase	Mammalia
Orden	Carnivora
Familia	Felidae
Género	Panthera
Especie	Panthera onca
DESCRIPCIÓN	
Distribución geográfica	Desde el suroeste de EE.UU. y México, a través de América Central y del Sur hasta Argentina y Paraguay. Mayor concentración en la Amazonia brasileña.
Historia natural	Es el felídeo más grande de América y el tercero más grande del mundo. Ha existido en América durante al menos 280,000 años. Fue venerado por culturas mesoamericanas como los mayas y aztecas.
Hábitat	Selvas tropicales húmedas, bosques secos, sabanas, pantanos (como el Pantanal) y zonas ribereñas. Prefiere áreas cercanas a fuentes de agua.
Hábitos	Principalmente nocturno y crepuscular. Es un excelente nadador y trepador. Solitario y territorial. Caza mediante emboscada.
Organización social	Solitario. Cada individuo defiende un territorio que puede abarcar entre 25 y 150 km². Los machos tienen territorios más grandes que se superponen con los de varias hembras.
Alimentación	Carnívoro. Se alimenta de más de 87 especies: caimanes, tortugas, carpinchos, ciervos, tapires, peces y animales domésticos ocasionalmente.
Desarrollo embrionario	Viviparismo placentario. Las crías se desarrollan completamente dentro del útero materno, nutridas por la placenta.
Número de crías	1 a 4 crías por camada, generalmente 2. Las crías nacen ciegas y dependen totalmente de la madre.

Período de gestación	93 a 105 días (aproximadamente 3 meses y medio). Las crías permanecen con la madre hasta los 2 años.
-----------------------------	--

FICHA TÉCNICA: IGUANA VERDE	
NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Iguana verde	Iguana iguana
TAXONOMÍA	
Dominio	Eukarya
Reino	Animalia
Filo	Chordata
Clase	Reptilia
Orden	Squamata
Familia	Iguanidae
Género	Iguana
Especie	Iguana iguana
DESCRIPCIÓN	
Distribución geográfica	Desde México hasta Paraguay y el norte de Argentina. También presente en islas del Caribe. Ha sido introducida en Florida, Texas, Hawái y el sur de Europa.
Historia natural	Es uno de los lagartos más grandes de América. Ha sido utilizada como fuente de alimento por poblaciones indígenas durante siglos. Su nombre proviene del arahuaco 'iwana'.
Hábitat	Bosques tropicales y subtropicales, especialmente en zonas ribereñas y costeras. Frecuentemente se encuentra en árboles sobre cuerpos de agua, ya que son excelentes nadadoras.
Hábitos	Diurna y arborícola. Cuando se siente amenazada puede saltar desde árboles al agua para escapar. Es un reptil ectotermo que regula su temperatura tomando el sol.
Organización social	Semi-social con jerarquías de dominancia. Los machos adultos son territoriales y compiten entre sí durante la época de cría. Las hembras pueden compartir sitios de anidación.
Alimentación	Herbívora. Se alimenta principalmente de hojas, flores, frutos y en menor medida insectos cuando son juveniles. Prefiere plantas como la begonia, la bugambilia y diversas leguminosas.
Desarrollo embrionario	Ovipara. Las hembras depositan huevos en madrigueras que excavan en suelo arenoso y soleado. Los huevos se desarrollan externamente sin cuidado parental.
Número de crías	Entre 20 y 71 huevos por puesta, dependiendo del tamaño de la hembra. Las crías miden unos 17-25 cm al eclosionar.
Período de gestación	Período de incubación de 60 a 90 días tras la puesta, dependiendo de la temperatura del suelo. No hay gestación interna como en mamíferos.

