

به نام خدا

گزارش تمرین کامپیوتری دوم بهینه سازی محدب

مهیار غضنفری 98102057



سوال اول:

بخش اول:

در اینجا باید تابع likelihood را مینیمم کنیم. پس داریم:

$$L(\lambda_t) = -\log e^{-\lambda_t} \frac{\lambda_t^k}{k!}$$

$$\frac{\partial L(\lambda_t)}{\partial \lambda_t} = 1 - \frac{N_t}{\lambda_t} = 0 \Rightarrow N_t = \lambda_t$$

که در حالت $N_t = 0$ هم به همین حالت می‌رسیم.

بخش دوم:

هنگام مینیمم کردن تابع MLE می‌توانیم تابع regularization را به آن اضافه کنیم:

$$\text{Minimize} \sum_{t=1}^{24} L(\lambda_t) + \rho \sum_{t=1}^{24} (\lambda_{t+1} - \lambda_t)^2 + \rho((\lambda_{24} - \lambda_1)^2$$

با توجه به بخش قبل می‌توان نوشت :

$$\text{Minimize} \sum_{t=1}^{24} \lambda_t - \sum_{t=1}^{24} N_t \log \lambda_t + \rho \sum_{t=1}^{23} (\lambda_{t+1} - \lambda_t)^2 + \rho((\lambda_{24} - \lambda_1)^2$$

که در رابطه بالا تک تک مولفه‌ها محدب هستند.

بخش سوم:

اگر عبارت ρ به بینهایت میل کند، λ_i ‌ها برابر خواهند بود و مسئله به هموار سازی لانداها تبدیل می‌شود و این یعنی دیگر به کمینه کردن تابع likelihood توجه نخواهد کرد.

سوال دوم:

مسئله را می‌توان به شکل زیر در نظر گرفت:

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \sum_{j=1}^n r_j(x_j) \\ & \text{subject to} && x \geq 0 \\ & && Ax \leq c^{\max} \end{aligned}$$

از آنجایی که تابع هدف concave و قیود مسئله مجموعه‌ای از نامساوی‌های خطی هستند، این یک مسئله بهینه‌سازی محدب است. برای تبدیل آن به فرم LP می‌توان توابع درآمد را به شکل زیر بنویسیم:

$$r_j(x_j) = \min\{p_j x_j, p_j q_j + p_j^{\text{disc}}(x_j - q_j)\}$$

حال $r_j(x_j) \geq u_j$ اگر و فقط اگر:

$$p_j x_j \geq u_j, \quad p_j q_j + p_j^{\text{disc}}(x_j - q_j) \geq u_j$$

میتوانیم مسئله LP را به شکل زیر تعریف کنیم:

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && 1^T u \\ & \text{subject to} && x \geq 0 \\ & && Ax \leq c^{\max} \\ & && p_j x_j \geq u_j, \quad u_j, \quad p_j q_j + p_j^{\text{disc}}(x_j - q_j) \geq u_j \end{aligned}$$

که می‌توان نشان داد این مسئله و مسئله اصلی معادل هستند.

سوال سوم:

بخش اول:

سوختی که در سگمنت i ام مصرف می شود برابر $\frac{d_i}{s_i} \varphi(s_i)$ است. پس کل سوخت مصرفی برابر $\sum_{i=1}^n \frac{d_i}{s_i} \varphi(s_i)$ است. وسیله نقلیه در زمان $\tau_i = \sum_{j=1}^i \frac{d_j}{s_j}$ به مسیر i می رسد. پس مسئله ما به شکل :

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{i=1}^n \frac{d_i}{s_i} \varphi(s_i) \\ & \text{subject to} && s_i^{\min} \leq s_i \leq s_i^{\max} \quad i = 1, \dots, n, \\ & && \tau_i^{\min} \leq \sum_{j=1}^i \frac{d_j}{s_j} \leq \tau_i^{\max} \quad i = 1, \dots, n, \end{aligned}$$

با متغیر های s_1, \dots, s_n

که مسئله در این فرم محدب نیست. اگر در متغیر ها تغییر ایجاد کنیم، می توانیم مسئله را به یک مسئله محدب تبدیل کنیم. متغیر های مسئله را t_1, \dots, t_n در نظر می گیریم. دقت داریم که t_i ها همان $\frac{d_i}{s_i}$ هستند. در نتیجه این موضوع $s_i = \frac{d_i}{t_i}$ خواهد بود. مسئله جدید را می توان به شکل زیر نوشت:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{i=1}^n t_i \varphi\left(\frac{d_i}{t_i}\right) \\ & \text{subject to} && \frac{d_i}{s_i^{\max}} \leq t_i \leq \frac{d_i}{s_i^{\min}} \quad i = 1, \dots, n, \\ & && \tau_i^{\min} \leq \sum_{j=1}^i t_j \leq \tau_i^{\max} \quad i = 1, \dots, n, \end{aligned}$$

که همان طور که ذکر شد متغیر های جدید همان t_1, \dots, t_n خواهند بود. این مسئله یک مسئله محدب است. این مسئله از تغییر متغیر اصلی مسئله از سرعت هر سگمنت به زمان هر سگمنت به دست آمده است. همچنین از آنجایی که تابع هدف محدب است (چون جمع تعدادی تابع محدب است و می دانیم که مجموع تعدادی تابع محدب، یک تابع محدب است) و قیود مسئله هم محدب هستند، می توانیم نتیجه بگیریم که این مسئله یک مسئله بهینه سازی محدب است.