تفکر بیزی داشته باش آمار بیزی ساده شد!

نویسنده: آلن. ب. داونی مترجم: امیرعباس اسدی

فهرست مطالب

| ۵ | یهی بیز | قضب |
|---|-----------------------|-----|
| ۵ | احتمال شرطی | 1.1 |
| ۶ | احتمال توأم | ۲.۱ |
| ۶ | مسئلهی کوکی | ٣.١ |
| ۶ | قضیهی بیز | ۴.۱ |
| ۶ | تفسير در طول زمان | ۵.۱ |
| ۶ | . مسئلهی M & M | ۶.۱ |
| ۶ | مسئلهی مونتی هال | ٧.١ |
| ۶ | ٠٠٠. | ۸.۱ |

فهرست مطالب

نصل ۱

قضيهي بيز

۱.۱ احتمال شرطی

ایده ی بنیادی پشت تمام آمار بیزی قضیه ی بیزا است، قضیه ای که به طرز شگفت انگیزی بدست آوردنش آسان بوده و همچنین امکان درک احتمال شرطی را فراهم می کند. بحث را از احتمال آغاز کرده، سپس احتمال شرطی، قضیه ی بیز و در آخر آمار بیزی را بررسی می کنیم.

احتمال عددی بین 0 و 1 (شامل این دو هم می شود) و نشانگر درجهی باور ما به یک حقیقت یا پیشبینی است. مقدار 1 نشان دهنده اطمینان از درستی یک حقیقت است. درستی یک حقیقت است.

مقادیر میانی نشان دهنده ی درجه ی اطمینان و قطعیت هستند. مقدار 0.5 که اغلب به صورت %50 نوشته می شود، به این معناست که وقوع یک پیشبینی به اندازه ی عدم وقوع آن محتمل است. مثلا احتمال اینکه یک سکه ی پرتاب شده شیر باشد بسیار نزدیک %50 است.

یک احتمال شرطی^۲ احتمالی بر اساس برخی از اطلاعات قبلی است. برای مثال من می خواهم بدانم احتمال اینکه در سال آینده دچار یک حملهی قلبی شوم چقدر است. بر طبق CDC، سالانه حدود 785,000 آمریکایی اولین حملهی قلبی خود را تجربه می کنند. جمعیت ایالات متحده حدودا 311 میلیون نفر است، بنابراین احتمال اینکه یک آمریکایی که به طور تصادفی انتخاب شده در سال آینده دچار یک حملهی قلبی شود، حدودا 30.3 است. اما من که یک آمریکایی که به صورت تصادفی انتخاب شده باشد نیستم. همه گیر شناسان پی برده اند که عوامل زیادی بر میزان خطر وقوع حملهی قلبی تاثیر می گذارند؛ بر اساس آن عوامل، احتمال اتفاق افتادن یک حملهی قلبی برای من می تواند بالاتر یا پایین تر از میانگین باشد. من یک مرد هستم، 45 سال سن و کلسترول تقریبا بالایی دارم. این عوامل شانس ابتلاء را افزایش می دهند. در حالیکه، فشار خون من پایین است، سیگار نمی کشم و این عوامل شانس را کاهش می دهند. من با وارد کردن اطلاعاتم در یک محاسبه کننده ی آنلاین به آدرس 10.2 و میری حدود 20.0% کمتر از میانگین است. این مقدار یک احتمال شرطی است چون بر اساس عواملی است که شرایط من محسوب می شوند.

معمولا احتمال شرطی را به صورت p(A|B) نمایش می دهند که معنای آن احتمال درستی A با فرض درستی B است.در این مثال، A نشان

¹Bayes's Theorem

²Conditional Probability

³http://www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm

فصل ۱. قضیهی بیز

دهنده ی ابتلای من به حمله ی قلبی در سال آینده و B نشان دهنده ی شرایطی که نام بردم است.

۲.۱ احتمال توأم

احتمال توأم * روشی برای بیان احتمال درستی دو چیز است. منظورمان از $p(A\ and\ B)$ ، احتمال درستی هر دو رخداد A و B است. اگر شما در مورد احتمال پرتاب سکه و تاس بدانید احتمال فرمول زیر را آموخته اید.

$$p(A\ and\ B) = p(A)p(B)$$
 هشدار: این فرمول همیشه درست نیست

برای مثال اگر دو سکه را پرتاب کنیم و معنی A شیر بودن سکه اول و معنی B شیر بودن سکه دوم باشد، خواهیم داشت A شیر و معنی A شیر بودن سکه دوم باشد، خواهیم داشت A شیر و معنی A شیر بودن سکه اول و معنی A شیر و A مستقل هستند. به عبارت دیگر دانستن بنابراین A و A مستقل هستند. به عبارت دیگر دانستن نتیجه ی رخداد اول، احتمال رخداد دوم را تغییر نمی دهد، مطابق تعریف A تعریف A مستقل هستند. به عبارت دیگر دانستن نتیجه ی رخداد اول، احتمال رخداد دوم را تغییر نمی دهد، مطابق تعریف A

اکنون مثالی متفاوت که در آن A و B مستقل نیستند را بررسی می کنیم. فرض کنید A یعنی امروز باران می آید و B یعنی اینکه فردا باران می آید. اگر بدانیم که امروز باران آمده، امکان اینکه فردا هم باران ببارد بیشتر است بنابراین p(B|A) > p(B)

به صورت كلى احتمال توأم برابر است با

$$p(A \text{ and } B) = p(A)p(B|A)$$

برای هر دو رخداد A و B. با این اوصاف اگر احتمال باران آمدن در هر روز 0.5 باشد، احتمال باران آمدن در دو روز پشت سر هم 0.25 نبوده و احتمالا کمی بیشتر است.

- ۳.۱ مسئلهی کوکی
 - ۴.۱ قضیهی بیز
- ۵.۱ تفسیر در طول زمان
 - ۶.۱ مسئله ی M & M
- ۷.۱ مسئلهی مونتی هال
 - ۸.۱ بحث

⁴Conjoint Probability