

• Contravariant Vector:

(note the contraction)

$$\bar{A}^P = \sum_{q=1}^N \frac{\partial \bar{x}^P}{\partial x^q} A^q$$

$$= \frac{\partial \bar{x}^P}{\partial x^q} A^q$$

Transformation

$$\# \left\{ \begin{matrix} A^1, A^2, \dots, A^N \\ x^1, x^2, \dots, x^N \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} \bar{A}^1, \bar{A}^2, \dots, \bar{A}^N \\ \bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^N \end{matrix} \right\}$$

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}; \quad \frac{\partial G}{\partial x^i} = \partial_i G, \quad \frac{\partial G}{\partial x^i} = \partial_i G$$

• Covariant Vector:

(note the contraction)

$$\bar{A}_P = \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^P} A_q = \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^P} A_q$$

Transformation

$$\# \left\{ \begin{matrix} A_1, A_2, \dots, A_N \\ x^1, x^2, \dots, x^N \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} \bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots, \bar{A}_N \\ \bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^N \end{matrix} \right\}$$

Scalar \rightarrow Tensor of Rank 0

Vector \rightarrow Tensor of Rank 1

Vector \rightarrow Tensor of Rank 2

RANK-2 TENSOR

• Contravariant Tensor :

$$\bar{A}^{pr} = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^q} \frac{\partial \bar{x}^r}{\partial x^s} A^{qs}$$

(careful about contraction)

Transformation

$$\# \{ A^{qs} \} \Rightarrow \{ \bar{A}^{pr} \}$$

$$\# \{ x^1, x^2, \dots, x^N \} \Rightarrow \{ \bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^N \}$$

• Covariant Tensor :

$$\bar{A}_{pr} = \frac{\partial x^q}{\partial \bar{x}^p} \frac{\partial x^s}{\partial \bar{x}^r} A_{qs}$$

Transformation

$$\# \{ A_{qs} \} \Rightarrow \{ \bar{A}_{pr} \}$$

$$\# \{ x^1, x^2, \dots, x^N \} \Rightarrow \{ \bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^N \}$$

• Mixed Tensor :

$$\bar{A}^p_s = \frac{\partial \bar{x}^p}{\partial x^q} \frac{\partial x^s}{\partial \bar{x}^r} A^q_r$$

$$\overline{A}^P = \frac{\partial x^S}{\partial \overline{x}^Q} \frac{\partial \overline{x}^P}{\partial x^S} A_S$$

$$= \frac{\partial \overline{x}^P}{\partial x^Q} \frac{\partial x^S}{\partial \overline{x}^Q} A_S$$

Example: Balance laws (fluid):

$$\text{Mass} \Rightarrow \partial_t \rho + \vec{\nabla} \cdot \vec{J}^{\text{mass}} = 0$$

$$\vec{J}_i^{\text{mass}} = -P_{ij} \partial^j \rho - E_{ijk} \partial^j \partial^k \rho$$

$$- F_{ijkl} \partial^j \partial^k \partial^l \rho - \dots$$

Linear momentum, energy, angular momentum

constitutive relation of the currents

\Rightarrow Onsager-Casimir Reciprocity Relation. \Rightarrow Nonequilibrium

Thermodynamics

Scalar \rightarrow Projection = $\hat{a} \cdot \vec{b}$

pseudoscalar \rightarrow sign change in parity inversion

$$V = \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}$$

$\vec{b} \times \vec{c}$ pseudovector

vector (polar) \rightarrow transforms under proper rotation

pseudovector (axial) \rightarrow sign change in improper rotation (reflection)

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \vec{\omega} = \vec{\nabla} \times \vec{v}, \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}, \vec{B}, \vec{\Omega}$$

polar vector \times polar vector = axial vector / pseudovector

polar vector \cdot pseudovector = pseudoscalar

tensors :

pseudotensor: sign change in parity inversion

Levi Civita $\epsilon_{ij}, \epsilon_{ijk}$

dual tensor :