

Exercise 1.4

Solve the following equations.

(1) $2x + 5 = \sqrt{7x + 16}$

Solution:

$$2x + 5 = \sqrt{7x + 16} \quad \dots\dots(i)$$

Squaring both sides, we get

$$(2x + 5)^2 = (\sqrt{7x + 16})^2$$

$$4x^2 + 20x + 25 = 7x + 16$$

$$4x^2 + 20x + 25 - 7x - 16 = 0$$

$$4x^2 + 20x - 7x + 25 - 16 = 0$$

$$4x^2 + 13x + 9 = 0$$

$$4x^2 + 9x + 4x + 9 = 0$$

$$x(4x + 9) + 1(4x + 9) = 0$$

$$(x + 1)(4x + 9) = 0$$

Either $x + 1 = 0$ or $4x + 9 = 0$

$$x = -1 \quad 4x = -9$$

$$x = -\frac{9}{4}$$

Check :

Put $x = -1$ in eq.(i), we get

$$x = \frac{12}{6} \quad x = \frac{164}{6}$$

$$x = 2 \quad x = \frac{82}{3}$$

Check :

Put $x = 2$ in eq.(i), we get

$$\sqrt{11-2} - \sqrt{6-2} = \sqrt{27-2}$$

$$\sqrt{9} - \sqrt{4} = \sqrt{25}$$

$$3 - 2 = 5$$

$$1 = 5 \quad (\text{which is not true})$$

Put $x = \frac{82}{3}$ in eq.(i), we get

$$\sqrt{11 - \frac{82}{3}} - \sqrt{6 - \frac{82}{3}} = \sqrt{27 - \frac{82}{3}}$$

$$\sqrt{-\frac{49}{3}} - \sqrt{-\frac{64}{3}} = \sqrt{-\frac{1}{3}}$$

$$\frac{7i}{\sqrt{3}} - \frac{8i}{\sqrt{3}} = \frac{i}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{-i}{\sqrt{3}} = \frac{i}{\sqrt{3}} \quad (\text{which is not true})$$

Thus, solution set = $\{ \}$

$$(8) \sqrt{4a+x} - \sqrt{a-x} = \sqrt{a}$$

Solution:

$$\sqrt{4a+x} - \sqrt{a-x} = \sqrt{a} \quad \dots (i)$$

Squaring both sides, we get

$$(\sqrt{4a+x} - \sqrt{a-x})^2 = (\sqrt{a})^2$$

$$(4a+x) + (a-x) - 2\sqrt{(4a+x)(a-x)} = a$$

$$4a+x+a-x-2\sqrt{4a^2-3ax-x^2} = a$$

$$5a-2\sqrt{4a^2-3ax-x^2} = a$$

$$-2\sqrt{4a^2-3ax-x^2} = a-5a$$

$$-2\sqrt{4a^2 - 3ax - x^2} = -4a$$

$$\Rightarrow \sqrt{4a^2 - 3ax - x^2} = 2a$$

Squaring both sides, we get

$$\left(\sqrt{4a^2 - 3ax - x^2}\right)^2 = (2a)^2$$

$$4a^2 - 3ax - x^2 = 4a^2$$

$$4a^2 - 4a^2 - 3ax - x^2 = 0$$

$$-3ax - x^2 = 0$$

$$-x(x + 3a) = 0$$

$$x(x + 3a) = 0$$

Either $x = 0$ or $x + 3a = 0$

$$x = -3a$$

Check :

Put $x = 0$ in eq.(i), we get

$$\sqrt{4a + 0} - \sqrt{a - 0} = \sqrt{a}$$

$$\sqrt{4a} - \sqrt{a} = \sqrt{a}$$

$$2\sqrt{a} - \sqrt{a} = \sqrt{a}$$

$$\sqrt{a} = \sqrt{a} \quad (\text{which is true})$$

Put $x = -3a$ in eq.(i), we get

$$\sqrt{4a + (-3a)} - \sqrt{a - (-3a)} = \sqrt{a}$$

$$\sqrt{4a - 3a} - \sqrt{a + 3a} = \sqrt{a}$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{4a} = \sqrt{a}$$

$$\sqrt{a} - 2\sqrt{a} = \sqrt{a}$$

$$-\sqrt{a} = \sqrt{a} \quad (\text{which is not true})$$

Thus, solution set = $\{0\}$

$$(9) \sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + x - 1} = 1$$

Solution:

$$\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x-1}=1 \quad \dots\dots(i)$$

$$\text{Let } x^2+x=y$$

So eq.(i) becomes

$$\sqrt{y+1}-\sqrt{y-1}=1$$

Squaring both sides, we get

$$(\sqrt{y+1}-\sqrt{y-1})^2=1$$

$$(y+1)+(y-1)-2\sqrt{(y+1)(y-1)}=1$$

$$y+1+y-1-2\sqrt{y^2-1}=1$$

$$2y-2\sqrt{y^2-1}=1$$

$$-2\sqrt{y^2-1}=1-2y$$

Squaring both sides, we get

$$(-2\sqrt{y^2-1})^2=(1-2y)^2$$

$$4(y^2-1)=1-4y+4y^2$$

$$4y^2-4=1-4y+4y^2$$

$$4y^2-4-1+4y-4y^2=0$$

$$4y-5=0$$

$$y=\frac{5}{4}$$

Put $y=\frac{5}{4}$ in $x^2+x=y$, we get

$$x^2+x=\frac{5}{4}$$

$$4x^2+4x=5$$

$$4x^2+4x-5=0$$

Here $a=4$, $b=4$, $c=-5$

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{(4)^2 - 4(4)(-5)}}{2(4)}$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 80}}{8}$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{96}}{8}$$

$$x = \frac{-4 \pm 4\sqrt{6}}{8} = \frac{4(-1 \pm \sqrt{6})}{8} = \frac{-1 \pm \sqrt{6}}{2}$$

$$\text{Thus, solution set} = \left\{ \frac{-1 \pm \sqrt{6}}{2} \right\}$$

$$(10) \quad \sqrt{x^2 + 3x + 8} + \sqrt{x^2 + 3x + 2} = 3$$

Solution:

$$\sqrt{x^2 + 3x + 8} + \sqrt{x^2 + 3x + 2} = 3 \quad \dots (i)$$

$$\text{Let } x^2 + 3x = y$$

So eq. (i) becomes

$$\sqrt{y + 8} + \sqrt{y + 2} = 3$$

Squaring both sides, we get

$$(\sqrt{y + 8} + \sqrt{y + 2})^2 = (3)^2$$

$$(y + 8) + (y + 2) + 2\sqrt{(y + 8)(y + 2)} = 9$$

$$y + 8 + y + 2 + 2\sqrt{y^2 + 10y + 16} = 9$$

$$2y + 10 + 2\sqrt{y^2 + 10y + 16} = 9$$

$$2\sqrt{y^2 + 10y + 16} = 9 - 2y - 10$$

$$2\sqrt{y^2 + 10y + 16} = -2y - 1$$

$$2\sqrt{y^2 + 10y + 16} = -(2y + 1)$$

Squaring both sides, we get

$$\left(2\sqrt{y^2+10y+16}\right)^2 = \left[-(2y+1)\right]^2$$

$$4(y^2+10y+16) = 4y^2+4y+1$$

$$4y^2+40y+64 = 4y^2+4y+1$$

$$4y^2-4y^2+40y-4y+64-1=0$$

$$36y = -63$$

$$y = -\frac{63}{36}$$

$$\text{Put } y = -\frac{63}{36} \text{ in } x^2+3x=y, \text{ we get}$$

$$x^2+3x = -\frac{63}{36}$$

$$\Rightarrow 36x^2+108x = -63$$

$$36x^2+108x+63=0$$

$$\text{Here } a=36, b=108, c=63$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-108 \pm \sqrt{(108)^2 - 4(36)(63)}}{2(36)}$$

$$x = \frac{-108 \pm \sqrt{11664 + 9072}}{72}$$

$$x = \frac{-108 \pm \sqrt{2592}}{72}$$

$$x = \frac{-108 \pm 36\sqrt{2}}{72}$$

$$x = \frac{36(-3 \pm \sqrt{2})}{72}$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Thus, Solution set} = \left\{ \frac{-3 \pm \sqrt{2}}{2} \right\}$$

$$(11) \quad \sqrt{x^2 + 3x + 9} + \sqrt{x^2 + 3x + 4} = 5$$

Solution:

$$\sqrt{x^2 + 3x + 9} + \sqrt{x^2 + 3x + 4} = 5 \quad \dots\dots(i)$$

$$\text{Let } x^2 + 3x = y$$

So eq. (i) becomes

$$\sqrt{y+9} + \sqrt{y+4} = 5$$

Squaring both sides, we get

$$(\sqrt{y+9} + \sqrt{y+4})^2 = (5)^2$$

$$(y+9) + (y+4) + 2\sqrt{(y+9)(y+4)} = 25$$

$$y+9+y+4+2\sqrt{y^2+13y+36} = 25$$

$$2y+13+2\sqrt{y^2+13y+36} = 25$$

$$2\sqrt{y^2+13y+36} = 25 - 2y - 13$$

$$2\sqrt{y^2+13y+36} = -2y+12$$

$$2\sqrt{y^2+13y+36} = -2(y-6)$$

$$\Rightarrow \sqrt{y^2+13y+36} = -(y-6)$$

Squaring both sides, we get

$$(\sqrt{y^2+13y+36})^2 = [-(y-6)]^2$$

$$y^2+13y+36 = y^2-12y+36$$

$$y^2 - y^2 + 13y + 12y + 36 - 36 = 0$$

$$25y = 0$$

$$\Rightarrow y = 0$$

Put $y = 0$ in $x^2 + 3x = y$, we get

$$x^2 + 3x = y$$

$$x^2 + 3x = 0$$

$$x(x+3) = 0$$

Either $x = 0$ or $x + 3 = 0$

$$x = -3$$

Thus, Solution set = $\{-3, 0\}$

$$2(-1) + 5 = \sqrt{7(-1) + 16} \Rightarrow -2 + 5 = \sqrt{-7 + 16}$$

$$3 = \sqrt{9} \Rightarrow 3 = 3 \text{ (which is true)}$$

Put $x = -\frac{9}{4}$ in eq (i), we get

$$2\left(-\frac{9}{4}\right) + 5 = \sqrt{7\left(-\frac{9}{4}\right) + 16}$$

$$-\frac{9}{2} + 5 = \sqrt{-\frac{63}{4} + 16}$$

$$\frac{1}{2} = \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ (which is true)}$$

Thus, solution set = $\left\{-1, -\frac{9}{4}\right\}$

$$(2) \sqrt{x+3} = 3x-1$$

Solution:

$$\sqrt{x+3} = 3x-1 \dots\dots (i)$$

Squaring both sides, we get

$$(\sqrt{x+3})^2 = (3x-1)^2$$

$$x+3 = 9x^2 - 6x + 1$$

$$9x^2 - 6x + 1 - x - 3 = 0$$

$$9x^2 - 7x - 2 = 0$$

$$9x^2 - 9x + 2x - 2 = 0$$

$$9x(x-1) + 2(x-1) = 0$$

$$(9x+2)(x-1) = 0$$

Either $9x+2=0$ or $x-1=0$

$$9x = -2 \quad x = 1$$

$$x = -\frac{2}{9} \quad x = 1$$

Check :

Put $x = -\frac{2}{9}$ in eq.(i), we get

$$\sqrt{-\frac{2}{9}+3} = 3\left(-\frac{2}{9}\right) - 1$$

$$\sqrt{\frac{25}{9}} = -\frac{2}{3} - 1$$

$$\sqrt{\frac{25}{9}} = -\frac{5}{3}$$

$$\frac{5}{3} \neq -\frac{5}{3} \text{ (which is not true)}$$

Put $x = 1$ in eq.(i), we get

$$\sqrt{1+3} = 3(1) - 1$$

$$\sqrt{4} = 3 - 1$$

$$2 = 2 \text{ (which is true)}$$

Thus, solution set = $\{1\}$

$$(3) 4x = \sqrt{13x+14} - 3$$

Solution:

$$4x = \sqrt{13x+14} - 3 \quad \dots\dots(i)$$

$$4x+3 = \sqrt{13x+14}$$

Squaring both sides, we get

$$(4x+3)^2 = (\sqrt{13x+14})^2$$

$$16x^2 + 24x + 9 = 13x + 14$$

$$16x^2 + 24x - 13x + 9 - 14 = 0$$

$$16x^2 + 11x - 5 = 0$$

$$16x^2 + 16x - 5x - 5 = 0$$

$$16x(x+1) - 5(x+1) = 0$$

$$(16x-5)(x+1) = 0$$

Either $16x - 5 = 0$ or $x + 1 = 0$

$$16x = 5 \quad x = -1$$

$$x = \frac{5}{16} \quad x = -1$$

Check :

Put $x = \frac{5}{16}$ in eq.(i), we get

$$4\left(\frac{5}{16}\right) = \sqrt{13\left(\frac{5}{16}\right) + 14} - 3$$

$$\frac{5}{4} = \sqrt{\frac{65}{16} + 14} - 3$$

$$\frac{5}{4} = \sqrt{\frac{289}{16}} - 3$$

$$\frac{5}{4} = \frac{17}{4} - 3$$

$$\frac{5}{4} = \frac{5}{4} \quad (\text{which is true})$$

Put $x = -1$ in eq.(i), we get

$$4(-1) = \sqrt{13(-1) + 14} - 3$$

$$-4 = \sqrt{-13 + 14} - 3$$

$$-4 = \sqrt{1} - 3$$

$$-4 = 1 - 3$$

$$-4 \neq -2 \quad (\text{which is not true})$$

Thus, solution set = $\left\{\frac{5}{16}\right\}$

$$(4) \sqrt{3x+100} - x = 4$$

Solution:

$$\sqrt{3x+100} - x = 4 \quad \dots\dots(i)$$

$$\sqrt{3x+100} = 4 + x$$

Squaring both sides, we get

$$(\sqrt{3x+100})^2 = (x+4)^2$$

$$3x+100 = x^2 + 8x + 16$$

$$x^2 + 8x + 16 - 3x - 100 = 0$$

$$x^2 + 5x - 84 = 0$$

$$x^2 + 12x - 7x - 84 = 0$$

$$x(x+12) - 7(x+12) = 0$$

$$(x-7)(x+12) = 0$$

Either $x-7=0$ or $x+12=0$

$$x=7 \quad x=-12$$

Check :

Put $x=7$ in eq.(i), we get

$$\sqrt{13(7)+100}-7=4 \quad \Rightarrow \sqrt{21+100}-7=4$$

$$\sqrt{121}-7=4 \quad \Rightarrow 11-7=4$$

$$4=4 \text{ (which is true)}$$

Put $x=-12$ in eq.(i), we get

$$\sqrt{3(-12)+100}-(-12)=4 \quad \Rightarrow \sqrt{-36+100}+12=4$$

$$\sqrt{64}+12=4 \quad \Rightarrow 8+12=4$$

$$20 \neq 4 \text{ (which is not true)}$$

Thus, solution set = $\{7\}$

$$(5) \sqrt{x+5} + \sqrt{x+21} = \sqrt{x+60}$$

Solution:

$$(\sqrt{x+5} + \sqrt{x+21})^2 = (\sqrt{x+60})^2$$

$$(x+5) + (x+21) + 2\sqrt{(x+5)(x+21)} = x+60$$

$$x+5+x+21+2\sqrt{x^2+26x+105} = x+60$$

$$2x+26+2\sqrt{x^2+26x+105} = x+60$$

$$\sqrt{x+5} + \sqrt{x+21} = \sqrt{x+60} \quad \dots\dots(i)$$

Squaring both sides, we get

$$2\sqrt{x^2 + 26x + 105} = x + 60 - 2x - 26$$

$$2\sqrt{x^2 + 26x + 105} = -x + 34$$

$$2\sqrt{x^2 + 26x + 105} = -(x - 34)$$

Squaring both sides, we get

$$\left(2\sqrt{x^2 + 26x + 105}\right)^2 = [-(x - 34)]^2$$

$$4(x^2 + 26x + 105) = x^2 - 68x + 1156$$

$$4x^2 + 104x + 420 = x^2 - 68x + 1156$$

$$4x^2 - x^2 + 104x + 68x + 420 - 1156 = 0$$

$$3x^2 + 172x - 736 = 0$$

Here $a=3$, $b=172$, $c=-736$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-172 \pm \sqrt{(172)^2 - 4(3)(-736)}}{2(3)}$$

$$x = \frac{-172 \pm \sqrt{29584 + 8832}}{6}$$

$$x = \frac{-172 \pm \sqrt{38416}}{6}$$

$$x = \frac{-172 - 196}{6} \quad \text{or} \quad x = \frac{-172 + 196}{6}$$

$$x = -\frac{368}{6} \quad x = \frac{24}{6}$$

$$x = -\frac{184}{3} \quad x = 4$$

Check :

Put $x = -\frac{184}{3}$ in eq.(i), we get

$$\sqrt{-\frac{184}{3} + 5} + \sqrt{-\frac{184}{3} + 21} = \sqrt{-\frac{184}{3} + 60}$$

$$\sqrt{\frac{169}{3}} + \sqrt{\frac{121}{3}} = \sqrt{\frac{4}{3}}$$

$$\frac{13i}{\sqrt{3}} + \frac{11i}{\sqrt{3}} = \frac{2i}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{24i}{\sqrt{3}} = \frac{2i}{\sqrt{3}} \text{ (which is not true)}$$

Put $x = 4$ in eq (i), we get

$$\sqrt{4+5} + \sqrt{4+21} = \sqrt{4+60}$$

$$\sqrt{9} + \sqrt{25} = \sqrt{64}$$

$$3 + 5 = 8$$

$$8 = 8 \quad \text{(which is true)}$$

Thus, solution set = $\{4\}$

$$(6) \sqrt{x+1} + \sqrt{x-2} = \sqrt{x+6}$$

Solution:

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{x-2} = \sqrt{x+6} \quad \dots (i)$$

Squaring both sides, we get

$$(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-2})^2 = (\sqrt{x+6})^2$$

$$(x+1) + (x-2) + 2\sqrt{(x+1)(x-2)} = x+6$$

$$x+1+x-2+2\sqrt{x^2-x-2} = x+6$$

$$2x-1+2\sqrt{x^2-x-2} = x+6$$

$$2\sqrt{x^2-x-2} = -x+7$$

$$2\sqrt{x^2-x-2} = -(x-7)$$

Squaring both sides, we get

$$(2\sqrt{x^2-x-2})^2 = [-(x-7)]^2$$

$$4(x^2-x-2) = x^2-14x+49$$

$$4x^2-4x-8 = x^2-14x+49$$

$$4x^2-x^2-4x+14x-8-49=0$$

$$3x^2+10x-57=0$$

Here $a=3$, $b=10$, $c=-57$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-10 \pm \sqrt{(10)^2 - 4(3)(-57)}}{2(3)}$$

$$x = \frac{-10 \pm \sqrt{100 + 684}}{6}$$

$$x = \frac{-10 \pm \sqrt{784}}{6}$$

$$x = \frac{-10 \pm 28}{6}$$

$$x = \frac{-10 - 28}{6} \text{ or } x = \frac{-10 + 28}{6}$$

$$x = \frac{-38}{6} \quad x = \frac{18}{6}$$

$$x = -\frac{19}{3} \quad x = 3$$

Check :

Put $x = -\frac{19}{3}$ in eq.(i), we get

$$\sqrt{-\frac{19}{3} + 1} + \sqrt{-\frac{19}{3} - 2} = \sqrt{-\frac{19}{3} + 6}$$

$$\sqrt{-\frac{16}{3}} + \sqrt{-\frac{25}{3}} = \sqrt{-\frac{1}{3}}$$

$$\frac{4i}{\sqrt{3}} + \frac{5i}{\sqrt{3}} = \frac{i}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{9i}{\sqrt{3}} = \frac{i}{\sqrt{3}} \quad (\text{which is not true})$$

Put $x = 3$ in eq.(i), we get

$$\sqrt{3+1} + \sqrt{3-2} = \sqrt{3+6}$$

$$\sqrt{4} + \sqrt{1} = \sqrt{9}$$

$$2 + 1 = 3$$

$$3 = 3 \quad (\text{which is true})$$

Thus, solution set = $\{3\}$

$$(7) \sqrt{11-x} - \sqrt{6-x} = \sqrt{27-x}$$

Solution:

$$\sqrt{11-x} - \sqrt{6-x} = \sqrt{27-x} \quad \dots\dots (1)$$

Squaring both sides, we get

$$\begin{aligned} (\sqrt{11-x} - \sqrt{6-x})^2 &= (\sqrt{27-x})^2 \\ (11-x) + (6-x) - 2\sqrt{(11-x)(6-x)} &= 27-x \\ 11-x+6-x-2\sqrt{(11-x)(6-x)} &= 27-x \\ 17-2x-2\sqrt{x^2-17x+66} &= 27-x \\ -2\sqrt{x^2-17x+66} &= 27-x-17+2x \\ -2\sqrt{x^2-17x+66} &= 10+x \end{aligned}$$

Squaring both sides, we get

$$\begin{aligned} (-2\sqrt{x^2-17x+66})^2 &= (10+x)^2 \\ 4(x^2-17x+66) &= 100+20x+x^2 \\ 4x^2-68x+264 &= x^2+20x+100 \\ 4x^2-x^2-68x-20x+264-100 &= 0 \\ 3x^2-88x+164 &= 0 \end{aligned}$$

Here $a = 3$, $b = -88$, $c = 164$

$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ x &= \frac{-(-88) \pm \sqrt{(-88)^2 - 4(3)(164)}}{2(3)} \\ x &= \frac{88 \pm \sqrt{7744 - 1968}}{6} \\ x &= \frac{88 \pm \sqrt{5776}}{6} \\ x &= \frac{88 \pm 76}{6} \\ x &= \frac{88-76}{6} \text{ or } x = \frac{88+76}{6} \end{aligned}$$