

## TD-cours 1 : Concepts fondateurs de la physique quantique I

**Exercice de cours : Catastrophe ultraviolette**

Le corps noir est l'objet *théorique* suivant : il absorbe parfaitement la totalité de l'énergie électromagnétique qu'il reçoit et, atteignant l'équilibre thermique à une température  $T$ , la restitue entièrement sous forme d'un rayonnement constitué d'un spectre de longueurs d'onde  $\lambda$ , rayonnées chacune à une intensité, donnée par la fonction  $u(\lambda, T)$ , appelée densité spectrale d'énergie.

La thermodynamique classique a proposé de décrire le rayonnement du corps noir en considérant les molécules comme de petits oscillateurs, rayonnant chacun une énergie  $E$  avec une certaine probabilité. La physique classique propose que l'énergie rayonnée  $E$  prend ses valeurs dans  $[0 ; +\infty]$  ; des valeurs donc continues. L'on note  $\langle E \rangle$  l'énergie moyenne d'un oscillateur.

**Partie 1 : Description par la loi de Rayleigh-Jeans**

Dans le cadre de la thermodynamique classique, la loi de Rayleigh-Jeans aboutit à l'expression suivante pour la densité spectrale d'énergie :

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi}{c\lambda^2} \langle E \rangle ; \text{ où } c \text{ est la célérité de la lumière dans le vide.}$$

Le terme  $\langle E \rangle$  énergie moyenne d'un oscillateur se calcule de la manière suivante :

$$\langle E \rangle = \frac{\int_0^{+\infty} E e^{-\frac{E}{k_B T}} dE}{\int_0^{+\infty} e^{-\frac{E}{k_B T}} dE} ; \text{ où } k_B \text{ est une constante thermodynamique, et où } T \text{ est la}$$

température du rayonnement, donc une constante également.

Le numérateur représente l'intégrale de la densité de probabilité de l'énergie  $E$ , et le dénominateur permet de normaliser le résultat.

1. Montrer que le terme  $\langle E \rangle$  a pour valeur  $k_B T$ , en utilisant une intégration par parties.

L'énergie totale du rayonnement émis par le corps noir est donnée par l'intégrale de la densité d'énergie sur toutes les longueurs d'onde.

$$U(\lambda, T) = \int_0^{+\infty} u(\lambda, T) d\lambda$$

2. Expliquer à partir de cette intégrale pourquoi la loi de Rayleigh-Jeans a marqué un tournant nommé « catastrophe ultraviolette ».

**Partie 2 : Description par la loi de Planck**


Nous allons maintenant nous intéresser à la loi de Planck, qui a proposé de corriger la loi de Rayleigh-Jeans en introduisant la quantification de l'énergie du système corps noir : le terme  $\langle E \rangle$  est alors calculé en supposant que l'énergie  $E$  d'un oscillateur ne peut prendre qu'un nombre discret de valeurs, multiples d'une énergie  $E_0$ .

3. Réécrire la relation donnant  $\langle E \rangle$  dans ces conditions.

4. Calculer ce terme, en utilisant un résultat sur les suites géométriques au numérateur, puis en remarquant un lien de dérivation entre le dénominateur et le numérateur.
5. L'on obtient donc la densité spectrale d'énergie suivante :

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi}{c\lambda^2} \langle E \rangle = \frac{8\pi}{c\lambda^2} \frac{E_0}{e^{\frac{E_0}{k_B T}} - 1}; \quad E_0 \text{ représentant un « quanta », plus petite}$$

quantité indivisible d'énergie. Pour corriger la loi de R-J, il faut corriger la divergence de  $u(\lambda, T)$  pour les petites longueurs d'onde. Justifier la proposition de Planck :  $E_0 = \frac{hc}{\lambda}$ ,  $h$  étant appelée « constante de Planck ».



**Fig. 1 : Spectre du rayonnement du corps noir (intensité du rayonnement en fonction de la longueur d'onde) pour des températures données (couleurs : modèle de Planck ; noir : modèle de Rayleigh-Jeans)**

*Remarque : Avec la loi de Planck, l'on trouve une énergie totale rayonnée  $U(T) \propto T^4$ , ce qui est en accord avec les observations, et revient à la loi de Stefan-Boltzman, antérieure à la catastrophe ultraviolette.*