

Contrôle de cours 2 (1 heure)

1 Probabilités

Exercice 1 (5 points)

Considérons une variable aléatoire infinie X dont la loi est donnée par:

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^* \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, P(X = n) = \frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

1. Vérifier par le calcul que $\sum_{n=1}^{+\infty} P(X = n) = 1$.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty} P(X = n) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{2}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \\ &= \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{2}{3} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{2} \\ &= 1\end{aligned}$$

2. Déterminer sa fonction génératrice $G_X(t)$. On l'exprimera d'abord sous la forme d'une série entière, puis à l'aide des fonctions usuelles.

$$\begin{aligned}G_X(t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} P(X = n) t^n \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} t^n \\ &= \frac{2}{3} t \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{t}{3}\right)^n \\ &= \frac{2}{3} t \frac{1}{1 - \frac{t}{3}} \\ &= \frac{2t}{3 - t}\end{aligned}$$

3. Calculer l'espérance et la variance de X .

$$\begin{aligned}G'_X(t) &= \frac{2(3-t) - (-1)(2t)}{(3-t)^2} = \frac{6}{(3-t)^2} \\ G''_X(t) &= (6 \times (3-t)^{-2})' = 6 \times (-2) \times (-1) \times (3-t)^{-3} = \frac{12}{(3-t)^3}\end{aligned}$$

$$E(X) = G'_X(1) = \frac{6}{(3-1)^2} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} V(X) &= G''_X(1) + G'_X(1) + (G'_X(1))^2 \\ &= \frac{12}{(3-1)^3} + \frac{6}{(3-1)^2} - \left(\frac{6}{(3-1)^2} \right)^2 \\ &= \frac{12}{8} + \frac{6}{4} - \frac{36}{16} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

2 Familles de vecteurs, base et dimension d'un espace vectoriel

Exercice 2 (8 points)

Soient E un espace vectoriel sur \mathbb{R} , $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille de E .

1. Écrire la définition de : " \mathcal{F} est une famille libre".
 $\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n, \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0_E \implies (\lambda_1, \dots, \lambda_n) = (0, \dots, 0)$
2. Écrire la définition de : " \mathcal{F} est une famille liée".
 $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n, \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0_E$ et $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = (0, \dots, 0)$
3. Écrire la définition de : " \mathcal{F} est une famille génératrice de E ".
 $\forall u \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$
4. Dans cette question, on suppose que $n=3$, c'est-à-dire $\mathcal{F} = (u_1, u_2, u_3)$, et de plus que $u_1 - 2u_2 + 3u_3 = 0_E$.
 Montrer que $\text{Vect}(\mathcal{F}) = \text{Vect}(u_1, u_3)$.
5. Application : dans $E = \mathbb{R}^3$, considérons la famille $\mathcal{F} = (u_1 = (1, -1, 1), u_2 = (5, 1, 1), u_3 = (1, 2, -1))$.
 - (a) La famille \mathcal{F} est-elle libre ? Justifier votre réponse.
 - (b) Donner une base de $\text{Vect}(\mathcal{F})$ et en déduire sa dimension.

Une démonstration de cours (3 points)

Soient E un \mathbb{R} -ev, F et G deux sous-espaces vectoriels de E de dimension finies n et p , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de F et $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p)$ une base de G .

On considère la famille $\mathcal{F} = (e_1, \dots, e_n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p)$ obtenue par concaténation des bases de \mathcal{B} et \mathcal{B}' .
 Montrer que :

$$\mathcal{F} \text{ libre} \implies F \cap G = \{0_E\}$$

3 Applications linéaires

Exercice 3 (4 points)

1. Donner un exemple d'application $f : \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ qui n'est pas linéaire. Justifier votre réponse.

2. Soit E et F deux \mathbb{R} -ev et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Donner les définitions mathématiques de $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.

$$\text{Ker}(f) = \{u \in E, f(u) = 0_E\}$$

$$\text{Im}(f) = \{v \in F, \exists x \in E \text{ tel que } v = f(x)\}$$

3. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \longmapsto (3x, x - 2y + z) \end{cases}$. Trouver une base de $\text{Ker}(f)$ et en déduire sa dimension.

$$\text{Ker}(f) = \{u \in E, f(u) = 0_E\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f((x, y, z)) = (0, 0, 0)\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 3x = 0, x - 2y + z = 0\}$$

$$\implies \begin{cases} 3x = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{1}{2}z \end{cases}$$

$$\implies \text{Ker}(f) = \text{Vect}((0, \frac{1}{2}, 1)) \neq ((0, 0, 0)).$$

On a donc $\text{Ker}(f) = \text{Vect}((0, \frac{1}{2}, 1))$ et $(0, \frac{1}{2}, 1) \neq (0, 0, 0)$ donc $\text{Dim}(\text{Ker}(f)) = 1$.