

$$2) f(x) = \begin{cases} -x, & -1 \leq x \leq 0 \\ 0, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$$\Rightarrow a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx = \frac{1}{1} \left[\int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 0 dx \right] = \int_{-1}^0 (-x) dx + \underbrace{\int_0^1 0 dx}_{"0"}$$

$$a_0 = \left. -\frac{x^2}{2} \right|_{-1}^0 = -\frac{0^2}{2} + \frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{1} \left[\int_{-1}^0 -x \cos(n\pi x) dx + \int_0^1 0 \cdot \cos(n\pi x) dx \right]$$

$$a_n = - \int_{-1}^0 x \cos(n\pi x) dx \Rightarrow x = u \Rightarrow du = dx, \cos(n\pi x) dx = dv \Rightarrow v = \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x)$$

$$a_n = - \left(\frac{x}{n\pi} \sin(n\pi x) \right) \Big|_{-1}^0 - \int_{-1}^0 \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) dx = \left. -\frac{x}{n\pi} \sin(n\pi x) \right|_{-1}^0 - \frac{1}{n^2 \pi^2} \cos(n\pi x) \Big|_{-1}^0$$

$$a_n = \underbrace{-\frac{0}{n\pi} \sin(n\pi \cdot 0)}_{"0"} + \frac{1}{n\pi} \sin(\pi n) - \frac{1}{n^2 \pi^2} \cos(n\pi \cdot 0) + \frac{1}{n^2 \pi^2} \cos(n\pi)$$

$$a_n = \frac{-1}{n^2 \pi^2} + \frac{1}{n^2 \pi^2} (-1)^n \quad \left\{ \begin{array}{l} \cos(n\pi) \begin{cases} -1 \Rightarrow n = \text{Impar} \\ 1 \Rightarrow n = \text{Par} \end{cases} \end{array} \right.$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{1} \left[\int_{-1}^0 -x \sin(n\pi x) dx + \int_0^1 0 \cdot \sin(n\pi x) dx \right]$$

$$b_n = - \int_{-1}^0 x \sin(n\pi x) dx \Rightarrow x = u \Rightarrow dx = du, \sin(n\pi x) dx = dv \Rightarrow v = \frac{-1}{n\pi} \cos(n\pi x)$$

$$b_n = - \left(\frac{-x}{n\pi} \cos(n\pi x) \right) \Big|_{-1}^0 - \int_{-1}^0 \frac{-1}{n\pi} \cos(n\pi x) dx = \left. \frac{x}{n\pi} \cos(n\pi x) \right|_{-1}^0 - \frac{1}{n^2 \pi^2} \sin(n\pi x) \Big|_{-1}^0$$

$$b_n = \underbrace{\frac{0}{n\pi} \cos(n\pi \cdot 0)}_{"0"} - \frac{(-1)}{n\pi} \cos(-n\pi) - \frac{1}{n^2 \pi^2} \sin(n\pi \cdot 0) + \frac{1}{n^2 \pi^2} \sin(n\pi \cdot -1)$$

$$b_n = \frac{1}{n\pi} (-1)^n \text{ porque } \cos(-n\pi) \begin{cases} -1, "n" \text{ impar} \\ 1, "n" \text{ par} \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$$f(x) = \frac{1}{4} + \frac{-2}{\pi} \cos(\pi x) + \frac{-2}{\pi} \cos(3\pi x) + \frac{-2}{\pi} \cos(5\pi x) + \dots + \frac{-1}{\pi} \sin(\pi x) + \frac{1}{\pi} \sin(2\pi x) + \dots$$

$$R(f(x)) = \frac{1}{4} - \frac{2}{\pi} \cos(\pi x) - \frac{2}{\pi} \cos(3\pi x) - \frac{2}{\pi} \cos(5\pi x) + \dots$$