

> GEMINI_NOTEBOOK

DOS CUADERNOS MISMAS FUENTES. MISMO PROMPT. DOS RESPUESTAS DISTINTAS. PERO SOLO UNA CORRECTA

Replace

Edit

- **Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)** - España:
 - **Año 2005:** Recomendaba una pauta de **7 a 10 días** de antibióticos para pacientes tratados de forma ambulatoria (NAC leve/no grave) y de **10 a 14 días** para los pacientes que requerían hospitalización ¹ ² .
 - **Año 2010:** Recomendaba una duración general de **7 a 10 días** ³ .
 - **Año 2020 (Actualización):** Recomienda una duración individualizada con un **mínimo de 5 días** basada en criterios de estabilidad clínica ⁴ ⁵ . El tratamiento se puede suspender tras **48 horas de ausencia de fiebre** (temperatura < 37,8 °C) y siempre que el paciente no presente más de un signo de inestabilidad clínica ⁶ ⁷ .
- **American Thoracic Society / Infectious Diseases Society of America (ATS/IDSA)** - Estados Unidos:
 - **Año 2019:** Recomendaban un **mínimo de 5 días** de tratamiento antibiótico antes de suspender la terapia, condicionado a que el paciente alcance la estabilidad clínica ⁸ ⁹ .
- **National Institute for Health and Care Excellence (NICE) / British Thoracic Society (BTS)** - Reino Unido:
 - Recomendaban un **mínimo de 5 días** de tratamiento antes de suspenderlo, requiriendo que el paciente haya logrado estabilidad clínica ¹⁰ ¹¹ .

Replace

Edit

5. Guía de la American Thoracic Society (ATS) / Infectious Diseases Society of America (IDSA)

- **País:** Estados Unidos (EE. UU.) ²⁰
- **Año:** 2025 (última actualización de la guía clínica) ²¹
- **Duración recomendada:** Sugiere **menos de 5 días de antibióticos (con un mínimo de 3 días de duración)**, en lugar de pautas de 5 o más días, tanto para pacientes ambulatorios como para pacientes ingresados con NAC no grave que hayan alcanzado estabilidad clínica ²² ²³ .
- **Criterio de estabilidad clínica:** Se define por la apyrexia (temperatura < 37,8 °C), frecuencia cardíaca < 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria < 24 respiraciones por minuto, SpO2 > 90% (o PaO2 > 60 mmHg) en aire ambiente, presión arterial sistólica > 90 mmHg y estado mental normal ⁷ ²⁶ .
- **Nota de evolución:** Esta actualización modifica la recomendación de la directriz ATS/IDSA previa de **2019** (y de **2007**), que recomendaba una duración mínima de **5 días** antes de suspender la terapia ⁵ ¹⁰ .

CUADERNO NO HACKER

CUADERNO HACKER

DESCUBRE EL PORQUÉ →

> EL_EXPERIMENTO

DOS CUADERNOS PARA LA MISMA SESIÓN CLÍNICA

Un cuaderno de Gemini para aprender sobre la estrategia antibiótica «Shorter is Better» y preparar una sesión clínica. A los dos se les cargaron las mismas 7 fuentes y se les dio el mismo prompt.



CUADERNO NO HACKER

- 01 13074594.pdf
- 02 bmjopen-2022-061023.pdf
- 03 dinh_2021_oi_210863_1633537607.04975.pdf
- 04 nihms-839114.pdf
- 05 PIIS1198743X22002099.pdf
- 06 S0300289620300405.pdf
- 07 suspected-acute-respiratory-infection.pdf



CUADERNO HACKER

- 01 [ART] -Spellberg-2016.pdf
- 02 [ART] -Spellberg-2023.pdf
- 03 [GUIA] -ATS-EEUU-2025.pdf
- 04 [GUIA] -NICE-UK-2023-(update-2025).pdf
- 05 [GUIA] -SEPAR-españa-2020.pdf
- 06 [MA] -BMJ-Furukawa-2023.pdf
- 07 [RCT] -JAMA-2021.pdf

PROMPT

GEMINI_NOTEBOOK - CHAT

> Cuántos días de antibiótico se recomiendan en una neumonía adquirida en la comunidad no grave con buena respuesta clínica? Indica qué recomienda cada guía por separado, con el año y el país de cada una.

EL ERROR: LAS FUENTES CON NOMBRES DE DESCARGA

NOMBRE DE DESCARGA

S0300289620300405.pdf

- Replace Edit
- **Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) – España:**
 - **Año 2005:** Recomendaba una pauta de **7 a 10 días** de antibióticos para pacientes tratados de forma ambulatoria (NAC leve/no grave) y de **10 a 14 días** para los pacientes que requerían hospitalización 1 2 .
 - **Año 2010:** Recomendaba una duración general de **7 a 10 días** 3 .
 - **Año 2020 (Actualización):** Recomendaba una duración individualizada con un **mínimo de 5 días** basada en criterios de estabilidad clínica 4 El tratamiento se puede suspender tras **48 horas de ausencia de fiebre** (temperatura < 37,8 °C) y siempre que el paciente no presente más de un signo de inestabilidad clínica 6 7 .
 - **American Thoracic Society / Infectious Diseases Society of America (ATS/IDSA) – Estados Unidos:**
 - **Año 2019:** Recomendaban un **mínimo de 5 días** de tratamiento antibiótico antes de suspender la terapia, condicionado a que el paciente alcance la estabilidad clínica 6
 - **National Institute for Health and Care Excellence (NICE) / British Thoracic Society (BTS) – Reino Unido:**
 - Recomendaban un **mínimo de 5 días** de tratamiento antes de suspenderlo, requiriendo que el paciente haya logrado estabilidad clínica 9 10 .

✗ **Me respondió con la recomendación de 2019** (*mínimo 5 días*). Ese dato estaba dentro del PDF de la guía de 2025, en el apartado donde repasa lo anterior.

NOMBRES CON NOMENCLATURA

NOMBRE RENOMBRADO

[GUIA] -ATS-EEUU-2025.pdf

Replace

Edit

5. Guía de la American Thoracic Society (ATS) / Infectious Diseases Society of America (IDSA)

- **País:** Estados Unidos (EE. UU.) 20
- **Año:** 2025 (última actualización de la guía clínica) 21
- **Duración recomendada:** Sugiere **menos de 5 días de antibióticos (con un mínimo de 3 días de duración)**, en lugar de pautas de 5 o más días, tanto para pacientes ambulatorios como para pacientes ingresados con NAC no grave que hayan alcanzado estabilidad clínica 22
- **Criterio de estabilidad clínica:** Se define por la apyrexia (temperatura < 37,8 °C), frecuencia cardíaca < 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria < 24 respiraciones por minuto, SpO2 > 90% (o PaO2 > 60 mmHg) en aire ambiente, presión arterial sistólica > 90 mmHg y estado mental normal 7 26 .
- **Nota de evolución:** Esta actualización modifica la recomendación de la directriz ATS/IDSA previa de **2019** (y de **2007**), que recomendaba una duración mínima de **5 días** antes de suspender la terapia 5 10 .

✓ **Me respondió con la guía de 2025** (*menos de 5 días de antibiótico*).

> UNA_SOLA_DIFERENCIA

LA ÚNICA DIFERENCIA ERA EL NOMBRE DEL ARCHIVO

NOMBRE - DE - DESCARGA - ORIGINAL . PDF

- ✗ El nombre no dice ni sociedad, ni país, ni año.
- ✗ El modelo mezcla versiones antiguas y actualizadas sin avisar.
- ✗ Comprobar una cita te obliga a abrir los PDF uno por uno.

[GUÍA] - ATS - EEUU - 2025 . PDF

- ✓ El nombre ya lleva el contexto: tipo, fuente, país y año.
- ✓ Puedes pedirle que compare por año o por país y lo cumple.
- ✓ La cita señala el PDF exacto: el error se ve en segundos.

→ Mismas fuentes. Mismo prompt... y sin instrucciones personalizadas.

No, no fue el prompt. (casi nunca es el prompt).

> MI CONCLUSIÓN

Un cuaderno bien construido desde el inicio no solo es que sea más fiable.

Es que falla de forma visible para ti si sabes cazarlo.



Alfredo Montero Delgado



/alfredomonterodelgado

- GUÍA GRATIS ESTE MES.
- ENLACE EN EL PRIMER COMENTARIO.

SALUHACKERS