

MAKLUMAT PENTING!

PANDUAN PENGAMBILAN UBAT ANTIKOAGULAN

INDIKASI: PEMBEKUAN DARAH DALAM SALURAN **DARAH PARU-PARU ATAU KAKI SAHAJA**

Nama Pesakit: _____ SB No: _____ Wad: _____

DOS PERMULAAN UBAT ANTIKOAGULAN:

- ☐ Tablet Apixaban 5mg ⇒ DUA biji setiap 12 jam untuk 7 hari
- ☐ Tablet Rivaroxaban 15mg ⇒ SATU biji setiap 12 jam untuk 21 hari
- ☐ Capsule Dabigatran 110mg ⇒ SATU biji setiap 12 jam sehingga habis tempoh rawatan
- ☐ Capsule Dabigatran 150mg ⇒ SATU biji setiap 12 jam sehingga habis tempoh rawatan

TARIKH MULA		SEHINGGA	
-------------	--	----------	--

KEMUDIAN, SAMBUNG MAKAN



DOS SAMBUNGAN UBAT ANTIKOAGULAN:

- ☐ Tablet Apixaban 5mg ⇒ SATU biji setiap 12 jam sehingga habis tempoh rawatan
- ☐ Tablet Rivaroxaban 20mg ⇒ SATU biji 1 kali sehari sehingga habis tempoh rawatan

TARIKH MULA		TARIKH DIJANGKA BERHENTI	
-------------	--	-----------------------------	--

**UBAT ANTIKOAGULAN PERLU DIAMBIL UNTUK TEMPOH SEKURANG-KURANGNYA 3 BULAN.
JANGAN BERHENTI MENGAMBIL UBAT INI TANPA BERBINCANG DENGAN DOKTOR ANDA.
UNTUK MAKLUMAN LANJUT DAN SEBARANG PERTANYAAN, SILA HUBUNGI JABATAN FARMASI
HOSPITAL SUNGAI BULOH.**

MAKLUMAT PENTING!

PANDUAN PENGAMBILAN UBAT ANTIKOAGULAN

INDIKASI: PEMBEKUAN DARAH DALAM SALURAN **DARAH PARU-PARU ATAU KAKI SAHAJA**

Nama Pesakit: _____ SB No: _____ Wad: _____

DOS PERMULAAN UBAT ANTIKOAGULAN:

- ☐ Tablet Apixaban 5mg ⇒ DUA biji setiap 12 jam untuk 7 hari
- ☐ Tablet Rivaroxaban 15mg ⇒ SATU biji setiap 12 jam untuk 21 hari
- ☐ Capsule Dabigatran 110mg ⇒ SATU biji setiap 12 jam sehingga habis tempoh rawatan
- ☐ Capsule Dabigatran 150mg ⇒ SATU biji setiap 12 jam sehingga habis tempoh rawatan

TARIKH MULA		SEHINGGA	
-------------	--	----------	--

KEMUDIAN, SAMBUNG MAKAN



DOS SAMBUNGAN UBAT ANTIKOAGULAN:

- ☐ Tablet Apixaban 5mg ⇒ SATU biji setiap 12 jam sehingga habis tempoh rawatan
- ☐ Tablet Rivaroxaban 20mg ⇒ SATU biji 1 kali sehari sehingga habis tempoh rawatan

TARIKH MULA		TARIKH DIJANGKA BERHENTI	
-------------	--	-----------------------------	--

**UBAT ANTIKOAGULAN PERLU DIAMBIL UNTUK TEMPOH SEKURANG-KURANGNYA 3 BULAN.
JANGAN BERHENTI MENGAMBIL UBAT INI TANPA BERBINCANG DENGAN DOKTOR ANDA.
UNTUK MAKLUMAN LANJUT DAN SEBARANG PERTANYAAN, SILA HUBUNGI JABATAN FARMASI
HOSPITAL SUNGAI BULOH.**



Jalan Hospital, 47000 Sungai Buloh,
Selangor, Malaysia
Phone: 603-61454333

JABATAN FARMASI
HOSPITAL SUNGAI BULOH

Tab Dabigatran 110mg dan 150mg

Apakah Dabigatran?

- Dabigatran adalah ubat antikoagulan oral
- Ia boleh mencegah darah yang beku daripada membesar atau mengelakkan pembekuan darah berlaku berterusan pada darah yang sudah-beku sementara darah beku ini dicairkan secara semulajadi dalam badan.
- Ia tidak mencairkan darah yang sudah membeku tetapi hanya mengurangkan risiko pembekuan.

Mengapakah saya diberikan Dabigatran?

- Untuk mencegah serangan angin ahmar /strok yang disebabkan oleh degupan jantung tidak teratur ATAU
- Untuk rawatan atau pencegahan darah beku di anggota kaki (*deep vein thrombosis*) dan paru-paru (*pulmonary embolism*).

Pemantauan Tab Dabigatran:

- Anda perlu menjalani ujian darah untuk memastikan buah pinggang dan hati anda berfungsi dengan baik.
- Sila pastikan anda hadir pada tarikh temujanji di klinik yang telah ditetapkan.

Tempoh Rawatan:

- Tempoh rawatan adalah 3 hingga 6 bulan, atau lebih panjang, bergantung kepada keadaan anda. Jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa berbincang dengan doktor anda.

Bagaimana mengambil ubat ini?

- Ambil ubat ini dua kali sehari (SETIAP 12 JAM), pada masa yang sama setiap hari.
- Keluarkan satu biji sahaja dari blister pack setiap kali. Jangan hancurkan kapsul sebelum menelan ubat.
- Dabigatran harus ditelan sepenuhnya dengan air, dengan atau tanpa makanan.

Bagaimanakah ubat ini harus disimpan?

- Simpan ubat-ubatan anda di tempat yang dingin, kering dan jauh dari cahaya matahari.
- Simpan ubat-ubatan anda di dalam pembungkusan asal yang disediakan. Jangan keluarkan kapsul dan simpan di dalam bekas / pill box yang lain. (Fungsi Ubat Dabigatran akan merosot sekiranya terdedah kepada kelembapan).

Apakah yang harus anda lakukan sekiranya anda tertinggal satu dos?

- Sekiranya anda terlupa, ambil ubat ini serta-merta apabila teringat. Jika jarak dari dos seterusnya adalah kurang daripada 6 jam, tinggalkan dos yang terlupa dan ambil dos yang seterusnya seperti biasa.

Jangan gantikan dos, menukar dos atau berhenti mengambil ubat tanpa berbincang bersama doctor.

Apakah langkah berjaga-jaga yang khusus semasa mengambil ubat ini?

- Hubungi doktor sekiranya anda mengalami gejala-gejala berikut:

Tanda-tanda pendarahan:

- Lebam
- Gusi atau hidung berdarah
- Kahak atau kencing berdarah
- Najis berwarna hitam atau merah



Tanda-tanda kerosakan buah pinggang:

- Kenaikan berat badan secara mendadak
- Kaki bengkak
- Loya dan muntah
- Gatal kulit

Gangguan kepada sistem penghadaman:

- Pedih ulu hati
- Senak perut
- Asid Refluks



- Anda mungkin boleh berdarah dengan lebih mudah.
- Anda harus berhati-hati dengan menggunakan berus gigi yang lembut atau pencukur elektrik untuk mengelakkan kecederaan atau luka.
- Jika anda perlu menjalani pembedahan atau rawatan gigi, sila beritahu doktor atau doktor gigi bahawa anda mengambil ubat Dabigatran, Mungkin ubat ini perlu dihentikan untuk mengelakkan pendarahan yang berlebihan. Jangan berhenti ubat tanpa arahan doktor
- Elakkan pengambilan alcohol disebabkan interaksi ubat dabigatran dengan alcohol yang akan menyebabkan pendarahan.



Tab Apixaban 2.5mg dan 5mg

Apakah Apixaban?

- Apixaban adalah ubat antikoagulan
- Ia adalah ubat yang digunakan untuk mencegah atau mengurangkan pembekuan darah dan menghalang darah beku sedia ada daripada menjadi semakin besar.
- Ia tidak mencairkan darah yang sudah membeku tetapi hanya mengurangkan risiko pembekuan darah.

Mengapakah saya diberikan Apixaban?

- Untuk mencegah serangan angin ahmar /strok yang disebabkan oleh degupan jantung tidak teratur ATAU
- Untuk rawatan atau pencegahan darah beku di anggota kaki (*deep vein thrombosis*) dan paru-paru (*pulmonary embolism*).

Pemantauan Tab Apixaban:

- Anda perlu menjalani ujian darah untuk memastikan buah pinggang dan hati anda berfungsi dengan baik
- Sila pastikan anda hadir pada tarikh temujanji di klinik yang telah ditetapkan.

Tempoh Rawatan:

- Doktor akan menentukan tempoh rawatan berdasarkan indikasi dan keadaan anda. Jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa berbincang dengan doktor anda.

Bagaimana mengambil ubat ini?

- Ambil ubat ini dua kali sehari (SETIAP 12 JAM), pada masa yang sama setiap hari.
- Ambil ubat ini dengan segelas air.
- Sekiranya anda tidak dapat menelan ubat biji, ianya boleh dihancurkan dan dicampur dengan air untuk diminum terus.
- Ubat ini boleh diambil sebelum atau selepas makan
- Pastikan bekalan ubatan anda sentiasa mencukupi



Apakah yang harus anda lakukan sekiranya anda tertinggal satu dos?

- Sekiranya anda terlupa, ambil ubat ini serta-merta apabila teringat.
- Jika sudah sampai dos yang berikutnya, tinggalkan dos yang terlupa dan ambil dos yang seterusnya seperti biasa.
- Jangan gandakan dos anda.

Bagaimanakah ubat ini harus disimpan?

- Simpan ubat-ubatan anda di tempat yang dingin, kering dan jauh dari cahaya matahari.
- Jauhi ubat-ubatan anda dari kanak-kanak.

Apakah langkah berjaga-jaga yang khusus semasa mengambil ubat ini?

- Hubungi doktor sekiranya anda mengalami gejala-gejala berikut:

Tanda-tanda pendarahan:

- Lebam
- Gusi atau hidung berdarah
- Kahak atau kencing berdarah
- Najis berwarna hitam atau merah



Tanda-tanda kerosakan buah pinggang:

- Kenaikan berat badan secara mendadak
- Kaki bengkak
- Loya dan muntah
- Gatal kulit

Gangguan kepada sistem penghadaman:

- Pedih ulu hati
- Senak perut
- Asid Refluks



- Anda digalakkan untuk menggunakan berus gigi yang lembut atau pencukur elektrik untuk mengelakkan kecederaan atau luka.
- Jika anda perlu menjalani pembedahan atau rawatan gigi, sila maklumkan doktor atau doktor gigi bahawa anda mengambil Apixaban. Ubat ini mungkin perlu dihentikan buat sementara waktu untuk mengelakkan pendarahan yang berlebihan.
- Jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa arahan doktor.

Tab Rivaroxaban 10mg, 15mg, 20mg

Apakah Rivaroxaban?

- Rivaroxaban adalah antikoagulan
- Ia berfungsi untuk mencegah pembentukan darah beku yang baru dan menghalang darah beku yang sedia ada dari menjadi lebih besar sementara menunggu ia dicairkan secara semulajadi dalam badan.
- Ia tidak mencairkan darah yang sedia beku tetapi hanya mengurangkan risiko pembekuan.

Mengapakah saya dipreskrib Rivaroxaban?

- Untuk mencegah serangan angin ahmar /strok yang disebabkan oleh degupan jantung yang tidak normal ATAU
- Untuk rawatan atau pencegahan darah beku di anggota kaki (*deep vein thrombosis*) dan paru-paru (*pulmonary embolism*).

Tempoh Rawatan:

- Secara umum, tempoh rawatan adalah 3 – 6 bulan, atau lebih bergantung kepada keadaan anda. Jangan berhenti makan ubat ini tanpa berbincang dengan doktor anda.

Bagaimana mengambil ubat ini?

- Ambil ubat ini pada masa yang sama setiap hari selepas makan (sebaik-baiknya selepas makan malam)
- Sekiranya pesakit tidak dapat menelan ubat biji, ia boleh dihancurkan dan dicampur dalam air kosong untuk diminum terus.

Bagaimanakah ubat ini harus disimpan?

- Simpan ubat-ubatan anda di tempat yang dingin, kering dan jauh dari cahaya matahari.

Apakah yang harus anda lakukan sekiranya anda tertinggal satu dos?

Jika anda terlupa mana-mana dos ubat, ikuti arahan di bawah:



Jika anda mengambil Rivaroxaban 20mg atau 15mg sekali sehari	• Ambil dos tersebut sebaik sahaja anda teringat pada hari yang sama. • Ambil dos berikutnya seperti biasa pada keesokan hari. Jangan gantikan dos ubat anda.
Jika anda mengambil Rivaroxaban 15mg 2 kali sehari	• Ambil dos tersebut sebaik sahaja anda teringat. • Anda juga boleh mengambil 2 biji 15mg tablet bersama untuk mendapatkan dos yang berjumlah 30mg pada hari yang sama • Ambil dos berikutnya seperti biasa pada keesokan hari

Apakah langkah berjaga-jaga yang khusus semasa mengambil ubat ini?

Jangan pandu atau mengendalikan mesin jika anda berasa pening atau pitam selepas mengambil ubat ini

Ubat ini boleh menyebabkan anda mengalami pendarahan atau lebam dengan lebih mudah. Hubungi doktor anda seawal yang mungkin jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut:

Tanda-tanda pendarahan:

- Lebam
- Gusi atau hidung berdarah
- Kahak atau kencing berdarah
- Najis berwarna hitam atau merah



Tanda-tanda kerosakan buah pinggang:

- Kenaikan berat badan secara mendadak
- Kaki bengkak
- Loya dan muntah
- Gatal kulit

Gangguan kepada sistem penghadaman

- Pedih ulu hati
- Senak perut
- Asid refluks



- Anda digalakkan untuk menggunakan berus gigi yang lembut atau pencukur elektrik untuk mengelakkan kecederaan atau luka.
- Jika anda perlu menjalani pembedahan atau rawatan gigi, sila maklumkan doktor atau doktor gigi bahawa anda mengambil Rivaroxaban. Ubat ini mungkin perlu dihentikan buat sementara waktu untuk mengelakkan pendarahan yang berlebihan.
- Jangan berhenti ubat tanpa arahan doktor

Tab Edoxaban 30mg dan 60mg

Apakah Edoxaban?

- Edoxaban adalah ubat antikoagulan
- Ia adalah ubat yang digunakan untuk mencegah atau mengurangkan pembekuan darah dan menghalang darah beku sedia ada daripada menjadi semakin besar.
- Ia tidak mencairkan darah yang sudah membeku tetapi hanya mengurangkan risiko pembekuan darah.

Mengapakah saya diberikan Edoxaban?

- Untuk mencegah serangan angin ahmar /strok yang disebabkan oleh degupan jantung tidak teratur ATAU
- Untuk rawatan atau pencegahan darah beku di anggota kaki (*deep vein thrombosis*) dan paru-paru (*pulmonary embolism*).

Pemantauan Tab Edoxaban:

- Anda perlu menjalani ujian darah untuk memastikan buah pinggang dan hati anda berfungsi dengan baik
- Sila pastikan anda hadir pada tarikh temujanji di klinik yang telah ditetapkan.

Tempoh Rawatan:

Tempoh rawatan adalah 3 hingga 6 bulan, atau lebih panjang, bergantung kepada keadaan anda. Jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa berbincang dengan doktor anda.

Bagaimana mengambil ubat ini?

- Ambil ubat ini SATU kali sehari (SETIAP 24 JAM), pada masa yang sama setiap hari.
- Ambil ubat ini dengan segelas air.
- Sekiranya anda tidak dapat menelan ubat biji, ianya boleh dihancurkan dan dicampur dengan air untuk diminum terus.
- Ubat ini boleh diambil sebelum atau selepas makan
- Pastikan bekalan ubatan anda sentiasa mencukupi



Apakah yang harus anda lakukan sekiranya anda tertinggal satu dos?

- Sekiranya anda terlupa, ambil ubat ini serta-merta apabila teringat.
- Jika sudah sampai dos yang berikutnya, tinggalkan dos yang terlupa dan ambil dos yang seterusnya seperti biasa.
- Jangan gandakan dos anda.

Bagaimanakah ubat ini harus disimpan?

- Simpan ubat-ubatan anda di tempat yang dingin, kering dan jauh dari cahaya matahari.
- Jauhi ubat-ubatan anda dari kanak-kanak.

Apakah langkah berjaga-jaga yang khusus semasa mengambil ubat ini?

- Hubungi doktor sekiranya anda mengalami gejala-gejala berikut:

Tanda-tanda pendarahan:

- Lebam
- Gusi atau hidung berdarah
- Kahak atau kencing berdarah
- Najis berwarna hitam atau merah



Tanda-tanda kerosakan buah pinggang:

- Kenaikan berat badan secara mendadak
- Kaki bengkak
- Loya dan muntah
- Gatal kulit

Gangguan kepada sistem penghadaman:

- Pedih ulu hati
- Senak perut
- Asid Refluks



- Anda digalakkan untuk menggunakan berus gigi yang lembut atau pencukur elektrik untuk mengelakkan kecederaan atau luka.
- Jika anda perlu menjalani pembedahan atau rawatan gigi, sila maklumkan doktor atau doktor gigi bahawa anda mengambil Edoxaban. Ubat ini mungkin perlu dihentikan buat sementara waktu untuk mengelakkan pendarahan yang berlebihan.
- Jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa arahan doktor