

Apuntes

Matemática 4to

August 28, 2025

1 Practico 0

1.1 Ejercicio 1

1.1.1 $A \subseteq B \leftrightarrow A \subseteq A \cap B$

(\Rightarrow) Si $A \subseteq B$, entonces $A \subseteq (A \cap B)$, $\forall x \in A$ como A está contenida o es igual a B , Por lo tanto $x \in B$, es decir, $x \in A \cap B$.

(\Leftarrow) Si $A \subseteq (A \cap B)$, entonces $A \subseteq B$, Tomo cualquier $x \in A$. Por hipotesis $x \in (A \cap B)$, por lo que $x \in B$ y como el elemento es arbitrario de A resulta en todo A contenida en B .

1.1.2 $A \subseteq B \leftrightarrow A \cup B \subseteq B$

(\Rightarrow) Si $A \subseteq B$, entonces como todo elemento de A está en B , y la union contiene a los elementos de ambos, entonces todos los elementos de A están tambien en su union con otros conjuntos. Pero como todos los elementos de A están en B resulta en que los elementos de la unión son los elementos de B , por lo tanto $A \cup B = B$

(\Leftarrow) Si $A \cup B \subseteq B$, entonces todos los elementos de $A \cup B$ están en A y/o B . Entonces tenemos 4 casos:

Si $x \in A$ y $x \notin B$ entonces como la unión está contenida en B , entonces todo elemento de A está contenido en B .

Si $x \in A$ y $x \in B$, entonces no es posible ya que la unión debería estar contenida en B . Por lo tanto todos los elementos de A están en B .

1.1.3 $A \subseteq B \Rightarrow B = A \cup (B \setminus A)$ y $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$

Como estamos hablando de igualdades necesitamos demostrar la doble inclusión entre ambas proposiciones.

(\subseteq) Sea $x \in B$, tenemos dos posibilidades:

Si $x \in A$, entonces $x \in A \subseteq A \cup (B \setminus A)$

Si $x \notin A$, entonces $x \in B \setminus A \subseteq A \cup (B \setminus A)$

En ambos casos $x \in A \cup (B \setminus A)$, por lo cual $B \subseteq A \cup (B \setminus A)$.

(\supseteq) Sea $x \in A \cup (B \setminus A)$, entonces tenemos dos posibilidades, pues A y $B \setminus A$ son disjuntas:

Si $x \in A$, entonces $x \in B$ por hipotesis.

Si $x \in B \setminus A$, entonces $x \in B$ por definición de diferencia.

En ambos casos $x \in B$. Como hay doble contencion, se concluye la igualdad.

1.1.4 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Nuevamente demostramos la doble inclusión.

(\subseteq) Sea $x \in A \cap (B \cup C)$, entonces $x \in A$ y $x \in (B \cup C)$. A su vez, por definición de unión $x \in B$ o $x \in C$. Viendo los dos casos:

$x \in A$ y $x \in B$ lo cual es la definición de intersección $x \in A \cap B$

$x \in A$ y $x \in C$ lo cual es la definición de intersección ($x \in A \cap C$). Resulta en x en alguna de esas intersecciones o ambas, por lo tanto $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

(\supseteq) Sea $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$, entonces $x \in (A \cap B)$ o $x \in (A \cap C)$. Ambas intersecciones incluyen a A , por lo que $x \in A$. Ahora tenemos dos casos:

Si $x \in (A \cap B)$, entonces $x \in B$ por lo que $x \in (B \cup C)$ y resulta en $x \in A \cap (B \cup C)$

Si $x \in (A \cap C)$, entonces $x \in C$ por lo que $x \in (B \cup C)$ y resulta en $x \in A \cap (B \cup C)$

Por doble contención se concluye la igualdad.

1.1.5 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(\subseteq) Sea $x \in A \cup (B \cap C)$, entonces $x \in A$ o $x \in (B \cap C)$:

Si $x \in A$, entonces $x \in (A \cup B)$ y $x \in (A \cup C)$ por lo que $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Si $x \in (B \cap C)$, entonces $x \in B$ y $x \in C$, por lo que $x \in (A \cup B)$ y $x \in (A \cup C)$, por lo que $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

(\supseteq) Sea $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, entonces $x \in (A \cup B)$ y $x \in (A \cup C)$, es decir:

$x \in A$ lo cual resulta en $x \in A \cup (B \cap C)$

$x \notin A$, como x tiene que estar en ambas uniones, entonces al no estar en A , $x \in B$ y $x \in C$, por lo que $x \in (B \cap C)$ y resulta en $x \in A \cup (B \cap C)$.

Por doble contención se concluye la igualdad.

1.1.6 $A \subseteq (B \cap C) \rightarrow A \subseteq B$ y $A \subseteq C$

Sea $x \in A$, por hipótesis $A \subseteq (B \cap C)$, por lo que $x \in (B \cap C)$, es decir, $x \in B$ y $x \in C$. Como cualquier elemento arbitrario de A está en B y C , entonces todo A está en B y en C .

1.1.7 $A \cup B \subseteq C \rightarrow A \subseteq C$ y $B \subseteq C$

Sea $x \in A \cup B$, esto quiere decir que hay 3 casos:

Si $x \in A$, y $x \notin B$, entonces todos los elementos de A están en C .

Si $x \notin A$, y $x \in B$, entonces todos los elementos de B están en C .

Si $x \in A$ y $x \in B$, entonces todos los elementos de A y B están en C .

En los 3 casos se ven incluidos los conjuntos A y B en C .

1.1.8 $A \subseteq B \leftrightarrow B^c \subseteq A^c$

(\Rightarrow) Sea $x \in A$, entonces $x \notin A^c$. Por hipótesis $A \subseteq B$, por lo que $x \in B$

2 Práctico 1

2.1 Ejercicio 1

Los axiomas de incidencia son:

1. El plano es un conjunto infinito y sus elementos se llaman puntos.

2. Existe $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(\pi)$ tal que cada $R \in \mathcal{R}$ es un subconjunto propio de π que posee al menos dos elementos.
3. Dados $a, b \in \pi$ con $a \neq b$, existe un único $R \in \mathcal{R}$ tal que $a, b \in R$.

2.1.1 A

(1) Sea $\pi = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, entendemos por infinito a todo conjunto que no es finito, es decir, $\forall n \in \mathbb{N}$ ninguna función $f : X \rightarrow \{1, \dots, n\}$ es biyectiva. Más aún conocemos que los naturales son infinitos ya que no puedo crear una función inyectiva entre ese conjunto y $\{1, \dots, n\}$ (basta considerar a un subconjunto $\{1, \dots, n+1\} \in \mathbb{N}$), entonces consideramos una función inyectiva con ellos para hablar de un conjunto infinito. Consideramos $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ con $f(n) = (n, 0)$, es claro que f es inyectiva y a su vez recorre sólo un subconjunto de π , por lo tanto π es infinito.

(2) Las rectas están implícitas en este conjunto como los subconjuntos de π de dos elementos, es decir, $W \subset \pi$ y W contiene dos pares ordenados de \mathbb{Z} . Por definición, son subconjuntos propios de π y poseen al menos dos elementos, mas específicamente, dos.

(3) Dados $a, b \in \pi$ con $a \neq b$, con como está definidas las rectas, se sabe que los subconjuntos tienen sólo dos elementos, por lo tanto no es posible que otra recta aparte de ella misma contenga esos dos elementos. Es decir, si consideramos $a, b, c \in \pi$ si son distintos no hay recta que contengan a ambos, y si existe una recta que los contenga, implica que uno es igual a los otros.

2.1.2 B

"Si se cumplen los axiomas de incidencia, entonces las rectas son subconjuntos infinitos del plano".

Si bien los axiomas nos aseguran los infinitos puntos del plano, no nos aseguran que no exista una biyección entre los elementos de un subconjunto de un conjunto infinito y un conjunto $\{1, \dots, n\}$, sirviendo como contraejemplo el inciso anterior donde las rectas sólo presentan dos elementos a los cuales puedo definir una biyección para cada recta que recorra sus elementos de modo que $f : R \rightarrow \{1, 2\}$. Por lo tanto esta proposición resulta falsa.

2.2 Ejercicio 2

Dado $V = \mathbb{R}^3$ espacio vectorial tridimensional sobre los reales. Se considera el plano π de subespacios unidimensionales de V . Estos serán los puntos. Si $W \subset V$ en un subespacio de V de dimension 2, entonces el conjunto de puntos contenidos en W será llamado una recta. Mostrar que este modelo cumple con los axiomas de incidencia.

(1) En el enunciado se denota a los puntos como los subespacios unidimensionales de V , es decir, las rectas vectoriales que pasan por el origen ya que hay un único vector que las genera. Con $n \in \mathbb{N}$, sea $\langle (n, 1, 0) \rangle$ uno de los vectores generadores de un punto de π , es decir $X_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, 0) =$

$t(n, 1, 0), t \in \mathbb{R}$ es punto de V y $X_1 \in V$, quiero ver que dados dos puntos X_1 y X_2 con $X_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) = t(m, 1, 0), t \in \mathbb{R}\}$ si $n \neq m$, entonces los puntos también son distintos, es decir, que son li

Partimos de trabajar por el absurdo, consideramos $X_1 = X_2$, lo que implica que dado $(1, n, 0) \in X_1$ entonces existe $r \in \mathbb{R}$ tal que $r(n, 1, 0) = (m, 1, 0)$, esto es:

$$\begin{cases} rn = m & r = 1 \\ r = 1 & \rightarrow n = m \\ 0 = 0 & 0 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Lo cual resulta absurdo ya que $n \neq m$. Por lo tanto $X_1 \neq X_2$ de allí se puede demostrar una inyección con los naturales (pensamos en que todos los vectores generadores se ven dados por $f : \mathbb{N} \rightarrow V$ tal que $f(x) = (x, 1, 0)$), que a su vez sólo son subconjuntos de V , por lo que V es infinito.

(2) Las rectas están definidas como los puntos contenidos en $W \subset V$ (subespacios de dimension 2). Cada una de ellas debe ser un subconjunto propio de π que posea al menos dos elementos de V

2.3 Guía 1:Ejercicio 9

2.3.1 Enunciado

La actividad 5 debe habernos dejado como enseñanza que hay modelos de geometría en los que se satisfacen los axiomas de incidencia y en los que las rectas no son infinitas. De ello inferimos que la infinitud de las rectas no es una consecuencia lógica de estos axiomas. Así pues, asumamos los axiomas de orden:

1. Dar la definición de que un conjunto sea infinito.
2. Que cada uno elabore una demostración de los siguientes enunciados. Las rectas tienen una cantidad infinita de puntos. Las semirrectas tienen infinitos puntos. Los segmentos también poseen una cantidad infinita de puntos.
3. Compare las estrategias seguidas por cada integrante.

2.3.2 Solución

(1) Puntualmente un conjunto A es infinito si **no** es finito, se entiende que no hay biyección posible entre el conjunto y un conjunto $\{1, \dots, n\}$ con $n \in \mathbb{N}$, puedo armar una inyección $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ también para definir la infinitud de A ya que \mathbb{N} es infinito, por no haber una biyección entre el conjunto finito $\{1, \dots, n\}$ y \mathbb{N} .

(2)

- Las rectas tienen una cantidad infinita de puntos.
- Sea r una recta, por definición de recta tenemos
- ejercicios 3, 5 y 10 con rodriago.