

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

Actividad 1 - b
Mailén Anabella Valdez

23 de Marzo de 2026

1. Lean la Introducción y la Primera Parte de Pòlya (1945) (hasta página 41) y realicen las siguientes actividades

(a) Pasos para resolver un problema:

- **Comprender el problema:** Nos pide identificar cual es el propósito del ejercicio "*¿Cuál es la incógnita?*" y la información dada por el enunciado "*¿Cuáles son los datos?*". Todo con el objetivo de entender el problema y organizar la información para poder resolverlo, para ello dar nombres a dichos elementos e introducir una notación adecuada. Por último, es importante si las condiciones planteadas son posibles de llevar y si son suficientes.
- **Concepción de un plan:** Para esto es necesario identificar el tipo de problema, pensar en los métodos que se pueden usar para resolverlo para esto es necesario relacionarlo a problemas conocidos o temas tratados mediante la pregunta "*¿Conoce algún problemas relacionado?*" con esto referido al uso de notación, el cómo está redactado y la rama del ejercicio que podemos identificar o está dado y si lo relacionado lo podemos usar para el ejercicio aplicado. Luego, podemos pensar si reescribirlo para su mejor comprensión y por último ver si en este desarrollo se usan todas las condiciones planteadas.
- **Ejecución del plan:** Se refiere a la aplicación de los métodos elegidos para resolver el ejercicio, es importante ser cuidadoso y organizado en esta parte, insistir en la verificación de cada paso y evaluar la necesidad de la demostración de los pasos a realizar y realizados.
- **Examinar la solución obtenida:** Poner en crítica los resultados obtenidos y el método usado para llegar a ellos, esto se puede hacer mediante la pregunta "*¿Es la solución obtenida razonable?*" y "*¿Es el método usado el más adecuado?*" con esto referido a la comparación de los resultados obtenidos con los resultados esperados, la comparación de los métodos usados con otros métodos posibles y la reflexión sobre el proceso seguido para resolver el ejercicio. Esto con el fin de consolidar conocimientos, mejorar la capacidad de resolución de problemas y desarrollar un pensamiento crítico sobre los métodos y resultados obtenidos. "*¿Puede utilizarse el resultado o método para resolver algún otro problema?*".

(b) Mi ejercicio elegido es

13. Determinar una fórmula para la siguiente suma:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}.$$

Se nos presenta la siguiente sumatoria:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$$

como se nos pide el desarrollo de una fórmula es posible desglosar la sumatoria para identificar un patrón o ver cada termino individualmente para poder trabajar en otra forma de escribirlo:

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \cdots + \frac{n}{(n+1)!}$$

Creo es más cómodo trabajar con cada término de la sumatoria, en este caso, puedo ver que los términos los puedo reescribir usando una diferencia para simplificar algunos términos y concatenadamente eliminar otros:

$$\frac{k}{(k+1)!} = \frac{(k+1) - 1}{(k+1)!} = \frac{k+1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$$

Con esto, es posible reescribir la sumatoria como:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right) = \left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} \right) + \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} \right)$$

Con esto la sumatoria es telescópica (terminos que se cancelan), para esto es necesario escribir cada término de la sumatoria como una diferencia de fracciones. Por lo tanto, la fórmula para la sumatoria es:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right) = \frac{1}{1!} - \frac{1}{(n+1)!}$$

Ahora, es posible verificar la fórmula obtenida, para esto es necesario evaluar la sumatoria. Para un valor específico de n , por ejemplo, para $n = 3$:

$$\sum_{k=1}^3 \frac{k}{(k+1)!} = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot 4 + 3}{4!} = \frac{12 + 8 + 3}{24} = \frac{23}{24}$$

Comparando esto con la fórmula obtenida:

$$\frac{1}{1!} - \frac{1}{(3+1)!} = 1 - \frac{1}{4!} = 1 - \frac{1}{24} = \frac{23}{24}$$

Con esto hay mas seguridad de que la fórmula obtenida es correcta, además, es posible evaluar para otros valores de n para verificar la fórmula obtenida.

1. En una tabla de 6 columnas e "infinitas" filas, se van ubicando consecutivamente el cero y "todos" los números naturales:

0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35
.	.	.	.	.	.

- ¿En qué fila y en qué columna se encuentra el 126?
- ¿Qué número se encuentra en la novena fila de la segunda columna?
- Proponer dos números mayores que 1.000 que se encuentren en la misma columna que el 130.
- ¿Qué número se encuentra en la fila 37, columna 3?
- ¿Dónde se encuentra el 27.643?
- Se va a hacer **otra tabla** con un criterio similar pero con 7 columnas. ¿En qué fila y columna estará el 126? Para esta segunda tabla, ¿qué número se ubica en la fila 8 columna 4?
- Ahora se tiene **otra tabla**, de la cual se conoce una columna:

7
19
31
.

¿Se puede saber de cuántas columnas es la tabla?
¿Cómo podría decidir si el 1.147 está en la misma columna?

- (a) Primero identificamos el comportamiento de las columnas, siendo la primera la tabla del 6 y la segunda es los mismos numeros +1, y así las columnas son divisibles por 6 más su resto, y además el cociente indica en que fila están desde 0 a infinito. Por ejemplo, sea el número 182:

$$182 = 6 \cdot 30 + 2$$

Esto implica que 182 está en la fila 31 y columna 3 (todo movido un lugar pues el 0 corresponde a la primera fila, primera columna)

Por lo tanto para 126:

$$126 = 6 \cdot 21 + 0$$

Esto implica que 126 está en la fila 22 y columna 1.

- (b) En la novena fila, segunda columna se encuentra el número que cumple:

$$6 \cdot 8 + 1 = 49$$

Es decir el número es 49.

- (c) Primero debo saber en que columna se encuentra el 130, para esto seguimos el procedimiento anterior:

$$130 = 6 \cdot 21 + 4$$

Esto implica que el número 130 se encuentra en la fila 22 y columna 5.

Para encontrar números en la columna 5 y mayor a 1000, basta dividir a 1000 en 6 y ver cual es el mínimo cociente y de allí elegir mayores:

$$1000 = 6 \cdot 166 + 4$$

Entonces tengo que elegir números de la forma $6 \cdot k + 4$ con $k > 166$, en ese caso elijo 167 y 168 para k y los números serían:

$$6 \cdot 167 + 4 = 1006$$

$$6 \cdot 168 + 4 = 1012$$

Nota: todo k de la forma planteada cumple con la condición!

- (d) Realizamos lo mismo que para b:

$$6 \cdot 36 + 2 = 218$$

Por lo tanto, el número es 218.

- (e) Ya sabiendo la estructura de los números basta dividir al 27643:

$$27643 = 6 \cdot 4607 + 1$$

El número 27643 se encuentra en la fila 4608 y columna 2.

- (f) Siguiendo la idea anterior, nuevamente, si formamos 7 columnas, el comportamiento por fila se ve determinado por la tabla del 7 y las columnas refiriendo al resto de las divisiones por 7, entonces, para el número 126:

$$126 = 7 \cdot 18 + 0$$

Esto implica que el número 126 se encuentra en la fila 19 y columna 1.

Para el número en la fila 8 y columna 4:

$$7 \cdot 7 + 3 = 52$$

Por lo tanto, el número es 52.

- (g) Primero para esta nueva columna, nos conviene saber de cuanto es la diferencia por fila y podemos deducir de allí, cual "tabla" es de la que se está hablando, de ahí es fácil deducir el resto dividiendo los números de la columna (con uno basta) por el número de la diferencia obtenido:

$$19 = (19 - 7) \cdot k + r$$

$$19 = 12 \cdot k + r$$

$$19/12 = 1 + 7 \implies k = 1 \text{ y } r = 7$$

Esto quiere decir que hablamos de la tabla del 12, es decir, hay 12 columnas que corresponden a los 12 restos posibles (de 0 a 11) y las filas corresponden al múltiplo de 12:

$$1147 = 12 \cdot 95 + 7$$

Por lo tanto, el número 1147 se encuentra en la fila 96 y columna 8.

2. Determinar la longitud de la diagonal de un ortoedro conociendo las longitudes de sus aristas.

Los ortoedros son figuras tridimensionales con seis caras rectangulares, y sus aristas se pueden denotar como a , b y c (ya que coinciden de a pares en cada cara del ortoedro). La diagonal de un ortoedro se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras en tres dimensiones teniendo en cuenta que toma una de las aristas (sea esta a), la diagonal de una cara del ortoedro (como es de una cara donde no está a , resulta esa diagonal del triángulo formado por las aristas b y $c \implies d_1 = \sqrt{b^2 + c^2}$) y resulta la hipotenusa de ese triángulo rectángulo la diagonal del ortoedro. La fórmula para la longitud de la diagonal d es:

$$d = \sqrt{a^2 + \left(\sqrt{b^2 + c^2}\right)^2} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Dependiendo que arista se tome como base, el resultado es el mismo, por lo tanto, la fórmula para la diagonal de un ortoedro con aristas a , b y c es la misma.

3. Considerar rectángulos cuyos perímetros son de 24cm. Con esta condición:


Al hablar del perímetro de un rectángulo, sabemos que es la suma de dos pares de lados iguales, es decir, $2h + 2b = 24cm \implies h + b = 12cm$. Esto implica que la altura de un rectángulo es $h = 12cm - b$ y la base es b . Por lo tanto, la altura de un rectángulo con perímetro de 24cm se puede expresar en función de su base como $h = 12cm - b$.

- (a) Asignar distintos valores a la base y encontrar el valor correspondiente de la altura. Dibuje algunos de estos rectángulos con las medidas de sus lados.

$$b = 4cm \implies h = 8cm$$

$$b = 5cm \implies h = 7cm$$


$$b = 6cm \implies h = 6cm$$



- (b) ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar la base? ¿Y el menor?

Viendo que los lados no pueden ser nulos porque si no no se formaría la figura, el menor lado posible es aquel que tienda a 0, no es un número fijo pues son infinitos los números en cualquier intervalo, pero sea ese lado base o altura es el mismo caso, y por la relación entre altura y base, el mayor lado posible es aquel que tienda a 12, pero nuevamente no es un número fijo pues son infinitos los números en cualquier intervalo, pero sea ese lado base o altura es el mismo caso.

- (c) Construir una tabla con los pares de valores obtenidos en (a) y representarlos en ejes cartesianos. ¿Cómo están ubicados los puntos representados?



Por como está interpretada la relación entre altura y base, los puntos representados se encuentran sobre la recta dada por la ecuación $h = 12cm - b$, es decir, cada punto representa un par de valores de base y altura que cumplen con la condición del perímetro dado.


- (d) Construir una función que muestre la variación de la altura en función de la base.

Ya está hecho en la interpretación del perímetro ante de los incisos.

- (e) ¿Qué se puede decir del área de los distintos rectángulos?

El área de un rectángulo se calcula como el producto de su base por su altura, es decir, $A = b \cdot h$. Dado que la altura se puede expresar en función de la base como $h = 12cm - b$, el área también se puede expresar en función de la base como $A = b \cdot (12cm - b) = 12b - b^2$. Esto implica que el área de los distintos rectángulos varía en función de la base, y se puede analizar esta variación utilizando la función cuadrática obtenida. Por ejemplo, para encontrar el valor máximo del área, se puede completar el cuadrado o utilizar la fórmula del vértice para encontrar el valor de b que maximiza el área.

- (f) Partiendo de la tabla generada en el ítem c, construir otra en la que figure la longitud de la base y el área del rectángulo. Representar estos valores en los ejes cartesianos.



La gráfica obtenida es una parábola que se abre hacia abajo, esto se debe a que el coeficiente del término cuadrático en la función del área es negativo ($-b^2$), lo que indica que la función tiene un máximo en lugar de un mínimo. El vértice de esta parábola representa el punto donde el área es máxima, y se puede calcular utilizando la fórmula del vértice para funciones cuadráticas. En este caso, el vértice se encuentra en $b = 6\text{cm}$, lo que corresponde a un área máxima de $A = 36\text{cm}^2$. Esto implica que el rectángulo con perímetro de 24cm que tiene la mayor área es aquel con base y altura iguales a 6cm .

(g) ¿Para qué valores de la base y la altura el área será máxima?

como se concluyó en el inciso anterior, el área será máxima cuando la base y la altura sean iguales a 6cm , es decir, cuando el rectángulo sea un cuadrado con lados de 6cm . Esto se debe a que la función del área es una parábola que se abre hacia abajo, y su vértice representa el punto donde el área es máxima. En este caso, el vértice se encuentra en $b = 6\text{cm}$, lo que corresponde a un área máxima de $A = 36\text{cm}^2$.

(h) Determinar los dominios de las funciones construidas en los incisos anteriores.

Como están en término de la base y altura, y ninguna puede ser nula, ambos dominios están determinados en $(0, 12)$

4. Dado un prisma recto de base cuadrada, encontrar la longitud del lado de la base y la altura conociendo su volumen, 63cm^3 , y su área total 102cm^2

Para resolver este problema, primero denotamos la longitud del lado de la base cuadrada como s y la altura del prisma como h . El volumen de un prisma recto se calcula como el área de la base multiplicada por la altura, es decir, $V = A_{base} \cdot h$. Dado que la base es un cuadrado, su área se calcula como $A_{base} = s^2$. Por lo tanto, el volumen se puede expresar como:

$$V = s^2 \cdot h$$

Dado que el volumen es de 63cm^3 , podemos escribir la ecuación:

$$s^2 \cdot h = 63$$

Por otro lado, el área total de un prisma recto se calcula como la suma del área de las dos bases y el área lateral. El área de las dos bases es $2 \cdot A_{base} = 2s^2$, y el área lateral se calcula como el perímetro de la base multiplicado por la altura, es decir, $A_{lateral} = P_{base} \cdot h$. Dado que la base es un cuadrado, su perímetro se calcula como $P_{base} = 4s$. Por lo tanto, el área lateral se puede expresar como:

$$A_{lateral} = 4s \cdot h$$

Por lo tanto, el área total del prisma se puede expresar como:

$$A_{total} = 2s^2 + 4s \cdot h = 102$$

Ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$s^2 \cdot h = 63 \quad (1)$$

$$2s^2 + 4s \cdot h = 102 \quad (2)$$

Podemos resolver este sistema de ecuaciones para encontrar los valores de s y h . Primero, despejamos h de la ecuación (1):

$$h = \frac{63}{s^2}$$

Luego, sustituimos este valor de h en la ecuación (2):

$$2s^2 + 4s \cdot \frac{63}{s^2} = 102$$

Simplificando esta ecuación, obtenemos:

$$2s^2 + \frac{252}{s} = 102$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por s para eliminar el denominador

$$2s^3 + 252 = 102s$$

Reorganizando esta ecuación, obtenemos:

$$2s^3 - 102s + 252 = 0$$

Dividiendo toda la ecuación por 2 para simplificarla, obtenemos:

$$s^3 - 51s + 126 = 0$$

Ahora, podemos resolver esta ecuación cúbica para encontrar el valor de s . Podemos intentar encontrar una raíz racional utilizando el teorema de las raíces racionales o utilizando métodos numéricos. Probando con algunos divisores de 126, encontramos que $s = 3$ es una raíz de la ecuación (desglosando el 51s en 9s+42s, es fácil darse cuenta de donde viene (agregar $3s^2 - 3s^2$)). Por lo tanto, podemos factorizar la ecuación como:

$$(s - 3)(s^2 + 3s - 42) = 0$$

Ahora, podemos resolver cada factor para encontrar las posibles soluciones para s . De la primera factor, obtenemos $s = 3$. De la segunda factor, podemos usar la fórmula cuadrática para encontrar las raíces:

$$s = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-42)}}{2 \cdot 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 168}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{177}}{2}$$

Dado que s representa la longitud del lado de la base, debe ser un número positivo. Por lo tanto, descartamos la raíz negativa y nos quedamos con:

$$s = \frac{-3 + \sqrt{177}}{2}$$


Ahora que tenemos el valor de s , podemos sustituirlo en la ecuación (1) para encontrar el valor de h :

$$h = \frac{63}{s^2} = \frac{63}{\left(\frac{-3 + \sqrt{177}}{2}\right)^2}$$

Por lo tanto, la longitud del lado de la base es $s = \frac{-3 + \sqrt{177}}{2}$ cm y la altura del prisma es $h = \frac{63}{\left(\frac{-3 + \sqrt{177}}{2}\right)^2}$ cm.

5. El círculo en la figura es tangente a las dos rectas dadas en los puntos P y Q. Demostrar las siguientes afirmaciones:

- a) Los segmentos de recta PV y QV tienen la misma longitud.
b) La semirrecta VC biseca el ángulo PVQ.



- (a) Como las dos rectas son tangentes al círculo, sabemos que su segmento al centro es perpendicular a ellas por el punto de tangencia, es decir:


$$\overline{PC} \perp \overline{PV}$$

$$\overline{QC} \perp \overline{QV}$$


Más aún, como el segmento $\overline{PC}$ y $\overline{CQ}$ son radios de la circunferencia y por lo tanto son equivalentes, además si considero los triángulos $\triangle PCV$ y $\triangle QCV$, por criterio $L - A - L$ son congruentes, lo que implica $\overline{PC} \equiv \overline{QC}$

- (b) Como los ángulos son congruentes en ambos triángulos, entonces $\angle PVC$ y $\angle CVQ$ son congruentes, y por lo tanto, $\angle PVQ$ es un ángulo que da el doble de $\angle PVC$ o $\angle CVQ$ y por lo tanto $\overline{VC}$ es bisectriz.
6. Se tienen dos rectas y un punto marcado en una de ellas. Mostrar cómo se construye, usando regla y compás, un círculo tangente a ambas rectas, que tenga al punto P como punto de tangencia en la recta de arriba.
- (a) Primero marco el arco con vértice en la intersección de las rectas y radio en P y veo donde interseca en la otra recta.
- (b) Luego marco la perpendicular a la recta donde se encuentre P que pase por P
- (c) En la intersección de la recta perpendicular con la bisectriz encuentro el centro de la circunferencia, sea este punto C.
- (d) Finalmente, con centro en C y radio CP trazo la circunferencia, esta es tangente a ambas rectas y pasa por el punto P.
7. Se arroja agua en un recipiente cilíndrico, obteniéndose las siguientes mediciones de la altura del nivel de líquido y el volumen contenido en el recipiente. Realice el gráfico de la altura del nivel de líquido en el recipiente en función de su volumen

Volumen (cm ³)	Altura (cm)
10	1
20	2
30	3
40	4
50	5




Se ve una relación de 1 a 10 entre la altura y el volumen, lo que es consistente con la fórmula del volumen de un cilindro $V = \pi r^2 h$, donde r es el radio de la base del cilindro y h es la altura del nivel de líquido. Dado que el radio del cilindro es constante, el volumen es directamente proporcional a la altura, lo que explica la relación lineal observada en el gráfico.



8. Para cada uno de los siguientes recipientes, graficar la altura del nivel de líquido contenido en función de su volumen:

- Recipiente cilíndrico que se achica en la parte superior, al igual que el punto anterior, inicia con una ecuación lineal entre el volumen y la altura y luego vuelve a otra lineal con una relación mayor, es decir, la altura crece más rápido en función del volumen.
- Recipiente cilíndrico que en su parte superior está constantemente ensanchando, inicia con una ecuación lineal entre el volumen y la altura y luego pasa a otra cuadrática, es decir, la altura crece más rápido en función del volumen.
- Recipiente en forma de bola que en su parte superior tiene la forma de un cilindro, inicialmente la altura en relación del volumen está constantemente disminuyendo y al pasar el radio de la bola en su altura, pasa a crecer más rápido en función del volumen, es decir, la relación entre altura y volumen tiene un comportamiento de una función cúbica con un punto de inflexión en el radio de la bola, finaliza con el comportamiento cilíndrico.
- Recipiente en forma de cono, inicialmente la altura en relación del volumen está constantemente disminuyendo con un comportamiento cuadrático relacionado al recipiente.

9. Gráfico de los recipientes:



10. La piscina mostrada en la figura tiene 1m de profundidad mínima y 2,40m de profundidad máxima, 12m de largo y 9m de ancho, y el fondo es un plano inclinado.

- Expresar el volumen V del agua contenida en la piscina en función de la altura h del nivel del agua desde el extremo más profundo.

Para expresar el volumen V del agua contenida en la piscina en función de la altura h del nivel del agua desde el extremo más profundo, primero tengo que considerar la figura formada por el desnivel, primero el dato que no cambia es el ancho de la pileta siendo de 9m, de allí pensamos la figura formada por el desnivel multiplicando el ancho de la pileta por el triángulo formado por su cara (pensando que en él está reflejado el teorema de Thales), sea el máximo de la altura en tal triángulo 1,4m por teorema de Thales, resulta:

$$\frac{1,4}{h} = \frac{12}{x} \implies x = \frac{12}{1,4} \cdot h$$

Ahora, el área del triángulo está dada por $A = \frac{1}{2} \cdot h \cdot x$, reemplazando x por su valor, obtenemos $A = \frac{1}{2} \cdot h \cdot \frac{12}{1,4} \cdot h = \frac{6}{1,4} \cdot h^2$.

Finalmente el volumen hasta 1m de altura es de $V = 9 \cdot A = 9 \cdot \frac{6}{1,4} \cdot h^2 = \frac{54}{1,4} \cdot h^2$. De allí el volumen tiene un comportamiento del volumen en un prisma de base con aristas de 9 y 12 metros y altura de 1 metro máximo que va variando según la altura en la que tomemos el nivel del agua, es decir el volumen se puede escribir como $V = h \cdot 9 \cdot 12$.


Esto implica que hasta la altura 1,4m desde la base de la pileta el volumen está dado por:

$$V = \frac{54}{1,4} \cdot h^2$$

De allí, para alturas mayores a 1,4m, el volumen se puede escribir como la suma del volumen hasta 1,4m y el volumen adicional que se obtiene al aumentar la altura del agua, es decir:

$$V = \frac{54}{1,4} \cdot 1,4^2 + 9 \cdot 12 \cdot (h - 1,4) = 54 + 108 \cdot (h - 1,4)$$

11. Quiero pensar en un recipiente con la base de un prisma con datos dados que a medida que la altura aumente el largo del recipiente va disminuyendo de forma cuadrática. De la siguiente manera pensando en una vista lateral:



Es decir, que hasta cierta altura dada, el área está compuesta por el área bajo la cuadrática y un rectángulo de la altura dada y un largo reducido:

$$A(h) = \int_0^{\sqrt{h}} t^2 dt + \int_{\sqrt{h}}^{largo_{total}} h dt$$

$$A(h) = \frac{t^3}{3} \Big|_0^{\sqrt{h}} + h \cdot (largo_{total} - \sqrt{h})$$

$$A(h) = \frac{h^{\frac{3}{2}}}{3} + h \cdot (largo_{total} - \sqrt{h})$$

De acá se puede obtener el volumen pensando en que el ancho del recipiente es constante, entonces el volumen se puede escribir como $V(h) = A(h) \cdot ancho$. Por lo tanto:

$$V(h) = \left(\frac{h^{\frac{3}{2}}}{3} + h \cdot (largo_{total} - \sqrt{h}) \right) \cdot ancho$$

12. En una perfumería se venden botellas de un perfume A. Las botellas tienen una altura de 8cm y contienen 10cl de perfume. En la vidriera del negocio se publicita una botella de la misma forma pero agrandada y conteniendo el mismo perfume. Esta botella tiene una altura de 24cm, ¿cuánto perfume tendrá esta botella mayor?

No llego a entender a que se refiere con la forma agrandada.

13. Este está resuelto al principio
14. Intercambio de coeficientes

14. Sean $P(x)$ y $Q(x)$ polinomios cuyos coeficientes son los mismos pero con el orden cambiado:

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

$$Q(x) = a_n + a_{n-1}x + a_{n-2}x^2 + \dots + a_0x^n$$

¿Cuál es la relación entre las raíces de $P(x)$ y $Q(x)$?

Si se calcula $x^n P(\frac{1}{x})$ se obtiene:

$$x^n P\left(\frac{1}{x}\right) = x^n \left(a_0 + a_1 \cdot \frac{1}{x} + a_2 \cdot \frac{1}{x^2} + \dots + a_n \cdot \frac{1}{x^n} \right) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n$$

Esto es exactamente el polinomio $Q(x)$, por lo tanto, $Q(x) = x^n P(\frac{1}{x})$ que quiere decir que si r es raíz de $P(x)$, entonces $\frac{1}{r}$ es raíz de $Q(x)$, y viceversa. (Esto sale de que $P(\frac{1}{\frac{1}{r}}) = P(r) = 0$)

15. Sean a_0 y a_1 números reales. Se define la sucesión $\{a_n\}$ por:

$$a_n = \frac{1}{2}(a_{n-2} + a_{n-1})$$

Para n mayor o igual a 2 ¿Es convergente tal sucesión? ¿Cuál es el límite?

Para determinar si la sucesión $\{a_n\}$ es convergente, primero debemos encontrar su límite. Supongamos que la sucesión converge a un límite L . Entonces, podemos escribir:

$$L = \frac{1}{2}(L + L) = \frac{1}{2} \cdot 2L = L$$