

Articles of Revision

Medidas não farmacológicas no manejo da dor em recém-nascido: cuidado de enfermagem

Ana Paula da Silva Moraes¹

Universidade Estadual do Ceará, Brasil

Silvania Moreira de Abreu Façanha¹

Universidade Estadual do Ceará, Brasil

Sarah Nogueira Rabelo¹

Universidade Estadual do Ceará, Brasil

Ver todos los autores

Recepção: 20 Janeiro 2016

Aprovação: 23 Março 2016

DOI: <https://doi.org/10.15253/2175-6783.2016000300019>

Objetivo: analisar as evidências da literatura sobre o manejo da dor durante a punção arterial, venosa e capilar no recém-nascido que receberam medidas não farmacológicas antes do procedimento doloroso.

Métodos: revisão integrativa realizada em bases de dados. Inicialmente, selecionados 120 artigos, sendo amostra composta de dez artigos. Dados coletados em formulário.

Resultados: a glicose por via oral foi o método mais utilizado, seguido do leite materno e medidas de contato e o uso da glicose associado ou não com leite materno e medidas de contato.

Conclusão: o uso de métodos não farmacológicos tem se mostrado eficaz para promover o alívio da dor em neonatos.

Palavras chave: Recém-Nascido, Enfermagem, Dor, Vasos Sanguíneos, Glucose.

Introdução

A dor no recém-nascido é decorrente de procedimentos realizados durante o internamento na unidade neonatal incluindo as punções realizadas para coleta de exames laboratoriais, frequentes na prática clínica do enfermeiro.

A dor sentida pelo recém-nascido tem sido objeto de estudo nos últimos anos, pelo risco de possíveis alterações neurológicas e comportamentais que as experiências dolorosas produzem sobre o desenvolvimento⁽¹⁾. Este fato tem despertado preocupação na equipe multidisciplinar que presta cuidados ao recém-nascido nas unidades neonatais, em particular na equipe de enfermagem que realiza essas punções.

Estudos em animais e recém-nascidos mostram que a reação a estímulos dolorosos, repetidos e prolongados episódios podem causar consequências no desenvolvimento cognitivo e neurocomportamental em médio e longo prazo⁽²⁾.

Sabe-se que os recém-nascidos são submetidos a diversos estímulos dolorosos diariamente durante o período da hospitalização, tais como: intubação, aspiração da cânula orotraqueal, coleta de exames pela punção arterial, acesso venoso, drenagem de tórax, entre outros⁽³⁾. Estima-se que durante este período de

Intervenção	OR	IC95%	OR	IC95%	OR	IC95%	OR	IC95%
Intervenção	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenção	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenção	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenção	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenção	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenção	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenção	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenção	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenção	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenção	0	0	0	0	0	0	0	0