

حل تمرین سری دوم مدل

آنچه می‌دانم

- 4 Let L' be the formal deductive system which differs from L only in having the axiom scheme ($L'3$) $((\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow A))$ in place of ($L3$). Show that, for any wfs. \mathcal{A} and \mathcal{B} of L (and so of L'):

$$(i) \quad \vdash_L ((\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow A)),$$

and

$$(ii) \quad \vdash_{L'} ((\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)).$$

Deduce that a wf. is a theorem of L if and only if it is a theorem of L' .

$$(i) \quad \vdash_L ((\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow A)) \Leftrightarrow \{(\neg A \rightarrow \neg B)\} \vdash_L ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow A)$$

$$\Leftrightarrow \{(\neg A \rightarrow \neg B), (\neg A \rightarrow B)\} \vdash_L A$$

$$\begin{array}{lll} \text{فرض} & \neg A \rightarrow B & * \\ \text{فرض} & \neg A \rightarrow \neg B & \rightarrow \\ *, **, HS & \neg A \rightarrow A & \\ & A & \end{array} \quad \begin{array}{l} B \rightarrow A ** \\ L3 \\ (\neg A \rightarrow A) \rightarrow A : \text{طبق قاعده} \end{array}$$

$$(ii) \quad \vdash_{L'} ((\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)) \Leftrightarrow \{(\neg A \rightarrow \neg B)\} \vdash_{L'} (B \rightarrow A)$$

$$\Leftrightarrow \{(\neg A \rightarrow \neg B), B\} \vdash_{L'} A$$

$$\begin{array}{ll} \text{فرض} & B & *^1 \\ \text{فرض} & \neg A \rightarrow \neg B & \\ L'3 & (\neg A \rightarrow B) \rightarrow A & *^4 \\ L1 & B \rightarrow (\neg A \rightarrow B) & *^2 \\ *^1, *^2, MP & \neg A \rightarrow B & *^3 \\ *^3, *^4, MP & A & \end{array}$$

→ theorem \rightarrow درنتیج، همچنین metatheorem $L' \rightarrow ii \rightarrow L \rightarrow i \leftarrow$
 . $\neg \vdash A = B \vdash i \vdash L \rightarrow L'$, \rightarrow theorem \rightarrow , $ii \vdash L' \rightarrow L$

- 5 The rule *HS* is an example of a legitimate additional rule of deduction for *L*. Is the following rule legitimate in the same sense: from the wfs. \mathcal{B} and $(\mathcal{A} \rightarrow (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}))$, deduce $(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C})$?

$$\begin{array}{ll}
 \text{فرض} & B \\
 \text{فرض} & A \rightarrow (B \rightarrow C) \\
 L_2 & (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C) \\
 L_1 & B \rightarrow (A \rightarrow B) \\
 MP, * & A \rightarrow B \\
 MP, ** & A \rightarrow C
 \end{array}$$

$$\therefore \{B, A \rightarrow (B \rightarrow C)\} \vdash_L (A \rightarrow C)$$

- 7 Let \mathcal{A} be a wf. of *L* and let L^+ be the extension of *L* obtained by including \mathcal{A} as a new axiom. Prove that the set of theorems of L^+ is different from the set of theorems of *L* if and only if \mathcal{A} is not a theorem of *L*.

\Rightarrow : از آن با که اصول L با L^+ و A تناوی دارد، A فواید
 نکته: مجموعه تعنیایی آن با L^+ تناوی ندارد.

از آن با که A بُقْتی از تانیین L آن را بُت نمایند. با افزودن آن
 به اصول L صفاتی بُقْتی جیسے (A) در L^+ وجود دارد که در L تغییر نیست. (خوب
 هر بُقْتی از اصول، بُقْتی بُطل است.)

- 8 Let \mathcal{A} be the wf. $((\sim p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow (p_1 \rightarrow \sim p_2))$. Show that L^+ , obtained by including this \mathcal{A} as a new axiom, has a larger set of theorems than L . Is L^+ a consistent extension of L ?

$(\sim p_1 \rightarrow p_2)$			\rightarrow	$(p_1 \rightarrow \sim p_2)$		
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0

از آن با که A تَوْلِیت نیست، L^+ بُقْتی توسع اگر از L است و از آن با که A تَناقض نیست (طبق معنی) L^+ بُقْتی توسع اگر از L است. L^+ بُقْتی توسع اگر از L است.

- 9 Prove that if \mathcal{B} is a contradiction then \mathcal{B} cannot be a theorem of any consistent extension of L .

بجهان خلت . فرض کنیم L^* نتیجه مجموع سازگار از L باشد ①
 کوتوالوژی است ، پس طبق تعریف ② این طبق تعریف ③ است .
 $\neg\neg$ -تناقض با فرض سازگار بودن L^* .

- 10 Let L^{++} be the extension of L obtained by including as a fourth axiom scheme:

$$((\neg A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \neg B)).$$

Show that L^{++} is inconsistent. (Hint: see Chapter 1 exercise 7.)

جوت مطابق سوال \wedge فرم لغزد، این آن کوتوالوژی نست ،
 این سیکlus از آن بازیم که تناقض باشد.

$$\begin{aligned} A &= p_1 \vee \neg p_1 & B &= p_2 \vee \neg p_2 \\ \Rightarrow (\neg(p_1 \vee \neg p_1) \rightarrow (p_2 \vee \neg p_2)) &\rightarrow ((p_1 \vee \neg p_1) \rightarrow \neg(p_2 \vee \neg p_2)) = F \end{aligned}$$

پس نتیجه آن کوتوالوژی است \Leftarrow در L^{**} نیز $\neg\neg$ -تناقض است .
 هم این اصل دهم نتیجه آن در L^{**} نیز سازگار است .

- 11 Let J be a consistent complete extension of L , and let \mathcal{A} be a wf. of L . Show that the extension of J obtained by including \mathcal{A} as an additional axiom is consistent if and only if \mathcal{A} is a theorem of J .

\Leftarrow : چون Γ کامل است، A قفسیه ای از Γ ، پس $\neg A$ تغییر ای از Γ نیست و این

توسیع سازگار است. (طبق سوال ۷، قضایای Γ با این توسعه کن متناد است نیست) چون A بی
قضیه از Γ است.)

\Rightarrow : عکس نقضی. خرمنه کن A قضیه ای از Γ نباشد. چون Γ کامل است پس $\neg A$
بی قضیه از Γ و در نتیجه، بکه قضیه از توسعه Γ است. هم $\neg A$ هم در این توسعه
قضیه هست. پس این توسعه نسازگار است.

- 12 Let \mathcal{A} be a wf. of L in which the statement letters p_1, \dots, p_n occur, and let $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ be any wfs. of L . Let \mathcal{B} be the wf. of L obtained by substituting \mathcal{A}_i for each occurrence of p_i in \mathcal{A} ($1 \leq i \leq n$). Prove that if \mathcal{A} is a theorem of L then \mathcal{B} is a theorem of L .

حداکثر آندر صورت نزاره ای مامن از جانشیزی متغیر کی نزاره های توکل بر آنها صورت
اعمالی شنید توکل بر آنها است (طبق قضیه) و از آن جا که بی فرمول خوش ساخت از L ،
در L قعنی است \Rightarrow توکل بر آنها پس حکم اثبات شود.

پرسش ۱. مجموعه Γ از فرمول های L سازگار است اگر هیچ فرمولی مانند A وجود نداشته باشد که $\Gamma \vdash_L A$ و $\Gamma \vdash_L \neg A$. فرض کنید Γ مجموعه ای از فرمول ها باشد، تابع ارزش دهی v را مدلی از Γ مینامیم، اگر برای هر $v(B) = T$ ، $B \in \Gamma$ داشتیم آنگاه مدل دارد. (لم وجود مدل)

$\forall i \in I \quad \Gamma \vdash_L A_i \quad \text{فرض کنید} \quad \dots, A_1, A_2, \dots, A_n \text{ فرمولی } \Gamma \text{ باشند. از آن جا که}$
 $\neg \exists i \in I \quad \Gamma \vdash_L \neg A_i \quad \text{د چون } \Gamma \text{ سازگار است} \Leftrightarrow$
 $\forall i \in I \quad \neg \exists i \in I \quad v(A_i) = T \quad \text{پس ثابت} \quad \neg \exists i \in I \quad v(A_i) = F \quad \text{که تابع ایست.} \quad \Leftarrow \Gamma \text{ مدل دارد.}$

پرسش ۲. نشان دهید دو گزاره‌ی زیر برای مجموعه‌ای از فرمول‌ها مانند Γ معادل‌اند: (قضیه فشردگی)

۱. Γ مدل دارد.

۲. هر زیرمجموعه‌ی متناهی Γ مدل دارد.

$\Leftrightarrow ۱$: $\text{فرض کنیم } \Gamma \text{ مدل } \Gamma \text{ باشد. به همین سه مرتبه زیر مجموعه } (\subseteq \text{ متناهی و } \supseteq \text{ متناهی})$

از Γ نیز مدل است.

$\Leftrightarrow ۲$: عکس فتحی . خرض کنیم Γ مدل ناتوانست باشد. پس Γ ناسازگار است (طبق سوال قبل).

$$\therefore \exists A \quad \Gamma \vdash A^*, \quad \Gamma \vdash \neg A^{**}$$

. $\neg \vdash A \vdash \neg A$ که $A, A_1, A_2, \dots, A_n \vdash \neg A$ $\Leftrightarrow *$ وجود دارد و بنابراین

. $\neg \vdash \neg A \vdash \neg A$ که $\neg A, \neg A'_1, \neg A'_2, \dots, \neg A'_{n'} \vdash \neg A$ $\Leftrightarrow **$ وجود دارد و بنابراین

$$\Gamma' = \Gamma \wedge \left[\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \vee \left(\bigcup_{j=1}^{n'} \neg A'_j \right) \right]$$

تعریف می‌کنم:

$$\Rightarrow |\Gamma'| \leq n + n' \rightarrow \text{ متناهی است} \quad , \quad \Gamma' \vdash A, \quad \Gamma' \vdash \neg A$$

$$\therefore \Gamma' \models A, \quad \Gamma' \models \neg A \quad \text{طبق قضیه درست قوی،}$$

پس Γ' نیز ناسازگار است و طبق قضیه درست قوی.

پرسش ۳. فرمول A را مستقل از مجموعه‌ای از فرمول‌ها مانند Γ می‌نامیم اگر $A \not\in \Gamma$ و $\neg A \not\in \Gamma$. نشان دهید $p_1 \rightarrow p_2$ مستقل از $\{p_1 \leftrightarrow p_0 \wedge \neg p_2, p_2 \rightarrow p_0\}$ است. توجه کنید که اگر A و B فرمول L باشند، $A \leftrightarrow B$ ، $A \wedge B$ ، $A \vee B$ ، $A \rightarrow B$ و $\neg A$ فرمول نیستند، زیرا مجموعه‌ی نماد‌های استفاده شده در آن‌ها زیر مجموعه‌ی $\{\cdot, \cdot, \neg, \rightarrow, \cdot, p_0, p_1, p_2, \dots\}$ نیست. برای رفع این مشکل، $A \leftrightarrow B$ مختصی برای فرمول $A \wedge B$ و $\neg(A \rightarrow \neg B)$ مختصی برای فرمول $\neg(A \rightarrow B) \rightarrow \neg(B \rightarrow A)$ در نظر بگیرید.

$$\left\{ \neg \left[\left[\neg ((p_1 \rightarrow p_0) \rightarrow \neg (p_2 \rightarrow p_0)) \right] \rightarrow p_2 \right], \quad p_2 \rightarrow p_0 \right\} \vdash ? \quad p_1 \rightarrow p_2 \iff$$

$$\vdash_L \vdash \left[\left[\begin{array}{c} T \\ \neg (\varphi_1 \rightarrow \varphi_0) \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c} F \\ \neg (\varphi_0 \rightarrow \varphi_1) \end{array} \right] \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c} F \\ (\varphi_1 \rightarrow \varphi_0) \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c} F \\ (\varphi_1 \rightarrow \varphi_0) \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c} F \\ (\varphi_1 \rightarrow \varphi_0) \end{array} \right]$$

برای $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2 \in wF$ و $(\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2) \equiv (T, T, F)$ تولوچی نیست

$\vdash_L \vdash \vdash$

$$\vdash_L \vdash \left[\left[\begin{array}{c} T \\ \neg (\varphi_1 \rightarrow \varphi_0) \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c} F \\ \neg (\varphi_0 \rightarrow \varphi_1) \end{array} \right] \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c} F \\ (\varphi_1 \rightarrow \varphi_0) \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c} F \\ \neg (\varphi_1 \rightarrow \varphi_0) \end{array} \right]$$

برای $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2 \in wF$ و $(\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2) \equiv (F, F, F)$ تولوچی نیست

$\vdash_L \vdash \vdash$

پرسش ۴. فرض کنید $\Gamma \cup \{A, B\}$ مجموعه ای از فرمول ها باشد. نشان دهید اگر $\Gamma \cup \{\neg A\} \models B$ و $\Gamma \cup \{A\} \models B$ آنگاه $v(A) = T$ یعنی اگر v مدلی از Γ باشد، آنگاه $\Gamma \models_L A$ نماد

فرض کنیم v مدلی از Γ باشد. v خوب است

برهان ظلف. فرض کنیم $v(B) = F$. برای A داریم :

$\because v(B) = T \iff \neg \vdash \vdash \Gamma \cup \{A\} \vdash \vdash \text{طلب خوب باشد} \iff v(A) = T$ اگر ①

$\because v(B) = T \iff \neg \vdash \vdash \Gamma \cup \{\neg A\} \vdash \vdash \text{طلب خوب باشد} \iff v(A) = F$ اگر ②

$\therefore v(B) = T \iff \neg \vdash \vdash \neg \vdash \vdash$ فرض ظلف تا درست \iff ③

پرسش ۵. فرمول A را نامتناقض می‌نامیم اگر $\perp \leftrightarrow A \wedge B$ و دو فرمول A و B را ناسازگار می‌نامیم اگر $\perp \vdash A \wedge B \leftrightarrow \perp$. از دو متغیر p_0 و p_1 ، حداکثر چند فرمول متناقض دو به دو ناسازگار می‌توان ساخت؟ این فرمول‌ها را مشخص کنید.

تمام دلخواه فرمول $\{p_0, p_1\}$ ، $\neg p_0 \wedge \neg p_1$ است که فقط یک حال تناقض است. لیکن فرمول نامتناقض است اگر و تنها اگر صادق یک سطح از بهول درست آن، T باشد.

سطوحی ترتیب، دو فرمول ناسازگار هستند اگر و تنها اگر بایان هیچ سطحی، هر دو T نشونه. لیکن، حداقل ۴ فرمول نامتناقض دارد به دو ناسازگار می‌توان ساخت.

اینها، از آن جا که هر فرمول صادق یک سطح T دارد و تعداد ملخصه ≤ 4 است و در هر کدام سطح که T باشد، باقی فرمولهای در آن سطح متسنه، پس این تعداد از ۴ محدود نباشد. با توجه به مثال زیر، این کرات 4^{+1} است.

p_0	p_1	A_1	A_2	A_3	A_4
۰	۰	۱	۰	۰	۰
۰	۱	۰	۱	۰	۰
۱	۰	۰	۰	۱	۰
۱	۱	۰	۰	۰	۱