

1/2頁)

田辺薬局 横浜平沼店
TEL 045-323-1739
神奈川県横浜市西区平沼2-7-14

薬の名称	色・形・記号	効能・効果	用法	起	朝	昼	夕	夜	備考
カルベジロール錠10mg「Me」		血圧を下げる、狭心症や不整脈を改善する、心臓の負担を減らす薬です。	1日2回朝夕食後服用 30日分 内服薬		1錠		1錠		★心臓の興奮を高める交感神経の働きを抑え、心臓の働きを緩やかにして負担を減らしたり、心筋の異常な収縮を抑えて脈の乱れを整えます。 ★めまい、心不全の悪化、脈が速い、体がだるい、低血圧、頭痛、発疹、かゆみ、顔・唇・舌・口・のどなどが腫れる等の過敏症状が現れることがあります。 ★自己判断で服用を中止しないで下さい。必ず医師の指示を守って下さい。めまい、ふらつき等が起これる場合があります。転倒に注意して下さい。また車の運転、発熱、かゆみ、顔・唇・舌・口・のどなどが腫れる等の過敏症状が現れた場合には中止し、すぐに医師、薬剤師に連絡して下さい。 【全量60錠】 【処方せん薬：カルベジロール錠10mg「DSEEP」】 ※このお薬は後発品です。
アジルサルタン錠40mg「TCK」		血圧を下げる薬です。	1日1回夕食後服用 30日分 内服薬				1錠		★血管を収縮させて血圧を上げる物質(アンジオテンジンの働きを抑えることにより、頭痛、下痢、嘔吐、めまい、ふらつき等が現れることがあります。転倒に注意して下さい。また高所での作業、車の運転等危険を伴う機械を操作する際は注意して下さい。) ★発熱、かゆみ、顔・唇・舌・口・のどなどが腫れる等の過敏症状が現れた場合には中止し、すぐに医師、薬剤師に連絡して下さい。 【全量30錠】 【処方せん薬：アジルサルタン錠40mg】 ※このお薬は後発品です。
アムロジピンOD錠5mg「サンパ」		血圧を下げたり、狭心症を改善する薬です。	1日1回朝食後服用 30日分 内服薬		1錠				★血管を収縮させるカルシウムの働きを抑えることにより、末梢の血管や心臓へ栄養や酸素を供給している冠血管を広げて、血圧を下げる心臓の負担を軽くします。 ★顔が赤くなる、ぼてり、めまい、頭痛、動悸、便秘、体がだるい、むくみ、面こがき、腫れる、臨検値異常等が現れることがあります。水なしで服用する場合は薬を舌の上のせて、崩れたらただ液と一緒に飲み込んで下さい。 ★自己判断で服用を中止したり、減らしたりすると病状が悪化することがあります。医師の指示を守って下さい。作用が強くなることで、転倒に注意して下さい。また高所での作業、車の運転等危険を伴う機械を操作する際は注意して下さい。 ★発熱、かゆみ、顔・唇・舌・口・のどなどが腫れる等の過敏症状が現れた場合には中止し、すぐに医師、薬剤師に連絡して下さい。

受診した医療機関
田病院
亀浜市西區御所山77
横045-231-1881
字井進先生