

2/2頁)

田辺薬局 横浜平沼店
TEL 045-323-1739
神奈川県横浜市西区平沼2-7-14

薬の名称	色・形・記号	効能・効果	用法	起	朝	昼	夕	寝	備考
リクシアナOD錠30mg		血液が固まるのを抑え、血栓(血液の固まり)がでるのを防ぐ薬です。	1日1回朝食後服用 30日分 内服薬		1錠				★血液の凝固に関わる物質の働きを抑えることにより、血栓がでるのを防ぎます。 ★鼻血、血尿、皮膚に赤や紫の斑点やあざ、打ち身、傷からの出血、貧血、消化管の出血、肝機能異常等が現れることがあります。 ★この薬は水で服用すること、また液のみで服用することでもできます。水なしで服用する場合は舌の上には水なしで服用しないで下さい。飲み込んで下さい。横になつていたり、気がついた時直ちに1回分を服用しないで下さい。服用まで12時間以上空けて下さい。絶対に2回分を一度に服用しないで下さい。吐き血、鼻血、血便、皮膚に赤や紫の斑点やあざ、断ぐらの出血、血尿、血便等の症状が現れたり、赤や紫の斑点やあざ、断ぐらの出血、血尿、血便に連絡して下さい。 【全量 30錠】 ※このお薬は先発品ですが、後発品は存在しません。
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」		過剰な胃酸を中和する、便秘を良くする、尿路結石を予防する薬です。	1日3回毎食後服用 30日分 内服薬		1錠	1錠	1錠		★胃粘膜を刺激する過剰な胃酸を中和したり、腸内で水分を吸収して腸内容物を増やし排便を促します。 ★下痢、血便、血尿、血便等が現れることがあります。 ★高カルシウム血症など副作用は大量にとらないで下さい。 ★シナモンを多く含んだ飲食物は大量にとらないで下さい。金属と擦れると黒色になるので包装から出さず、密に保存して下さい。 ★高カルシウム血症などと思われる症状(吐き気、吐く、立ちくらみ、めまい、脈が速い、皮膚が赤くなる、力が入りにくい、体がだるい、ぼんやりする、うとうとする等)が現れた場合は服用を中止し、直ちに受診して下さい。 【全量 90錠】 【処方せん薬：酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」】 ※このお薬は後発品です。

豊田県西區御所山77
横濱市一231-1881
宇井進先生