

Análisis clínico

****Síntomas:****

Persistencia de síntomas respiratorios desde hace 3 semanas, con antecedentes de rinitis alérgica.

****Hallazgos del examen / Interpretación del examen:****

- Hemoglobina: 13.3 g/dL (normal)
- Hematocrito: 39.5% (normal)
- Leucocitos totales: $4.20 \times 10^3/\mu\text{L}$ (normal)
- Neutrófilos: 49.8% ($2.1 \times 10^3/\mu\text{L}$) dentro de rango normal
- Linfocitos: 35% ($1.5 \times 10^3/\mu\text{L}$) dentro de rango normal
- Monocitos: 11.2% ($0.5 \times 10^3/\mu\text{L}$) dentro de rango normal
- Eosinófilos: 2.8% ($0.1 \times 10^3/\mu\text{L}$) dentro de rango normal
- Plaquetas: $208 \times 10^3/\mu\text{L}$ (normal)

No se observan alteraciones hematológicas significativas ni signos claros de infección bacteriana activa o inflamación alérgica marcada.

****Diagnóstico(s) provisional(es):****

- Persistencia de síntomas respiratorios probablemente relacionados con rinitis alérgica crónica o posible sinusitis subaguda.

****Exámenes sugeridos:****

- Evaluación médica presencial con examen físico completo.
- Tomografía de senos paranasales si los síntomas persisten o empeoran.

****Recomendaciones:****

- Continuar o ajustar tratamiento para rinitis alérgica según indicación médica.
- Control y seguimiento cercano de síntomas.
- Evitar irritantes ambientales que puedan agravar la rinitis.

****Señales de alarma:****

- Fiebre alta persistente.
- Dolor facial intenso o hinchazón.
- Dificultad respiratoria.
- Sangrado nasal abundante.

- Cambios en el estado general.

****Plan y seguimiento:****

- Consulta médica presencial para evaluación y posible tratamiento específico.
- Reevaluación en caso de empeoramiento o aparición de nuevas señales de alarma.

****3 preguntas clave para el médico:****

1. ¿Es necesario iniciar tratamiento antibiótico para una posible sinusitis?
2. ¿Qué ajustes se pueden hacer en el tratamiento de la rinitis alérgica para mejorar los síntomas?
3. ¿Se recomienda realizar estudios de imagen para descartar complicaciones?