
¿Cuáles son los riesgos de la presión arterial alta?


Muchas personas no notan nada ni se sienten mal cuando tienen la PA alta, por ello, es importante conocer los graves riesgos para la salud que podrías sufrir si no controlas la PA.

La PA elevada no tratada puede dañar las arterias, haciendo que se vuelvan rígidas o estrechas. Las grasas se pueden acumular en las arterias dañadas que van al corazón y al cerebro, lo que puede desencadenar un evento cardiovascular, como un infarto o un ictus. Además, la hipertensión puede contribuir a la insuficiencia cardiaca y dañar otros órganos, incluyendo el cerebro, los ojos y los riñones. La PA elevada también puede causar complicaciones durante el embarazo.



¿Cómo se mide la presión arterial?

La PA se registra en dos números: la **presión sistólica** se mide cuando el corazón se está contrayendo y la **presión diastólica** se mide cuando el corazón se está relajando. La PA se mide en unidades de "milímetros de mercurio" o "mmHg".



Presión sistólica (número superior)
Mide la presión cuando el corazón se contrae y bombea sangre

Presión diastólica (número inferior)
Mide la presión cuando el corazón se relaja entre latidos

Es importante que mantengas la PA en un rango sano para proteger los vasos sanguíneos, el corazón y otros órganos. Se considera que una PA normal está por debajo de 120/70 mmHg.

Se recomienda que todas las personas menores de 40 años se midan la PA cada 3 años. Las personas mayores de 40 años deben medirse la PA cada año.

¿Cómo se diagnostica la presión arterial alta (hipertensión)?


Una PA que suele ser de 140/90 mmHg o más alta se denomina "hipertensión". El diagnóstico de la hipertensión se puede hacer en diferentes contextos con diversas técnicas para medir la PA de forma precisa. A veces es necesario comprobar la PA varias veces para confirmar el diagnóstico.

La PA se puede comprobar en **la consulta del médico** durante una cita con tu profesional de la salud.

Si fuese necesario, los profesionales de la salud pueden organizar la **monitorización ambulatoria de la presión arterial (o "MAPA")** para comprobar la PA durante un periodo de 24 horas con un dispositivo especial.

También es posible que te propongan la automedida de la **presión arterial por parte del paciente (o "AMPA")** en el domicilio con un dispositivo para la PA. Deberás medirte la PA tomándote al menos dos mediciones en la mañana y otras dos en la noche, durante varios días. Tu equipo de atención a la salud calculará tu PA media con estas mediciones.


Monitorización de la PA en el domicilio



Utiliza un dispositivo para la PA validado



Mide la PA en una habitación tranquila tras 5 minutos de reposo y con el brazo y la espalda apoyados



Toma dos mediciones en cada ocasión, dejando entre 1 y 2 minutos entre cada una



Mide la PA en la mañana y en la noche durante al menos 3 días, aunque lo recomendable es hacerlo durante 7 días



Toma nota de las mediciones y llévaselas a tu equipo de atención a la salud

Los profesionales de la salud te dirán si tienes una PA normal, una PA elevada o hipertensión según tus mediciones y el lugar donde se tomaron:

	PA medida en la consulta del médico (mmHg)	PA medida en el domicilio (mmHg)
No elevada	Por debajo de 120/70	Por debajo de 120/70
Elevada	Por encima de 120/70, pero por debajo de 140/90	Por encima de 120/70, pero por debajo de 135/85
Hipertensión	Igual o superior a 140/90	Igual o superior a 135/85

Si todavía no lo has hecho, es importante que busques atención médica para discutir estrategias de tratamiento si tu PA está constantemente por encima de 120/70 mmHg.

PA elevada: si tu PA está entre 120/70 y 140/90 mmHg, se recomiendan cambios en el estilo de vida. Mejorar la dieta y aumentar la actividad física pueden disminuir significativamente la PA y prevenir que siga aumentando. En ciertas personas con PA elevada, como en aquellas con otros problemas de salud, también pueden recomendarse medicamentos.

PA alta (hipertensión): si tienes mediciones confirmadas de PA de 140/90 o superiores, necesitarás tomar medicamentos antihipertensivos además de modificar tu estilo de vida. Las personas con hipertensión generalmente tienen otros factores que pueden contribuir al aumento de riesgos importantes para la salud. Tu equipo de atención a la salud puede tomar muestras de sangre y orina para medir el azúcar en sangre, el colesterol y la función renal. También se puede solicitar un electrocardiograma para comprobar el ritmo cardiaco. Si sabes que tienes problemas de salud como la diabetes, el colesterol alto, una enfermedad cardiaca o problemas renales, debes comunicárselo a tu profesional de la salud.

Intervenciones importantes para el control de la PA

Es muy importante que participes activamente en el control de la PA. En este apartado podrás aprender distintas formas de controlar la PA para que puedas participar activamente en su control.


Mediciones frecuentes

Medirte la PA con frecuencia es muy útil y es una práctica recomendada. El control frecuente te ayudará a entender las tendencias de tu PA a lo largo del tiempo y a identificar los factores que puedan afectarla. Es importante que compartas esta información con tu profesional de la salud:

- Mide la PA cada semana.
- Vigila cualquier cambio o tendencia.
- Informa a tu profesional de la salud para ajustar tu plan de tratamiento si las mediciones de la PA siguen aumentando.

Cambios en el estilo de vida

Tomar decisiones proactivas, como adoptar una dieta sana y practicar ejercicio de forma regular, puede disminuir la PA y proteger el corazón y otros órganos, lo que mejora la salud a nivel global.



Un estilo de vida saludable es importante para todas las personas con PA elevada o alta, independientemente de si estás tomando medicamentos antihipertensivos o no.

	¿Por qué tengo que modificar esto?	¿Qué tengo que hacer?
 **Reduce el consumo de sal**	Reducir el consumo de sal puede disminuir significativamente los niveles de PA	Ponte como objetivo menos de 5 g de sal al día
 **Aumenta el consumo de potasio**	Los alimentos ricos en potasio pueden contribuir a reducir los efectos del sodio y bajar la PA	Come plátanos, aguacates, espinacas y/o judías
 **Limita el consumo de bebidas azucaradas**	Reducir el consumo de bebidas azucaradas puede ayudar a prevenir el aumento de peso y disminuir los picos de PA	Bebe agua o bebidas sin azúcar
 **Practica ejercicio de forma regular**	Practicar ejercicio de forma regular fortalece el corazón, lo que le ayuda a bombear sangre más eficientemente, disminuyendo así la presión en las arterias	• El tiempo de ejercicio recomendado es de 150 minutos de una actividad de intensidad moderada a la semana (p. ej., 30 minutos al día, 5 días a la semana) • Aumenta el nivel de ejercicio de forma gradual hasta los niveles recomendados si tu salud te lo permite • Caminar a paso ligero podría ser suficiente • El entrenamiento de fuerza también ayuda
 **Mantén un peso corporal sano**	Conseguir y mantener un peso corporal sano reduce la carga sobre el corazón, lo que disminuye la PA	Si tu índice de masa corporal es superior a 25, reduce el consumo de alimentos y aumenta la actividad física para conseguir una pérdida de peso gradual. Tu equipo de atención a la salud puede darte más recomendaciones
 **Mantén una dieta sana**	Una dieta equilibrada contribuye a la salud cardiaca y mejora el manejo de la PA	Dale prioridad a la ingesta de frutas, verduras, cereales integrales y carnes magras
 **Deja de fumar**	Fumar daña los vasos sanguíneos y aumenta la PA. Dejar de fumar puede ayudar a restaurar tu salud cardiaca y vascular	Pídele a tu profesional de la salud consejo sobre la mejor estrategia para dejar de fumar para ti (p. ej., tratamiento sustitutivo con nicotina, citisina, vareniclina, etc.)
 **Limita el consumo de alcohol**	El consumo excesivo de alcohol puede aumentar la PA	• Ninguna ingesta de alcohol es saludable • Las mujeres y las personas mayores de 65 años no deben consumir más de 1 bebida al día y no más de 7 bebidas a la semana • Los hombres no deben consumir más de 2 bebidas al día y no más de 14 bebidas a la semana • No empieces a consumir alcohol si actualmente no lo haces

Medicamentos

Además de adoptar un estilo de vida sano, las personas con hipertensión necesitan tomar medicamentos para reducir la PA. Los medicamentos también pueden ser necesarios en las personas con PA elevada que tienen otros problemas de salud, como diabetes, antecedentes de enfermedades cardiacas o ictus.

Tu equipo de atención a la salud te comunicará cuáles son los medicamentos apropiados para ti. En la mayoría de los casos, se recomienda combinar dos o más fármacos. Las visitas de seguimiento son esenciales para ajustar tu plan de tratamiento según sea necesario.

NUNCA TOMES DECISIONES
sobre tu tratamiento
POR TU CUENTA

COMPARTE SIEMPRE
tus ideas con tu médico o enfermera (y/o farmacéutico)

TOMA DECISIONES JUNTO CON
tu profesional de la salud sobre cuál es el mejor tratamiento para ti

A continuación, se muestran los tipos de medicamentos antihipertensivos más comunes. También te pueden dar otros medicamentos dependiendo de tus antecedentes médicos.

Clase de medicamento	¿Cómo me ayudarán?	¿Cuándo se utilizan?
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) (p. ej., enalapril, ramipril)	Ayudan a relajar los vasos sanguíneos para que al corazón le sea más fácil bombear la sangre y reducir la PA	Generalmente, estos medicamentos son los primeros que se utilizan debido a las sólidas evidencias sobre su efecto en la reducción de la PA y la prevención de eventos cardiovasculares
Antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA-II) (p. ej., losartán, valsartán)	Bloquean una hormona que tensa los vasos sanguíneos, ayudándolos a relajarse y disminuir la PA	
Bloqueadores de los canales del calcio (p. ej., amlodipino, nifedipino)	Previenen la entrada del calcio en las células del corazón y los vasos sanguíneos para ayudar a los vasos a relajarse y reducir la PA	
Diuréticos (p. ej., hidroclorotiazida, clortalidona)	Ayudan al cuerpo a eliminar el exceso de sal y líquidos del organismo y disminuir la PA	
Betabloqueantes (p. ej., atenolol, bisoprolol)	Ralentizan la frecuencia cardiaca y reducen la fuerza de cada latido para disminuir la PA	Estos fármacos se suelen combinar con otros medicamentos antihipertensivos en las personas con enfermedad cardiaca
Antagonistas del receptor de mineralocorticoides (ARM) (p. ej. espironolactona, eplerenona)	Ayudan al cuerpo a eliminar la sal y conservan el potasio	Estos medicamentos son útiles en la PA difícil de controlar