HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

CONEXIÓN CLÍNICA

Crecemos en Saber

Dengue

¿QUÉ ES?

1. Enfermedad viral febril aguda transmitida principalmente por la picadura del mosquito infectado *Aedes aegypti*
2. Presenta un espectro de manifestaciones que abarca desde procesos asintomáticos hasta cuadros severos.
3. La **OMS** clasifica el dengue en 3 grupos, según el cuadro clínico del caso.

GRUPOS

- **Dengue SIN signos de alarma** — **A**
- **Dengue CON signos de alarma** — **B**
- **Dengue grave** — **C**
  - Síndrome de choque por dengue (SCD)



DIAGNÓSTICO

Se considera CASO PROBABLE en pacientes de área endémica que cumple criterios de:



Dengue SIN signos de alarma	Dengue CON signos de alarma	Dengue grave
Enfermedad febril aguda de 2 - 7 días de evolución, con ≥2 de las siguientes manifestaciones: • Cefalea • Dolor retro ocular • Mialgias • Artralgias • Erupción cutánea, rash • Leucopenia.	Criterios de **dengue sin signos de alarma** con cualquiera de los siguientes: • Dolor abdominal intenso y continuo o a la palpación • Vómitos persistentes, • Diarrea, • Acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico), • Sangrado en mucosas • Letargo o irritabilidad (niños), • Hipotensión postural, • Hepatomegalia dolorosa (>2 cm) • Caída de la temperatura, • Caída abrupta de plaquetas (<100.000) + aumento del hematocrito	Todo caso de dengue con cualquiera de las siguiente manifestaciones: • **Extravasación severa de plasma** que conduce a síndrome de choque por dengue o acúmulo de líquidos con dificultad respiratoria. • **Hemorragias Severas** con compromiso hemodinámico. • **Daño grave de órganos** con signos clínicos o paraclínicos de afectación hepática, del SNC, corazón, riñón, etc.

CLASIFICACIÓN Y MANEJO



GRUPO A **Dengue sin signos de alarma**	• Tolerancia a líquidos vía oral • Sin enfermedades o condiciones asociadas • Diuresis cada 6 horas
Grupo B1 **Dengue sin signos de alarma**	• **Condiciones asociadas** • Embarazo, ≤ 1 año o ≥ 65 años, obesidad mórbida, HTA, diabetes mellitus, asma, daño renal, enfermedades hemolíticas, hepatopatía crónica, gastritis, tratamiento anticoagulante, riesgo social. • **Evaluar observación intramural**
Grupo B2 **Dengue con signos de alarma**	• Manejo intrahospilario con liquidos IV
Grupo C **Dengue Grave**	• Manejo en UCI



A

Manejo ambulatorio

- Reposo absoluto en cama.
- Dieta normal + abundantes líquidos orales (sales de rehidratación oral).
- Explicar **signos de alarma**
- **Manejo sintomático de fiebre:**
  - Medios locales
  - Medicamentos
  - Niños: acetaminofén via oral 10mg/kg cada 6 h.
  - Adultos: acetaminofén V.O 500 mg cada 6 h.
- Dosis máxima diaria 4 g.

- Monitoreo cada 24 - 48 horas tras descender la fiebre sin medicamentos

¿Aparecen signos de alarma?

B2

Alta de dengue



B1

Hospitalizar

- Vigilar **signos de alarma**.
- Valoración binomio madre/hijo (gestantes).
- Estabilizar y manejar comorbilidades.
- **Curva febril.**
- **Promover** ingesta oral de líquidos.
  - Si no tolera, baja ingesta o deshidratación: líquidos I.V
  - Lactato de Ringer o SSN 0,9%
  - Según fórmula de Holliday y Seagar
  - En los otros casos: **2-4ml/kg/h.**
- Balance de líquidos.
- Reinicio de vía oral próximo

B2

Hospitalizar

- Cristaloides (Hartman o SSN 0.9%)

¿Es un adulto mayor o tiene alguna coomorbilidad?



No

10 ml en 1 h

Reducir a 5-7 ml/kg/h por 2-4 h

Mejoría

Reducir a 3-5 ml/kg/h por 2-4 h

Mejoría

Reducir a 2-4 ml/kg/h por 24-48 h

#2: Repetir bolo 10 ml/kg en 1 hr

No mejoría

#3: Repetir bolo 10 ml/kg en 1 hr

SI

5 ml en 1 h

Reducir a 4 ml/kg/h por 2-4 h

Mejoría

Reducir a 3 ml/kg/h por 2-4 h

Mejoría

Reducir a 2 ml/kg/h por 24-48 h

#2: Repetir bolo 5 ml/kg en 1 hr

No mejoría

#3: Repetir bolo 5 ml/kg en 1 hr

NO MEJORÍA

Dengue grave (grupo C)

¿CUÁNDO HAY MEJORÍA CLÍNICA?

- Desaparición progresiva de **signos de alarma**
- Remisión progresiva de sintomatología general
- Signos vitales estables
- Diuresis normal/aumentada
- Disminución del hematocrito a menos del valor base en un paciente estable
- Tolerancia a la vía oral
- Recuperación del apetito

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA

Clínicos	• Ausencia de fiebre por **48 horas** sin antipiréticos • **Mejoría del estado clínico:** bienestar general, apetito, estabilidad hemodinámica, diuresis normal, sin evidencia de sangrado ni dificultad respiratoria
Laboratorios	• Plaquetas con tendencia al aumento. • Hematocrito estable, sin líquidos intravenosos.

Realizado por: Junior Montesino - Médico Interno Medicina Familiar

Referencias

1. Colombia. Instituto Nacional de Salud. (2024). Protocolo de Vigilancia en Salud de Dengue (Versión 7). [Documento en línea]. Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud de Dengue. Versión 7. [Internet] 2024. https://doi.org/10.33610/JQVP8800
2. Organización Panamericana de la Salud, & Organización Mundial de la Salud. (2020). Algoritmos para el manejo clínico de los casos de dengue. Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/sites/default/files/2020-09/2020-cde-algoritmos-manejo-clinico-dengue.pdf