



Examen 2017 junio psicometra

Psicometría (UNED)

## PLANTILLA EXAMEN JUNIO 2017 FORMA A

1- La mayoría de atributos psicológicos: a) **son variables latentes**; b) pueden medirse de forma directa; c) se mantienen constantes a lo largo del tiempo.

2- El Umbral Diferencial: a) es constante a lo largo de la escala de sensación; b) es único para cada sistema sensorial; c) **aumenta a medida que lo hace la magnitud del estímulo**.

3- El formato de los ítems de dos alternativas es adecuado para tests que midan variables: a) de personalidad; b) no cognitivas; c) **cognitivas**.

**Con el enunciado siguiente contestar a las preguntas 4 y 5**

Se quiere elaborar una escala para medir la “violencia de género” y se va a utilizar el método de intervalos aparentemente iguales. Las respuestas emitidas por los jueces respecto al grado de violencia de uno de los ítems se recogen en la tabla adjunta:

Categorías	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jueces	0	0	0	10	20	30	30	50	30	20	10

4- El valor escalar del ítem es: a) **7.7**; b) 6.8; c) 8.3

5- el coeficiente de ambigüedad del ítem es: a) 1.53; b) **2.66**; c) 1.13

$$C.A = 8.83 - 6.17 = 2.66$$

6- Si un conjunto de datos se ajusta al modelo de Guttman: a) el coeficiente de reproductividad es cero; b) todos los sujetos tienen que acertar todos los elementos; c) **el conjunto de ítems que forman la escala miden una única dimensión**.

7- El error típico de estimación: a) **es la desviación típica de los errores de estimación**; b) es la varianza de los errores de estimación; c) varía en cada sujeto de la muestra.

8- La ecuación de Spearman-Brown está basada en la: a) **relación entre la longitud del test y el coeficiente de fiabilidad**; b) variabilidad de la muestra y la fiabilidad del test; c) correlación entre dos formas paralelas de un test.

9- El coeficiente alfa de Cronbach es: a) un indicador de la estabilidad de las puntuaciones; b) **un indicador de la consistencia interna del test**; c) mayor que la correlación obtenida entre las puntuaciones de dos formas paralelas del test.

**Con los siguientes datos responder a las preguntas 10 a la 13**

Se ha aplicado un test de razonamiento abstracto compuesto por 25 ítems a una muestra de sujetos. La media y desviación típica de las puntuaciones obtenidas han sido 15 y 4 respectivamente y el coeficiente de fiabilidad 0.60. El mismo test se ha aplicado a otra muestra, semejante a la anterior, pero cuya desviación típica es el doble.

10- El coeficiente de fiabilidad, en la muestra original, si se duplicara la longitud del test sería: a) 0,70; **b) 0.75**; c) 0.87

11- El índice de fiabilidad si al test original se le añadieran 15 elementos sería: a) 0.71; b) 0.80; **c) 0.84**

12- El coeficiente de fiabilidad obtenido en la segunda muestra sería: **a) 0.90**; b) 0.85; c) 0.81

13- Utilizando el modelo de regresión y un NC del 95%, el intervalo confidencial en el que se encontrará la puntuación verdadera de un sujeto que en el test original obtuvo una puntuación empírica de 20 puntos será: **a) 14.18 y 21.82** ; b) 12.70 y 23.30; c) 16.20 y 19.80

14- En los tests referidos al criterio: a) se hace hincapié en las diferencias individuales; b) se interpretan las puntuaciones en relación a una muestra representativa de la población, **c) se evalúan las destrezas de los sujetos respecto a un dominio concreto.**

15- A una muestra de sujetos se les aplica un test para evaluar su aptitud como pilotos. Para ser considerado APTOS deben acertar el 80% de los ítems. Si estamos dispuestos a admitir un error máximo de 0.05, la longitud del test debería ser: a) 52; **b) 64**; c) 71

Con los datos que se muestran a continuación responder a las preguntas 16, 17 y 18

A una muestra de sujetos se les aplican dos tests paralelos. Para ser considerados APTOS han de sacar un 6 en ambos tests. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla adjunta:

Test A	Test B	Apto	No Apto
	Apto	10	4
	No Apto	6	15

16- la proporción de clasificaciones consistentes esperadas por azar es: a) 0.18; **b) 0.51**; c) 0.33.

17- La proporción de sujetos correctamente clasificados es: a) 0.60; b) 0.53; **c) 0.72**

18- Utilizando el índice de Croker y Algina, ¿se puede decir que la utilización de los tests supone una mejora importante a la hora de clasificar a los sujetos?: a) no porque no supone mejora; b) si, pero no hay más que un 0.05 de mejora; **c) no porque  $p^*$  está más cerca del 0 que del 1.**

=0,44

19- La validez convergente se obtiene cuando: **a) un mismo constructo se mide con distintos tests**; b) varios constructos se miden con el mismo test; c) el test tiene una alta validez de contenido.

20- La varianza residual viene dada por: **a) el cuadrado del error típico de estimación**; b) la raíz cuadrada del coeficiente de validez; c) la proporción de varianza común entre el test y el criterio.

Con los datos que se dan a continuación responder a las preguntas 21 a la 23

Para comprobar si un test de aptitud espacial (X) se puede utilizar en la selección de diseñadores gráficos se lleva a cabo un estudio de validación referida al criterio. Para ello se selecciona algún indicador del criterio (Y), una muestra representativa de la población de estudio a la que se aplica el test (dado que se trata de un ejemplo supongan que son 10 sujetos) y se obtienen los datos siguientes:  $\sum X = 70$ ;  $\sum Y = 52$ ;  $\sum X^2 = 720$ ;  $\sum Y^2 = 344$ ;  $\sum XY = 482$

21- El coeficiente de valor predictivo del test será: a) 0.83; **b) 0.59**; c) 0.91

22- La puntuación típica pronosticada en el criterio a un sujeto que en el test se encontraba a una desviación típica por encima de la media: **a) 0.91**; b) 0.54; c) 0.83

23- Si se duplicara la longitud del test, el coeficiente de validez sería: **a) 0.93**; b) 0.97; c) 0.90

24- En la tabla aparecen las respuestas de 400 sujetos a las 4 alternativas (A, B, C, D) (siendo la opción A la correcta) de un ítem. Se presenta el número de sujetos que han seleccionado cada alternativa y que han obtenido puntuaciones superiores e inferiores al 50% de su muestra.

	A*	B	C	D
50% superior	100	39	32	14
50% inferior	24	50	70	71

El índice de dificultad del ítem corrigiendo el azar es: **a) 0.08**; b) 0.12; c) 0.17.

25- En la tabla adjunta se presentan las puntuaciones obtenidas por una muestra de 50 sujetos en un test de habilidades motoras. Sabiendo que las puntuaciones se ajustan a una distribución normal, calcular el eneatisma correspondiente a la puntuación 10: a) 3; **b) 6**; c) 8

X	6	8	10	12	14
f	6	14	20	6	4

X	6	8	10	12	14	
f	6	14	20	6	4	50
fX	36	112	200	72	56	476
fX <sup>2</sup>	216	896	2000	864	784	4760