

Three Elevators

Jojo likes to use elevator while being at a building. On his father's office, there are 3 identical elevators (which have same velocity 1 level/second).

Unfortunately, one of those elevators is in maintenance. Then, when Jojo sees those two elevators, the first one is on the x^{th} floor going up and the second one is on the y^{th} floor and is going down. The third elevator (which in maintenance) is recently on the k^{th} floor. Jojo is wondering if those three elevators will be in the same level or not.

Format Input

Input consists of 3 integers x, y, k , the position of the first, second, and third elevator, respectively.

Format Output

Output a line consists of t which describe the time when the three elevators are on the same levels. If this event is impossible to happen, output -1.

Constraints

- $0 \leq x, y, k \leq 100$
- All floor numbers is available (no floor number is withdrawn, like 4, 13, etc.)

Sample Input 1 (standard input)

```
3 5 4
```

Sample Output 1 (standard output)


```
1
```

Sample Input 2 (standard input)

```
1 2 5
```

Sample Output 2 (standard output)

-1



Three Elevators

Jojo senang sekali menggunakan lift saat berada di sebuah gedung. Kebetulan, gedung tempat kantor ayahnya bekerja memiliki 3 lift yang identik (memiliki kecepatan yang sama yakni 1 lantai/detik).

Namun sayangnya, hanya 2 *lift* saja yang bekerja dan *lift* lainnya hanya berhenti di lantai k . Saat Jojo mengamati kedua *lift* yang bergerak itu, ternyata *lift* pertama dalam posisi x dan sedang naik ke lantai teratas, dan *lift* kedua di posisi y dan sedang turun ke lantai terbawah. Ia yang baru pandai menghitung pun mencoba apakah dalam waktu t detik ketiga *lift* tersebut ada pada suatu lantai yang sama.

Format Input

Input terdiri dari 3 buah integer x, y, k yang menunjukkan posisi lantai setiap *lift* saat Jojo melihat pada detik ke 0. Dipastikan bahwa x, y, k kurang dari 100 dan semua nomor lantai ada di gedung tersebut (tidak ada nomor lantai yang dihilangkan seperti 4, 13, dan sebagainya).

Format Output

Output yang dikeluarkan berupa t yang menunjukkan waktu saat ketiga *lift* tersebut di posisi lantai yang sama semua. Jika tidak terdapat t yang memenuhi, keluarkan -1.

Constraints

- $0 \leq x, y, k \leq 100$

Sample Input 1 (standard input)

```
3 5 4
```

Sample Output 1 (standard output)

```
1
```

Sample Input 2 (standard input)

```
1 2 5
```

Sample Output 2 (standard output)

-1

Note

Asumsikan bahwa jumlah lantai sangatlah banyak dan tidak diperlukan untuk menyelesaikan soal ini.

