

Q6.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^3 - 3x - 2} =$$

A)  $\frac{1}{2}$

B)  $\frac{1}{4}$

C)  $\frac{2}{3}$

D)  $\frac{3}{2}$

Q7. Soit  $f(x) = |x|$  et  $f'$  la dérivée d'ordre 1 de  $f$ , alors:

A)  $f$  n'est pas dérivable en 0

B)  $f'(0) = 0$

C)  $f'(0) = 1$

D)  $f'(0) = -1$

Q8.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^7 dx =$$

A)  $\frac{1}{\pi}$

B) 0

C)  $\frac{16}{35}$

D)  $\frac{16}{35}\pi$

Q9.

$$\int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{(x - x^3)^{\frac{1}{3}}}{x^4} dx =$$

A) 2

B) 5

C) 6

D) 7

Q10.

$$\int_0^1 \frac{xe^x}{(x+1)^2} dx =$$

A)  $\left(\frac{e}{2} - 1\right)$

B)  $(e^{-2} + 1)$

C)  $e^{-2}$

D)  $e^2$



**Exercice 1:** On munit l'espace d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ :

**Q11.** Une représentation paramétrique de la droite passant par le point  $A = (-1, 2, -3)$  et orthogonale au plan d'équation  $2x - 3y + 4z + 1 = 0$  est :

A)  $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + t \end{cases}$

B)  $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - 2t \\ z = -3 - 4t \end{cases}$

C)  $\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + t \end{cases}$

D)  $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = -3 + 4t \end{cases}$

**Q12.** On note le point  $A = (-1, 3, 1)$  et on considère la droite (D) dont l'une des représentations paramétriques est

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$$

Les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur la droite (D) sont:

A)  $\left(\frac{-33}{17}, \frac{50}{17}, \frac{27}{17}\right)$

B)  $\left(\frac{1}{13}, \frac{12}{13}, \frac{60}{13}\right)$

C)  $\left(\frac{-1}{17}, \frac{18}{17}, \frac{75}{17}\right)$

D)  $\left(\frac{-1}{17}, \frac{18}{17}, -\frac{75}{17}\right)$

**Q13.** L'intersection de la droite dirigée par  $\vec{u} = (3, 2, 1)$  et passant par le point  $A = (1, 2, 3)$  avec le plan  $(xOy)$  est le point B de coordonnées:

A)  $(4, 4, 4)$

B)  $(-5, -2, 1)$

C)  $(-8, -4, 0)$

D)  $(4, 4, 0)$

**Exercice 2:** Pour fêter leur réussite au concours ENSA, Taha et Jawad sont partis au restaurant pour déjeuner. Taha possède dans sa poche trois billets de 50 DH et un billet de 100 DH, alors que Jawad a dans sa poche un seul billet de 50 DH et un seul billet de 100 DH.

En tant que Amis, joyeux, Taha et Jawad décident en commun accord avec le serveur de payer leur repas selon la procédure suivante:

Dans une urne, deux boules enferment chacune le prénom de l'un des deux amis, écrit sur un bout de papier. Le serveur choisit au hasard une des deux boules, l'ouvre, énonce le prénom écrit sur le bout de papier, le remet dans la boule qu'il dépose tout de suite dans l'urne.

La personne dont le prénom est choisit mettra sa main dans sa poche, en fermant les yeux, et fera sortir obligatoirement un seul billet (nous supposons que les billets sont indiscernables au toucher) et le remettra au serveur qu'il mettra à son tour dans sa caisse quelques soit sa valeur. Si la valeur du billet tiré est de 100 DH, le serveur ferme la caisse et les deux amis peuvent quitter le restaurant, sinon l'opération se refait, une seule fois encore, selon la même procédure.



**Q14.** La probabilité pour que le coût du repas des deux amis soit de 150 DH est:

A) 11/32

B) 10/32

C) 9/32

D) 12/32

**Q15.** La probabilité pour que les deux amis paient équitablement le repas est:

A) 6/32

B) 9/32

C) 15/32

D) 11/32

**Q16.** La probabilité pour que l'un des deux amis mange gratuitement est:

A) 19/32

B) 16/32

C) 22/32

D) 4/32

**Exercice 3:** On considère les nombres complexes suivants :

$$z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{6}, z_2 = 2 + 2i \quad \text{et} \quad Z = \frac{z_1}{z_2}$$

**Q17.** La forme algébrique de Z est :

A)  $\frac{\sqrt{2}}{4} (1 + \sqrt{3} + i\sqrt{3} - i)$

B)  $\frac{\sqrt{2}}{4} (1 - \sqrt{3} + i\sqrt{3} - i)$

C)  $\frac{\sqrt{2}}{4} (1 + i)$

D)  $\frac{\sqrt{2}}{4} (1 - i)$

**Q18.** Le module de Z est :

A) 4

B) 2

C) 3

D) 1

**Q19.** L'argument de Z est :

A)  $\frac{\pi}{12} [2\pi]$

B)  $\frac{\pi}{3} [2\pi]$

C)  $\frac{\pi}{6} [2\pi]$

D)  $\frac{\pi}{2} [2\pi]$

**Q20.** La forme algébrique de  $Z^{2017}$  est

A)  $\frac{\sqrt{2}}{4} (1 + \sqrt{3} + i\sqrt{3} - i)$

B)  $\frac{\sqrt{2}}{4} (-\sqrt{3} + i\sqrt{3})$

C)  $\frac{\sqrt{2}}{4} (1 + i)$

D)  $\frac{\sqrt{2}}{4} (1 - i)$





**Concours d'accès en 1<sup>ère</sup> année des ENSA Maroc**  
**Juillet 2017**

**Epreuve de Mathématiques**

**Durée : 1H30 min**

***Calculatrices, téléphones et tous types de documents non autorisés***

**Q1.**

$$\sqrt{9,8} \left( \frac{147}{375} \right)^{-\frac{4}{8}} =$$

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

**Q2.** On pose

$$X = \sqrt[3]{\sqrt{5} + 2} - \sqrt[3]{\sqrt{5} - 2}$$

En calculant  $X^3$ , montrer que  $X$  vaut:

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

**Q3.**

$$2 \operatorname{Arctan} \frac{1}{3} + \operatorname{Arctan} \frac{1}{7} =$$

A)  $\frac{\pi}{2}$

B)  $\frac{\pi}{3}$

C)  $\frac{\pi}{4}$

D)  $\frac{\pi}{6}$

**Q4.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n - (-1)^n}{n + (-1)^n} =$$

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

**Q5.**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{-x} + x^2}{x - \ln x} =$$

A) 0

B) 1

C)  $+\infty$

D)  $-\infty$

**Concours d'accès en 1<sup>ère</sup> année des ENSA Maroc    Juillet 2017**  
**Epreuve de Physique Chimie**  
**Durée : 1 heure 30 minutes**

**Exercice 1 :** Un laboratoire de recherche nucléaire reçoit un échantillon d'un composé radioactif strontium 90  $^{90}_{38}\text{Sr}$ . La masse de cet échantillon au moment de la réception est  $m_0 = 1 \text{ g}$ .


Données : la demi-vie du composé radioactif  $^{90}_{38}\text{Sr}$  est de 28 ans ;  $\ln(2) = 0,7$  ;  $\ln(3) = 1,1$  ;  $\ln(5) = 1,6$  ;  $\ln(10) = 2,3$  ;  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

**Q21 :** Le temps  $t_d$  écoulé pour que 99,9 % de la masse  $m_0$  strontium 90 ait disparue est plus proche de :  
Cocher la bonne réponse A) 265 ans ; B) 270 ans ; C) 275 ans ; D) 280 ans

**Q22 :** L'activité initiale  $a_0$  de l'échantillon strontium 90 au moment de la réception est plus proche de :  
Cocher la bonne réponse A)  $10^4 \text{ GBq}$  ; B)  $10^6 \text{ GBq}$  ; C)  $10^3 \text{ GBq}$  ; D)  $10^5 \text{ GBq}$

**Q23 :** Le nombre de noyaux radioactifs  $N(t_d)$  dans l'échantillon de strontium 90 à l'instant  $t_d$  est plus proche de : Cocher la bonne réponse A)  $7 \cdot 10^{18}$  ; B)  $7 \cdot 10^{20}$  ; C)  $7 \cdot 10^{16}$  ; D)  $7 \cdot 10^{17}$

**Exercice 2 :** Dans une centrale nucléaire, on considère la réaction de fission de l'uranium 235 ( $^{235}_{92}\text{U}$ ) après collision avec un neutron thermique, qui produit du xénon 140 et du strontium 94. L'équation bilan de la réaction s'écrit comme suit :



L'énergie de liaison par nucléon des deux noyaux produits est de  $8,5 \text{ MeV}$ , et celle du noyau d'uranium 235 est de  $7,6 \text{ MeV}$ .

**Q24 :** L'énergie dégagée  $E_D$  par la réaction a une valeur plus proche de  
Cocher la bonne réponse


A)  $200 \text{ MeV}$  ; B)  $205 \text{ MeV}$  ; C)  $210 \text{ MeV}$  ; D)  $215 \text{ MeV}$

**Exercice 3 :** Un solide de centre masse  $G$  assimilé à un point matériel est en mouvement par rapport à un repère fixe supposé galiléen. La direction de sa vitesse est constante alors :

**Q25 :** Cocher la bonne réponse

- A) Le repère d'espace d'origine  $G$  est galiléen.
- B) L'accélération est centripète
- C) L'accélération tangentielle est non nulle.
- D) Le mouvement du centre de masse  $G$  du solide est uniformément varié.

**Exercice 4 :** La piste de lancement d'un projectile  $M$  comprend une partie rectiligne horizontale  $ABC$  et une portion circulaire  $CD$  centrée en  $O$ , de rayon  $a = 1 \text{ m}$ , d'angle au centre  $O$ ,  $\alpha = 60^\circ$  est telle que  $OC$  soit perpendiculaire à  $AC$ . On suppose qu'il n'y a pas de forces de frottement exercées par la piste sur le mobile tout le long du trajet parcouru par ce dernier.





Le projectile  $M$  assimilable à un point matériel de masse  $m=0.5\text{ g}$ , est lancé à partir du point  $A$  sans vitesse initiale suivant  $AB$  de longueur  $1\text{ m}$  avec une force constante  $\vec{F}$ , horizontale et ne s'exerçant qu'entre  $A$  et  $B$ .

On donne  $g=10\text{ m.s}^{-2}$  et on suppose que l'origine de l'énergie potentielle du mobile  $M$  est le niveau horizontal de la piste.

**Q26 :** Déterminer l'intensité minimale à donner à  $\vec{F}$  pour que le projectile  $M$  s'arrête sur la piste en  $D$ .

Cocher la bonne réponse

- A)  $2,5\text{ N}$  ; B)  $4,5\text{ N}$  ; C)  $5\text{ N}$  ; D)  $1,25\text{ N}$

**Q27 :** L'intensité de la force  $\vec{F}$  est égale maintenant à  $150\text{ N}$ . La valeur numérique de la vitesse  $V_D$  avec laquelle le projectile  $M$  quitte la piste en  $D$  est plus proche de :

Cocher la bonne réponse


- A)  $10\text{ m.s}^{-1}$  ; B)  $15\text{ m.s}^{-1}$  ; C)  $20\text{ m.s}^{-1}$  ; D)  $25\text{ m.s}^{-1}$

**Q28 :** L'énergie mécanique  $E_m$  du projectile en  $D$  vaut :

Cocher la bonne réponse

- A)  $100\text{ Joules}$  ; B)  $150\text{ Joules}$  ; C)  $200\text{ Joules}$  ; D)  $50\text{ Joules}$

**Exercice 5 :** On étudie le centre d'inertie du ballon au volley-ball. La résistance de l'air est négligée. Le joueur frappe le ballon situé en  $A$  et lui communique une vitesse  $V_0=10\text{ m.s}^{-1}$  et faisant un angle  $\alpha$  avec l'horizontale. Le point  $A$  est à une hauteur  $H=2.80\text{ m}$  du sol ; le filet à  $h=2.50\text{ m}$  ; la masse du ballon  $m=280\text{ g}$  et le rayon du ballon  $a=10\text{ cm}$ . On donne  $g=10\text{ m.s}^{-2}$



**Q29 :** Le centre d'inertie de la balle passera juste au-dessus du filet situé à  $D=10\text{ m}$  du point de lancement lorsque l'angle  $\alpha$  est tel que sa tangente est :

Cocher la bonne réponse

- A)  $\tan(\alpha) < 0,5$  ; B)  $0,5 \leq \tan(\alpha) \leq 1,1$  ; C)  $0,7 < \tan(\alpha) < 1,3$  ; D)  $\tan(\alpha) \geq 1,3$

**Q30 :** La valeur de l'angle  $\alpha$  vaut maintenant  $\alpha=45^\circ$ . Le service dans ce cas est réussi, c'est-à-dire que le centre d'inertie de la balle passe au dessus du filet d'une hauteur  $h'$  et touche le sol dans le camp adverse entre le filet et la ligne située à  $9\text{ m}$  du filet. La hauteur  $h'$  au bout de laquelle la balle atteindra le filet a une valeur égale à :

Cocher la bonne réponse


- A)  $h' = 5\text{ cm}$  ; B)  $h' = 10\text{ cm}$  ; C)  $h' = 20\text{ cm}$  ; D)  $h' = 30\text{ cm}$  ;

**Q31 :** La valeur de l'angle  $\alpha$  vaut toujours  $\alpha=45^\circ$ . Le joueur adverse situé à  $2\text{ m}$  du filet veut intercepter le ballon. Le temps  $t_2$  de la réception du ballon à partir de son point de lancement et la hauteur  $h_2$  où il doit situer sa main dans le plan de la trajectoire du ballon sont plus proches des valeurs :

Cocher la bonne réponse

- A)  $h_2 = 20\text{ cm}$  et  $t_2 = 0,84\text{ s}$  ; B)  $h_2 = 80\text{ cm}$  et  $t_2 = 1,68\text{ s}$  ;  
C)  $h_2 = 40\text{ cm}$  et  $t_2 = 1,68\text{ s}$  ; D)  $h_2 = 40\text{ cm}$  et  $t_2 = 0,84\text{ s}$

**Exercice 6 :** La différence de potentiel aux bornes d'un condensateur (A,B) de capacité  $C=0,1 \mu F$  est  $U_{AB}=120 V$ . A la date  $t=0$  ce condensateur est branché aux bornes de (M, N) d'une bobine de résistance négligeable et d'inductance  $L=1 H$ . L'intensité du courant est nulle à cette date. On prendra  $\pi^2 \approx 10$



**Q32 :** La période  $T_0$  et la fréquence propre  $f_0$  de ce circuit oscillant sont proches de :

Cocher la bonne réponse

- A)  $T_0=2,04 ms$  et  $f_0=490 Hz$  ; B)  $T_0=2,00 ms$  et  $f_0=500 Hz$  ;  
C)  $T_0=1,92 ms$  et  $f_0=520 Hz$  ; D)  $T_0=2,25 ms$  et  $f_0=400 Hz$

Les variations dans le temps de la charge du condensateur et de l'intensité du courant sont données par les expressions suivantes :  $Q(t)=Q_m \cos(2\pi f_0 t + \varphi_1)$  et  $I(t)=I_m \cos(2\pi f_0 t + \varphi_2)$

Où  $Q_m$ ,  $I_m$ ,  $\varphi_1$  et  $\varphi_2$  sont déterminées par les conditions initiales.

**Q33 :** Les valeurs  $Q_m$  et  $I_m$  sont avoisinantes de :

Cocher la bonne réponse

- A)  $Q_m=15 \mu F$  et  $I_m=19 mA$  ; B)  $Q_m=24 \mu F$  et  $I_m=38 mA$  ;  
C)  $Q_m=12 \mu F$  et  $I_m=76 mA$  ; D)  $Q_m=12 \mu F$  et  $I_m=38 mA$

**Q34 :** La charge prise par le condensateur à la date  $t_1=0,5 ms$  ainsi que la valeur correspondante de l'intensité du courant sont données par :

Cocher la bonne réponse

- A)  $Q(t_1)=\frac{Q_m}{2}$  et  $I(t_1)=\frac{I_m}{2}$  ; B)  $Q(t_1)=-\frac{Q_m}{2}$  et  $I(t_1)=-\frac{I_m}{2}$   
C)  $Q(t_1)=0$  et  $I(t_1)=+I_m$  ; D)  $Q(t_1)=0$  et  $I(t_1)=-I_m$

**Exercice 7 :** Sur un conduit en fonte contenant de l'eau, on place un capteur de pression. Un coup est donné sur le conduit, à une distance  $d$  du capteur. On détecte deux signaux, séparés par un intervalle de temps  $\Delta t=0,70 s$ .

**Q35 :** La distance  $d$  du conduit au capteur vaut :


Cocher la bonne réponse

- A) 550 m ; B) 750 m ; C) 1500 m ; D) 3000 m

Données : la célérité du son dans l'eau vaut  $v_{eau}=1500 m.s^{-1}$

la célérité du son dans la fonte vaut  $v_{fonte}=5000 m.s^{-1}$

**Exercice 8 :** Dans une solution (S) de sulfate de plomb ( $Pb^{2+} + SO_4^{2-}$ ) de concentration  $C=0.1 mol.L^{-1}$ , on introduit de la poudre d'étain Sn en excès. On donne dans les conditions de l'expérience la constante de l'équilibre  $K$  de cette réaction ci-dessous :




**Q36 :** Lorsque l'équilibre de la réaction est atteint, la concentration finale de chaque espèce dissoute dans la solution S a pour valeur :

Cocher la bonne réponse

- A)  $[Sn^{2+}]=70.10^{-2} mol.L^{-1}$  et  $[Pb^{2+}]=30.10^{-2} mol.L^{-1}$  ;  
B)  $[Sn^{2+}]=60.10^{-2} mol.L^{-1}$  et  $[Pb^{2+}]=40.10^{-2} mol.L^{-1}$  ;  
C)  $[Sn^{2+}]=70.10^{-3} mol.L^{-1}$  et  $[Pb^{2+}]=30.10^{-3} mol.L^{-1}$  ;  
D)  $[Sn^{2+}]=50.10^{-3} mol.L^{-1}$  et  $[Pb^{2+}]=50.10^{-3} mol.L^{-1}$



**Exercice 9 :** On considère la pile plomb-zinc qui débite dans le sens spontané:



Chaque électrode a une masse  $m=100\text{ g}$ . Les solutions de chaque demi-pile ont une concentration en cations métalliques  $C = 0.2\text{ mol.L}^{-1}$  et un volume  $V = 200\text{ mL}$ . Pendant combien de temps la pile peut-elle débiter un courant électrique d'intensité constante de valeur  $I = 0.8\text{ A}$ ?

Données :


$1\text{ F} = 96500\text{ C.mol}^{-1}$ ; (Un Faraday =  $1\text{ F}$  équivaut à  $96500$  coulombs/moles d'électrons), masse molaire atomique respective du plomb et du zinc est  $M_{\text{Pb}} = 207\text{ g.mol}^{-1}$  et  $M_{\text{Zn}} = 65.4\text{ g.mol}^{-1}$

**Q37 :** La pile peut débiter ce courant pendant environ:

Cocher la bonne réponse.

- A)  $2,65\text{ h}$  ; B)  $2,70\text{ h}$  ; C)  $2,75\text{ h}$  ; D)  $2,60\text{ h}$

**Exercice 10 :** La production industrielle de l'aluminium s'effectue par électrolyse à partir d'oxyde d'aluminium extrait de la bauxite (roche sédimentaire initialement trouvée en France), selon l'équation bilan:




**Q38 :** Quelle masse d'aluminium obtient-on si un courant d'intensité  $I = 700\text{ A}$  traverse le bac à électrolyse pendant  $t = 70\text{ h}$ ?

Données: masse molaire de l'aluminium  $M_{\text{Al}} = 27\text{ g.mol}^{-1}$ ;  $1\text{ F} = 96500\text{ C.mol}^{-1}$

Cocher la bonne réponse

- A)  $m = 12\text{ Kg}$  ; B)  $m = 16\text{ Kg}$  ; C)  $m = 20\text{ Kg}$  ; D)  $m = 24\text{ Kg}$

**Exercice 11 :**  $20\text{ mL}$  d'une solution d'acide chlorhydrique sont mis en présence de  $0,1\text{ g}$  de zinc. On recueille, en fin de réaction  $11,4\text{ cm}^3$  de dihydrogène gazeux, mesurés dans les conditions normales de température et de pression (C.N.T.P), puis on sépare le zinc restant dans la solution. Sachant que l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction est donnée par :



Données: Le volume molaire des gaz dans les C.N.T.P. vaut  $V_m = 22,4\text{ L.mol}^{-1}$ ;  $M_{\text{Zn}} = 65,4\text{ g.mol}^{-1}$

**Q39 :** la masse du zinc restant est proche de :

Cocher la bonne réponse.

- A)  $55\text{ mg}$  ; B)  $60\text{ mg}$  ; C)  $65\text{ mg}$  ; D)  $70\text{ mg}$

**Exercice 12 :** L'eau de javel est fabriquée en solution aqueuse selon la réaction d'équation bilan:



Le degré chlorométrique ( $^{\circ}\text{Chl}$ ) d'une eau de javel est le volume de dichlore gazeux (dans les C.N.T.P. , le volume molaire des gaz vaut  $V_m = 22,4\text{ L.mol}^{-1}$ ) qui a été utilisé pour en préparer un litre, ou encore le degré chlorométrique ( $^{\circ}\text{Chl}$ ) est le volume de dichlore introduit dans un litre de l'eau de javel.

**Q40 :** En calculant d'abord le volume du dichlore qui a été nécessaire pour préparer un berlingot de  $250\text{ mL}$  d'eau de javel à  $48^{\circ}\text{Chl}$ , déterminer les concentrations en ions hypochlorite  $\text{ClO}^{-}$  et en ions chlorure  $\text{Cl}^{-}$  de cet eau de javel préparée. Elles sont plus proches de la valeur:

Cocher la bonne réponse.

- A)  $2,05\text{ mol.L}^{-1}$  ; B)  $2,15\text{ mol.L}^{-1}$  ; C)  $2,25\text{ mol.L}^{-1}$  ; D)  $1,95\text{ mol.L}^{-1}$  ;