§7 НАУКА И МИР

АСТЕРОИДНЫЕ ВОЙНЫ

Совсем недавно астероид размером с футбольное поле на скорости 10 км/с промчался всего в 75 тыс. км от Земли. Космическая скала летела со стороны Солнца, и её заметили, когда она уже удалялась. Если бы астероид встретился с нашей планетой, то облака пыли надолго закрыли бы Солнце, что привело бы к изменению климата на нашей планете. Так огромное космическое тело примерно 65 млн. лет назад прервало эру динозавров.

Глобальные потопы, нарушение баланса Земли, смещение континентов, появление морей и гор ученые связывают с падением астероидов.

Земле достаточно много следов, оставшихся падения крупных метеоритов. Эти кратеры достигают сотен км. диаметре. Они Сибири, В Канаде, полуострове Юкатан. Вероятность неожиданного очередного падения достаточно высока. И считается, что нет средств защиты от таких космических бомб.

Только Россия и США имеют службы контроля околоземного космического

пространства, которые ведут поиск космических объектов, собирают о них информацию и определяют орбиты. Объекты заносятся каталоги, информация них обновляется. Так обеспечивается оповещение высших управления страной космической обстановке.

Наблюдение высокоорбитальными космическими объектами ведут пассивные средства, работающие в оптическом диапазоне длинных волн. Особое внимание военных ведомств привлекают высокие орбиты, первую очередь, геостационарные. Именно на них размещено большое

количество систем связи. навигации. разведки, предупреждения ракетном нападении и других. Национальными службами проверяется соблюдение международных договоров ინ использовании космического пространства.



птикоэлектронные средства могут использоваться в Международной системе защиты Земли, создание которой предполагается под эгидой ООН. Известно, что в околосолнечном пространстве по различным орбитам движется множество небесных тел. Под действием гравитационных полей Солнца и крупных планет параметры их орбит постоянно меняются. По оценкам Международного института проблем астероидной опасности, столкновение с Землей тела размером 50 метров происходит в среднем раз в столетие.