Задача № 3

<u>Условие</u>: Подъемник поднимается и опускается в шахте, глубина которой l=400 м, за $t_0=40$ с. Сначала он разгоняется с постоянным ускорением, а затем с тем же по модулю ускорением замедляется. На сколько отстанут за сутки маятниковые часы подъемника по сравнению с неподвижными часами? Подъемник находится в движении в течение T=5,0 ч ежедневно.

<u>Решение</u>: Рассмотрим движение подъемника в шахте. Считаем, что в течение одного цикла разгона-остановки он движется ускоренно ровно половину пути (соответственно, половину времени), а остальную половину движется замедленно. Найдем его ускорение a при таком движении. Подъемник проходит путь l/2 за время $t_0/2$, при этом его начальная или конечная скорость равна нулю. По формуле равноускоренного движения

$$\frac{l}{2} = \frac{a\left(\frac{t_0}{2}\right)^2}{2},$$

откуда

$$a = \frac{4l}{t_0^2}.$$

Согласно условию, часы представляют собой маятник, по количеству колебаний которого определяют время. Его отставание от правильного времени вызвано уменьшением количества колебаний, что в свою очередь является следствием неинерциальности системы отсчета, связанной с часами. В нормальном состоянии (без перегрузок) период колебаний маятника $T_0 = 2\pi \sqrt{l/g}$. За один цикл разгона-остановки длительностью t_0 он должен совершить $n_0 = t_0/T_0$ колебаний, чтобы показывать правильное время. Для простоты будем считать, что $t_0 \gg T_0$, так что погрешностью округления n_0 можно пренебречь.

Найдем, какое количество колебаний совершит маятник в действительности. Перейдем в систему отсчета, связанную с лифтом. В этой системе отсчета в течение половины времени эффективное ускорение $g_1 = g + a$, а в течение второй половины $g_2 = g - a$. Соответственно, периоды колебаний маятника часов в этих двух случаях равны соответственно

$$T_1 = 2\pi \sqrt{rac{l}{g+a}} = T_0 \left(1+rac{a}{g}
ight)^{-1/2}$$
 of $T_2 = 2\pi \sqrt{rac{l}{g-a}} = T_0 \left(1-rac{a}{g}
ight)^{-1/2}$.

По прежнему считаем, что $t_0 \gg T_1, T_2$; так что погрешностью округления можно пренебречь. Тогда количество колебаний, совершенных маятником за эти промежутки времени, равны соответственно:

$$n_1 = \frac{t_0}{2T_1} = \frac{n_0}{2}\sqrt{1 + \frac{a}{g}}$$
 и $n_2 = \frac{t_0}{2T_2} = \frac{n_0}{2}\sqrt{1 - \frac{a}{g}}$.

Найдем отставание ΔT часов за один день. Относительное отставание (отношение абсолютного отставания к правильно измеренному промежутку времени) равно

$$\eta = \frac{n_0 - n_1 - n_2}{n_0} = 1 - \frac{1}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{a}{g}} + \sqrt{1 - \frac{a}{g}} \right).$$

Тогда отставание часов в течение одного дня

$$\Delta T = \eta T = T \left(1 - \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{4l}{gt_0^2}} + \sqrt{1 - \frac{4l}{gt_0^2}} \right] \right).$$

Проверим размерность:

$$c = c \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{M}{\frac{M}{c^2} \cdot c^2}} + \sqrt{1 - \frac{M}{\frac{M}{c^2} \cdot c^2}} \right] \right) = c.$$

Найдем численное значение:

$$\{\Delta T\} = 5 \cdot 3600 \left(1 - \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{4 \cdot 400}{9.8 \cdot 40^2}} + \sqrt{1 + \frac{4 \cdot 400}{9.8 \cdot 40^2}} \right] \right) = 23.5; \quad \Delta T = 23.5 \text{ c.}$$

Ответ:
$$\Delta T = T \left(1 - \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{4l}{gt_0^2}} + \sqrt{1 - \frac{4l}{gt_0^2}} \right] \right) = 23,5 \text{ c.}$$