


BF18.17

April 9, 2021

1 Mekanik II, problem 18.17


The moment of inertia of the pulley is 0.54 kgm^2 . The coefficient of kinetic friction between the 22.2 N weight and the horizontal surface is $\mu_k = 0.2$. Determine the magnitude of the acceleration of the 22.2 N weight in each case.




2 Lösning:

2.1 Friläggning och krafter


För att lösa de två fallen behöver vi frilägga systemen. Först inför vi följande beteckningar för (a)-uppgiften



samt för (b)-uppgiften.



Därefter kan vi frilägga de individuella delsystemen enligt nedan.




Den glidande massan m
där

$$\mathbf{f} = -f\hat{x} = \mu_k N\hat{x} \quad (1)$$

$$\mathbf{T}_1 = T_1\hat{x} \quad (2)$$

$$\mathbf{N} = N\hat{y} \quad (3)$$

$$m\mathbf{g} = -mg\hat{y} \quad (4)$$



Den roterande trissan s


där

$$\mathbf{T}_1 = -T_1 \hat{x} \quad (5)$$

$$\mathbf{N}_s = N_s \hat{y} \quad (6)$$

$$m_s \mathbf{g} = -m_s g \hat{y} \quad (7)$$

$$\mathbf{T}_2 = T_2 \hat{y} \quad (8)$$



Den fallande massan M

där

$$\mathbf{T}_2 = T_2 \hat{y} \quad (9)$$

$$M\mathbf{g} = -Mg\hat{y} \quad (10)$$

I samtliga figurer antar vi ett koordinatsystem med x -axeln åt höger och y uppåt.

2.2 Fysikaliska samband

Med alla delsystem frilagda kan vi ställa upp Euler I och Euler II där det är relevant. Här kan antas att massan m rör sig i x -led men inte roterar och trissan s roterar men att dess masscentrum inte accelererar. I uppgift (b) kan massan M röra sig i y -led.

Kopplingen mellan rörelsekvationerna för de individuella systemen görs sedan genom snörkrafterna där det för ett masslöst snöre gäller att snörkraften är lika stor i båda riktningar. Därför använder vi T_1 i friläggningarna för både massan m och trissan.

Utöver Euler I och Euler II har vi även kinematiska tvångsvillkor där $a_m = a_M$ och $a_m = -\alpha r$ eftersom snöret inte är töjbart. Minustecknet i rullvillkoret kommer från att vi antar $\mathbf{a}_m = a_m \hat{x}$ och $\alpha = \alpha \hat{z}$.

2.3 Kraft- och momentanalys: Euler I och II

Massan m Euler I för massan m : $\sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{T}_1 + m\mathbf{g} + \mathbf{N} + \mathbf{f} = m\mathbf{a}$

Komposantuppdelning i \hat{x} - och \hat{y} -led av verkande krafter gör att vi kan formulera Euler I i vardera riktning.

$$\hat{x}: T_1 - f = T_1 - \mu N = ma_m \text{ (I)}$$

$$\hat{y}: N - mg = 0 \text{ (II)}$$

Trissan Euler II för trissan: $\sum_i \mathbf{M}_i^P = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = I\alpha$. Ett bra val av momentpunkt är här trissans upphängningspunkt för då ger inte \mathbf{N}_s och $m_s \mathbf{g}$ upphov till några kraftmoment. Då kan vi skriva

$$\sum_i \mathbf{M} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{T}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{T}_2$$

Vektorerna \mathbf{r}_1 och \mathbf{r}_2 kan från figurerna ovan bestämmas till

$$\mathbf{r}_1 = r\hat{y}$$

$$\mathbf{r}_2 = r\hat{x}$$

så att alla kraftmoment ligger i z-riktningen:

$$\sum_i \mathbf{M} = r\hat{y} \times (-T_1\hat{x}) + r\hat{x} \times (-T_2\hat{y}) = T_1r - T_2r = I\alpha \text{ (III)}$$

Massan M Euler I för massan M: $\sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{T}_2 + M\mathbf{g}$

Komposantuppdelning i \hat{x} - och \hat{y} -led av verkande krafter gör att vi kan formulera Euler I i vardera riktning.

$$\hat{y}: T_2 - Mg = Ma_M \text{ (IV)}$$

2.4 Ekvationslösning för uppgift (a)

Från (II) fås att $N = mg$ vilket ger att $f = \mu_k N = \mu_k mg$ vilket insatt i (I) ger

$$T_1 - \mu_k mg = ma_m$$

Här kan T_1 lösas ut. För uppgift (a) är $T_2 = F$ vilket gör att vi kan skriva (III) som

$$I\alpha = (ma_m + \mu_k mg)r - Fr \text{ (V)}$$

där vi sedan kan sätta in rullvillkoret $-m_a = r\alpha$ så att

$$-I \frac{a_m}{r} = (ma_m + \mu_k mg)r - Fr \tag{11}$$

$$-I \frac{a_m}{r} = (ma_m + \mu_k mg)r - Fr \tag{12}$$

$$-I \frac{a_m}{r^2} = ma_m + \mu_k mg - F \tag{13}$$

$$ma_m + I \frac{a_m}{r^2} = F - \mu_k mg \tag{14}$$

$$a_m \left(m + \frac{I}{r^2} \right) = F - \mu_k mg \tag{15}$$

$$a_m = \frac{F - \mu_k mg}{m + \frac{I}{r^2}} \tag{16}$$

vilket ger svaret i (a).

2.5 Ekvationslösning för uppgift (b)

Uppgift (b) kan lösas på ett liknande sätt förutom att här är snörkraften T_2 inte F som i uppgift (a), utan T_2 måste beräknas från Euler I för massan M .

Från (IV) fås att $T_2 = Mg - Ma_M$ vilket kan sättas in istället för F i (V) så att

$$I\alpha = (ma_m + \mu_k mg)r - (Mg - Ma_M)r \quad \text{(VI)}$$

där vi sedan kan sätta in rullvillkoret $-a = r\alpha$ och dessutom införa $a = a_m = a_M$ så att

$$-I\frac{a}{r} = (ma + \mu_k mg)r - (Mg - Ma)r \quad (17)$$

$$-I\frac{a}{r} = (ma + \mu_k mg)r - (Mg - Ma)r \quad (18)$$

$$-I\frac{a}{r^2} = ma + \mu_k mg - (Mg - Ma) \quad (19)$$

$$ma + Ma + I\frac{a}{r^2} = Mg - \mu_k mg \quad (20)$$

$$a(m + M + \frac{I}{r^2}) = Mg - \mu_k mg \quad (21)$$

$$a = \frac{Mg - \mu_k mg}{m + M + \frac{I}{r^2}} \quad (22)$$

vilket ger svaret i (b).

2.6 Svar

Med insatta värden blir $a_m = a = 0.1748 \text{ m/s}^2$ för uppgift (a) och $a_m = a = 0.1688 \text{ m/s}^2$ för uppgift (b).

2.7 Analys

Trots att uppgifterna ser snarlika ut blir accelerationen i (b) lägre. Det beror på att den ändliga massan M i (b) gör att snörkraften T_2 blir mindre än i (a). Det kan ses som att utöver att få trissan att snurra så behöver kraften på 8.9 N accelerera både M och m i (b) men bara m i (a).

Notera också att $T_1 \neq T_2$ här. Det kan vara ovant från tidigare kurser där snörkraften typiskt är konstant över hela snörets längd. Men det beror ju på att snöret då anses masslöst. Här, och i liknande trissa-uppgifter har vi dock en ändlig tröghetstensor I för trissan så även om snöret är fortsatt masslöst visar Euler II att snörkrafterna är olika stora.

Beräkning med insatta värden:

```
[8]: from ipywidgets import interact, interactive
      from ipywidgets import FloatSlider
      import numpy as np
      from IPython.display import HTML
```

```
[9]: HTML('''<script>
      code_show=true;
      function code_toggle() {
```

```

if (code_show){
$('div.input').hide();
} else {
$('div.input').show();
}
code_show = !code_show
}
$( document ).ready(code_toggle);
</script>
<form action="javascript:code_toggle()"><input type="submit" value="Tryck här_
→för att dölja/visa koden."></form>''')

```

[9]: <IPython.core.display.HTML object>

[10]: *# Set parameters according to exercise description*

```

G = 9.81 # acceleration due to gravity, in m/s^2

mu = 0.22
mg=22.2
I=0.54
r=0.1524
F=8.9

```

[11]: `def e_18_17a(F,mu,mg,I):`

```

    m=mg/G
    m2=F/G
    a_a=max(0.0, (F-mu*mg)/(m+I/r**2))

    print("Accelerationen a i uppgift (a)= ", '{:5.3f}'.format(a_a), "m/s^2")

    return a_a

```

[12]: `def e_18_17b(mu,mg,Mg,I):`

```

    m=mg/G
    m2=Mg/G
    a_b=max(0.0, (F-mu*mg)/(m+m2+I/r**2))

    print("Accelerationen a i uppgift (b)= ", '{:5.3f}'.format(a_b), "m/s^2")

    return a_b

```

```
[13]: s_18_17a=interactive(e_18_17a,
    F=FloatSlider(min=0.0,max=20,value=8.9),
    mu=FloatSlider(min=0.0,max=0.40,value=0.22,step=0.01),
    mg=FloatSlider(min=0.0,max=40.0,value=22.2,step=0.01),
    I=FloatSlider(min=0.0,max=1.0,value=0.54,step=0.01),)
display(s_18_17a)

interactive(children=(FloatSlider(value=8.9, description='F', max=20.0),
    ↳FloatSlider(value=0.22, description='...
```

```
[ ]: s_18_17b=interactive(e_18_17b,
    mu=FloatSlider(min=0.0,max=0.40,value=0.22,step=0.01),
    mg=FloatSlider(min=0.0,max=40.0,value=22.2,step=0.01),
    Mg=FloatSlider(min=0.0,max=20.0,value=8.9,step=0.01),
    I=FloatSlider(min=0.0,max=1.0,value=0.54,step=0.01),)
display(s_18_17b)
```

```
[ ]:
```