

Чек-лист: Когда стоит обратиться к логопеду

✦ Этот список не заменяет консультацию специалиста. Он создан для раннего выявления признаков и своевременной помощи.

👶 Возраст: 0-2 года

🔍 Обратите внимание, если:

- Ребёнок не гулит и не лепечет к 6-8 месяцам.
- В 1 год ребёнок не произносит хотя бы 3-5 простых слов.
- К 18 месяцам не использует жесты и звуки для общения.
- Не откликается на имя, не следует за взглядом взрослого.

🔬 Эксперимент Ю. Левиной (2021):

У 80% детей с отсутствием лепета к 10 месяцам позже наблюдалась ЗРР (задержка речевого развития).

😊 Возраст: 2-3 года

🔍 Проверьте, если:

- Речь состоит из отдельных слогов, а не слов.
- Ребёнок не строит двухсловные фразы («мама дай»).
- Невозможно понять даже 50% сказанного (даже родителям).
- Отсутствует подражание звукам, словам.

✦ Дополнительно:

- Невнимание к окружающим звукам.
- Склонность к «птичьему языку» (неразборчивые звуки вместо слов).
-

🧠 Возраст: 3-4 года

🔍 Тревожные признаки:

- Ребёнок не строит простые предложения.
- Постоянно заменяет или опускает звуки («кака» вместо «собака»).
- Низкий словарный запас (менее 300-400 слов).
- Не понимает простые инструкции («принеси мяч»).

📖 Советы логопеда:

Не ждите до школы. Чем раньше начата коррекция, тем выше результативность.

📅 Когда точно пора к логопеду:

- Если есть семейная история ЗРР/ЗПР.
- Если ребёнок часто злится из-за того, что его не понимают.
- Если вы сомневаетесь — лучше проверить.

☎ Что делать:

- 📍 Обратиться к логопеду на очную диагностику.
- 🧩 Провести логопедический скрининг (доступен онлайн и очно).
- 📖 Использовать игровые методики развития речи дома.

📖 Автор: Юлия Левина

Практикующий логопед-дефектолог, автор программы ранней диагностики «Говорю с 9 месяцев».



TIMMY

Listă de verificare: Când să consultați un logoped

✚ Această listă nu înlocuiește o consultație de specialitate. Este concepută pentru a identifica semnele din timp și a oferi asistență la timp.

👤 **Vârstă: 0-2 ani**

🔍 Acordați atenție dacă:

Copilul nu gânguriște sau nu bolborosește până la 6-8 luni.

La 1 an, copilul nu pronunță cel puțin 3-5 cuvinte simple.

Până la 18 luni, nu folosește gesturi și sunete pentru a comunica.

Nu răspunde la nume, nu urmează privirea unui adult.

🔬 Experiment realizat de Yu. Levina (2021):

80% dintre copiii care nu bolboroseau până la 10 luni au prezentat întârzieri de vorbire.

😊 **Vârstă: 2-3 ani**

🔍 Verificați dacă:

Vorbirea constă din silabe individuale, nu din cuvinte.

Copilul nu construiește fraze din două cuvinte („mama dă”).

Este imposibil să înțeleagă nici măcar 50% din ceea ce se spune (chiar și părinților).

Nu există imitații de sunete, cuvinte.

✚ Suplimentar:

Lipsa de atenție la sunetele din jur.

Tendință la „limbaj de pasăre” (sunete neinteligibile în loc de cuvinte).

🧠 **Vârstă: 3-4 ani**

🔍 Semne de avertizare:

Copilul nu construiește propoziții simple.

Înlocuiește sau omite constant sunete („caca” în loc de „câine”).

Vocabular redus (mai puțin de 300-400 de cuvinte).

Nu înțelege instrucțiuni simple („adu mingea”).

📖 Sfatul logopedului:

Nu așteptați până la școală. Cu cât se începe corecția mai devreme, cu atât eficacitatea este mai mare.

📅 Când anume este momentul să consultați un logoped:

Dacă există antecedente familiale de întârziere de vorbire/întârziere mentală.

Dacă copilul dumneavoastră se enervează adesea pentru că nu este înțeles.

Dacă aveți îndoieli, este mai bine să verificați.

☎ Ce trebuie făcut:

📍 Contactați un logoped pentru un diagnostic personal.

🧩 Efectuați o sesiune de screening logopedic (disponibilă online și față în față).

📖 Folosiți metode de joc pentru dezvoltarea vorbirii acasă.



TIMMY