

MATHÉMATIQUES • TLE E

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON 03

ÉTUDE DE FONCTIONS
NUMÉRIQUES D'UNE VARIABLE
RÉELLE

DURÉE CONSEILLÉE : 14 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon achève l'étude des fonctions numériques d'une variable réelle : théorème des valeurs intermédiaires, fonctions réciproques, racines n -ièmes, inégalité des accroissements finis et étude des branches infinies. Elle fournit tous les outils pour mener une étude complète de fonction et tracer sa courbe, compétence centrale de l'épreuve de mathématiques au Baccalauréat.

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer l'existence et l'unicité d'une solution de l'équation $f(x) = c$ grâce au théorème des valeurs intermédiaires
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'une fonction est bijective, définir sa fonction réciproque et calculer la dérivée de celle-ci
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre l'équation $x^n = a$ et simplifier des expressions avec des puissances rationnelles
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser l'inégalité des accroissements finis pour encadrer $f(b) - f(a)$ ou approcher une valeur
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les branches infinies d'une fonction et les équations de ses asymptotes (verticales, horizontales, obliques)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Image d'un intervalle par une fonction continue et théorème des valeurs intermédiaires
2. Fonction réciproque d'une bijection
3. Racines n -ièmes et puissances rationnelles
4. Inégalité des accroissements finis
5. Limites usuelles et branches infinies
6. Étude complète de fonctions et tracé de courbes
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer l'existence et l'unicité d'une solution de l'équation $f(x) = c$ grâce au théorème des valeurs intermédiaires
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'une fonction est bijective, définir sa fonction réciproque et calculer la dérivée de celle-ci
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre l'équation $x^n = a$ et simplifier des expressions avec des puissances rationnelles
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser l'inégalité des accroissements finis pour encadrer $f(b) - f(a)$ ou approcher une valeur
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les branches infinies d'une fonction et les équations de ses asymptotes (verticales, horizontales, obliques)
- À la fin de cette leçon, je sais mener l'étude complète d'une fonction rationnelle, irrationnelle ou trigonométrique et tracer sa courbe représentative
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la symétrie des courbes de f et de sa réciproque par rapport à la droite $y = x$

PRÉREQUIS

- Notion de continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle (Première)

- Dérivation : dérivées usuelles, sens de variation et signe de la dérivée (Première)
- Calcul de limites : opérations, formes indéterminées, croissances comparées (début de Terminale)
- Fonctions trigonométriques : valeurs remarquables, dérivées de sin, cos, tan (Première/Terminale)
- Équations de droites et lecture graphique d'une courbe représentative

1 IMAGE D'UN INTERVALLE PAR UNE FONCTION CONTINUE ET THÉORÈME DES VALEURS INTERMÉDIAIRES

Situation d'accroche. À Douala, un opérateur de téléphonie mobile suit l'évolution de son parc d'abonnés. Le nombre d'abonnés, exprimé en milliers, est modélisé par

$$f(t) = t^3 - 3t + 5,$$

où t désigne le temps écoulé en mois depuis le lancement d'une offre. Deux questions se posent à lui. D'abord : à quel moment le nombre d'abonnés atteindra-t-il exactement 4000, c'est-à-dire $f(t) = 4$? Ensuite : pourra-t-il « remonter le temps », c'est-à-dire, connaissant le nombre d'abonnés, retrouver le mois correspondant ? Par ailleurs, un ingénieur de la SONAREL doit estimer $\sqrt[3]{10}$ pour dimensionner une cuve, sans calculatrice : comment prouver que ce nombre existe et comment l'encadrer ?

Problématique. Comment garantir l'existence et l'unicité de la solution d'une équation du type $f(x) = c$? Comment localiser cette solution avec une précision donnée ? Les réponses reposent sur une propriété fondamentale des fonctions continues : le **théorème des valeurs intermédiaires**.

1.1 Rappel : continuité sur un intervalle

DÉFINITION Continuité sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- f est **continue en un point** a de I si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- f est **continue sur** I si elle est continue en tout point de I .

Graphiquement, une fonction continue sur I est une fonction dont la courbe se trace « sans lever le crayon » sur I : il n'y a ni saut, ni trou, ni rupture.

À RETENIR Fonctions continues de référence

Sont continues sur tout intervalle de leur ensemble de définition : les fonctions **polynômes** (sur $\mathbb{R}$), les fonctions **rationnelles** (sur tout intervalle ne contenant pas de pôle), les fonctions $\sin$ et $\cos$ (sur $\mathbb{R}$), la fonction $\sqrt{x}$ (sur $[0 ; +\infty[$), ainsi que toute somme, produit, quotient (là où le dénominateur ne s'annule pas) et composée de fonctions continues.

EXEMPLE Contre-exemple : la fonction partie entière

La fonction **partie entière** E , qui à tout réel x associe le plus grand entier inférieur ou égal

à x , est discontinue en tout point entier. Par exemple :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} E(x) = 1 \quad \text{et} \quad E(2) = 2.$$

Sa courbe présente des « marches d'escalier » : elle saute de 1 à 2 en $x = 2$. C'est le prototype de fonction à laquelle le théorème des valeurs intermédiaires ne s'applique pas.

1.2 Image d'un intervalle par une fonction continue

DÉFINITION Image d'un intervalle par une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . L'**image de I par f** , notée $f(I)$, est l'ensemble de toutes les valeurs prises par f quand x décrit I :

$$f(I) = \{ f(x) ; x \in I \}.$$

PROPRIÉTÉ Image d'un intervalle par une fonction continue (admis)

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Ce théorème, que nous admettons, dit une chose très intuitive : si la courbe se trace sans lever le crayon, alors f ne peut pas « sauter » des valeurs ; elle atteint toutes les valeurs intermédiaires, donc l'ensemble des valeurs prises ne comporte aucun trou.

PROPRIÉTÉ Image d'un segment (admis)

Soit f une fonction continue sur un segment $[a ; b]$ (intervalle fermé et borné). Alors :

- f est **bornée** sur $[a ; b]$ et **atteint ses bornes** : il existe x_m et x_M dans $[a ; b]$ tels que

$$m = f(x_m) = \min_{[a;b]} f \quad \text{et} \quad M = f(x_M) = \max_{[a;b]} f ;$$

- l'image du segment est le segment $f([a ; b]) = [m ; M]$.

ATTENTION Un intervalle ouvert n'a pas toujours pour image un intervalle fermé

Le résultat $f([a ; b]) = [m ; M]$ est propre aux segments. Par exemple, $f(x) = \frac{1}{x}$ est conti-

nue sur $I =]0; 1]$, mais $f(I) = [1; +\infty[$, qui n'est pas borné. De même, l'image de $]0; +\infty[$ par $x \mapsto \frac{1}{x}$ est $]0; +\infty[$: les bornes ouvertes se traduisent par des limites, non par des valeurs atteintes.

Lorsque f est **continue et strictement monotone**, on détermine l'image d'un intervalle en lisant le tableau de variations, selon le tableau récapitulatif suivant (on note $\ell = \lim_{a^+} f$, $L = \lim_{b^-} f$, et $\lambda = \lim_{+\infty} f$).

Intervalle I	f strictement croissante	f strictement décroissante
$[a; b]$	$[f(a); f(b)]$	$[f(b); f(a)]$
$[a; b[$	$[f(a); L[$	$]L; f(a)]$
$]a; b]$	$] \ell; f(b)]$	$[f(b); \ell[$
$[a; +\infty[$	$[f(a); \lambda[$	$] \lambda; f(a)]$
$\mathbb{R}$	$] \lim_{-\infty} f; \lim_{+\infty} f[$	$] \lim_{+\infty} f; \lim_{-\infty} f[$

EXEMPLE Lecture d'images d'intervalles

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 5$. On a $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, donc f est strictement croissante sur $[1; +\infty[$, avec $f(1) = 3$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$. Ainsi :

$$f([1; +\infty[) = [3; +\infty[.$$


Sur le segment $[0; 1]$, f est strictement décroissante, donc $f([0; 1]) = [f(1); f(0)] = [3; 5]$.

1.3 Théorème des valeurs intermédiaires

Voici le théorème central de cette section. L'intuition est celle d'un automobiliste sur la route Douala–Yaoundé : s'il part de l'altitude $f(a)$ et arrive à l'altitude $f(b)$ sans quitter la route (continuité), alors il est forcément passé par toutes les altitudes intermédiaires.

PROPRIÉTÉ Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) — admis


Soit f une fonction continue sur un segment $[a; b]$. Pour tout réel c compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = c$ admet au moins une solution dans $[a; b]$: il existe $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = c$.



La droite $y = c$, comprise entre $f(a)$ et $f(b)$, rencontre forcément la courbe continue C_f : il existe $\alpha \in [a; b]$ avec $f(\alpha) = c$.

ATTENTION La continuité est indispensable

Si f n'est pas continue, la conclusion peut tomber en défaut : la droite $y = c$ peut passer « à travers » le saut de la courbe sans la rencontrer. Avant d'appliquer le TVI, toujours justifier la continuité de f sur l'intervalle considéré.



Contre-exemple : f est discontinue en x_0 (saut). Bien que c soit compris entre $f(a)$ et $f(b)$, la droite $y = c$ ne rencontre pas la courbe : l'équation $f(x) = c$ n'a aucune solution.


EXPÉRIENCE Idée de la démonstration : la dichotomie

Pourquoi le TVI est-il vrai ? Discutons-en en classe sur un cas concret : supposons f continue sur $[a; b]$, $f(a) < c < f(b)$, et construisons une suite d'intervalles emboîtés qui « piègent » une solution.

1. On pose $a_0 = a$, $b_0 = b$. On considère le milieu $m_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$.

2. Si $f(m_0) \leq c$, la solution est à droite : on garde $[a_1; b_1] = [m_0; b_0]$. Sinon, on garde $[a_1; b_1] = [a_0; m_0]$.
3. On recommence : à chaque étape, $f(a_n) \leq c \leq f(b_n)$ et la longueur de l'intervalle est divisée par 2 : $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$.
4. Les suites (a_n) croissante et (b_n) décroissante sont adjacentes ; elles convergent vers une même limite α . Par continuité, $f(a_n) \rightarrow f(\alpha)$ et $f(b_n) \rightarrow f(\alpha)$, et l'encadrement $f(a_n) \leq c \leq f(b_n)$ donne à la limite $f(\alpha) = c$.

Cet algorithme, appelé **dichotomie**, fournit en prime une méthode effective d'encadrement de la solution.



Dichotomie : les intervalles emboîtés $[a_n; b_n]$, dont la longueur est divisée par 2 à chaque étape, resserrent l'étau autour de la solution α .

1.4 Corollaire : le théorème de la bijection

Le TVI donne l'existence d'une solution, mais pas son unicité : une courbe continue peut traverser plusieurs fois la droite $y = c$. Pour garantir l'unicité, on ajoute une hypothèse : la **stricte monotonie**.

PROPRIÉTÉ Corollaire du TVI : théorème de la bijection

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I . Alors pour tout réel c appartenant à l'intervalle image $f(I)$, l'équation $f(x) = c$ admet une unique solution dans I .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exigible : savoir la rédiger)

Soit $c \in f(I)$. Raisonnons en deux temps.

1. Existence. Puisque $c \in f(I)$, il existe par définition de l'image un réel $\alpha \in I$ tel que $f(\alpha) = c$. (Sur un segment $[a; b] \subset I$ avec c entre $f(a)$ et $f(b)$, c'est exactement le TVI qui fournit

cet α .)

2. **Unicité.** Supposons que f soit strictement croissante (le cas décroissant est analogue) et qu'il existe deux solutions α et α' dans I avec $\alpha < \alpha'$. Par stricte croissance, $f(\alpha) < f(\alpha')$, ce qui contredit $f(\alpha) = f(\alpha') = c$. Donc $\alpha = \alpha'$: la solution est unique.

Conclusion : l'existence vient du TVI (continuité), l'unicité vient de la stricte monotonie. Retiens bien cette répartition des rôles.

MÉTHODE Résoudre $f(x) = c$: existence et unicité

1. Justifier que f est continue sur I (fonction polynôme, rationnelle, composée, etc.).
2. Étudier la stricte monotonie de f sur I (signe de f').
3. Dresser le tableau de variations complet avec les limites aux bornes, et en déduire l'intervalle image $f(I)$.
4. Vérifier que $c \in f(I)$.
5. Conclure : « D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = c$ admet une unique solution α dans I . »

ATTENTION Les deux pièges classiques du Bac

- **Piège 1** : appliquer le TVI sans avoir vérifié (et rédigé!) la continuité de f . Sans continuité, le théorème ne s'applique pas : voir le contre-exemple de la fonction en escalier.
- **Piège 2** : conclure à l'unicité avec le seul TVI. Le TVI seul ne donne que l'existence d'au moins une solution. L'unicité exige la stricte monotonie. Si f n'est monotone que par morceaux, applique le corollaire sur chaque intervalle de monotonie et compte les solutions.

1.5 Localisation d'une solution : balayage et dichotomie

Une fois l'existence et l'unicité de α établies, il reste à la localiser. Deux techniques complémentaires :

- **Balayage** : on calcule f en des points régulièrement espacés (par exemple de 0,1 en 0,1) et l'on repère un **changement de signe** de $f(x) - c$: si f est continue et $f(x_1) - c$ et $f(x_2) - c$ sont de signes contraires, alors $\alpha \in [x_1; x_2]$.
- **Dichotomie** : on part d'un encadrement $a_0 < \alpha < b_0$ avec $f(a_0) - c$ et $f(b_0) - c$ de signes contraires ; on teste le milieu et l'on garde la moitié d'intervalle où le signe change. Après n

étapes, l'amplitude est $\frac{b_0 - a_0}{2^n}$. Pour obtenir un encadrement à 10^{-2} près à partir d'un intervalle d'amplitude 1, il faut n tel que $2^n \geq 100$, soit $n = 7$ étapes.

EXERCICE RÉSOLU 1**Le problème de l'opérateur de Douala**

Énoncé. Soit $f(x) = x^3 - 3x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$. Montrer que l'équation $f(x) = 4$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, puis donner un encadrement de α d'amplitude 0,1.

SOLUTION

Solution. 1. Continuité : f est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$.

2. Variations : $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. On a $f'(x) > 0$ sur $]-\infty; -1[$ et $]1; +\infty[$, et $f'(x) < 0$ sur $]-1; 1[$. Valeurs remarquables : $f(-1) = 7$, $f(1) = 3$. Limites : $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

3. Application du corollaire sur chaque intervalle de monotonie :

- Sur $]-\infty; -1[$: f est continue, strictement croissante, et $f(]-\infty; -1[) =]-\infty; 7]$. Or $4 \in]-\infty; 7]$, donc l'équation $f(x) = 4$ y admet une unique solution α .
- Sur $]-1; 1[$: f y est strictement décroissante, $f(]-1; 1[) = [3; 7]$, et $4 \in [3; 7]$: il y a une unique solution β sur cet intervalle.
- Sur $]1; +\infty[$: $f(]1; +\infty[) = [3; +\infty[$ et $4 \in [3; +\infty[$: il y a une unique solution γ .

L'équation admet donc en réalité trois solutions réelles ! C'est une excellente illustration du piège signalé plus haut : f n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$ tout entier. Intéressons-nous à la solution $\alpha \in]-\infty; -1]$, qui correspond au problème concret si l'on cherche la plus petite date.

4. Encadrement par balayage. On calcule :

$$f(-3) = -27 + 9 + 5 = -13 < 4, \quad f(-2) = -8 + 6 + 5 = 3 < 4, \quad f(-1) = 7 > 4.$$

Donc $\alpha \in]-2; -1[$. On affine au dixième : $f(-2) = 3 < 4$ et

$$f(-1,9) = (-1,9)^3 - 3(-1,9) + 5 = -6,859 + 5,7 + 5 = 3,841 < 4.$$

$$f(-1,8) = -5,832 + 5,4 + 5 = 4,568 > 4.$$

Comme f est strictement croissante sur $]-\infty; -1]$, on conclut :

$$-1,9 < \alpha < -1,8.$$

Encadrement d'amplitude 0,1 obtenu. Une dichotomie permettrait de poursuivre jusqu'à 10^{-2} près : on trouverait $-1,88 < \alpha < -1,87$ (en effet $f(-1,88) \approx 3,995 < 4$ et $f(-1,87) \approx 4,071 > 4$).

EXERCICE RÉSOLU 2 Existence et unicité de la racine cubique

Énoncé. Montrer que l'équation $x^3 = 10$ admet une unique solution réelle positive, et l'encadrer entre deux entiers consécutifs. (C'est le problème de l'ingénieur de la SONAREL.)

SOLUTION

Solution. Soit $g(x) = x^3$ sur $[0; +\infty[$. g est une fonction polynôme, donc continue, et $g'(x) = 3x^2 \geq 0$ ne s'annule qu'en 0 : g est strictement croissante sur $[0; +\infty[$. De plus $g(0) = 0$ et $\lim_{+\infty} g = +\infty$, donc $g([0; +\infty[) = [0; +\infty[$. Or $10 \in [0; +\infty[$: d'après le corollaire du TVI, l'équation $x^3 = 10$ admet une unique solution dans $[0; +\infty[$, notée $\sqrt[3]{10}$.

Balayage : $g(2) = 8 < 10$ et $g(3) = 27 > 10$, donc

$$2 < \sqrt[3]{10} < 3.$$

Plus finement : $g(2,1) = 9,261 < 10$ et $g(2,2) = 10,648 > 10$, d'où $2,1 < \sqrt[3]{10} < 2,2$. L'ingénieur peut donc dimensionner sa cuve avec $\sqrt[3]{10} \approx 2,15$, valeur garantie à 5×10^{-2} près.

LESAVAIS-TU ? Le TVI, un théorème aux applications surprenantes

Le théorème des valeurs intermédiaires a des conséquences étonnantes. Par exemple, il permet de prouver qu'à tout instant, il existe sur Terre deux points diamétralement opposés ayant exactement la même température ! Il est aussi à la base des algorithmes de recherche de zéros programmés dans les calculatrices et les logiciels utilisés par les ingénieurs de CAMTEL ou de la SONAREL pour résoudre numériquement des équations sans solution exacte calculable.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle ; l'image d'un segment $[a; b]$ est un segment $[m; M]$.
- TVI : f continue sur $[a; b]$ et c entre $f(a)$ et $f(b) \Rightarrow f(x) = c$ admet au moins une solution dans $[a; b]$.
- Corollaire (bijection) : f continue et strictement monotone sur I , $c \in f(I) \Rightarrow f(x) = c$ admet une unique solution dans I .
- La solution se localise par balayage ou dichotomie (amplitude divisée par 2 à chaque étape).

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x - 1$.

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ et dresser son tableau de variations complet.
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
3. Justifier que $\alpha \in]0; 1[$, puis donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2} par dichotomie.

CORRIGÉ Exercice 1

1. f est un polynôme, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Limites : $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$.
2. f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et $f(\mathbb{R}) =]-\infty; +\infty[= \mathbb{R}$. Or $0 \in \mathbb{R}$: d'après le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
3. $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$: comme f est strictement croissante, $\alpha \in]0; 1[$. Dichotomie : $f(0,5) = -0,375 < 0$ donc $\alpha \in]0,5; 1[$; $f(0,75) \approx 0,172 > 0$ donc $\alpha \in]0,5; 0,75[$; $f(0,625) \approx -0,131 < 0$ donc $\alpha \in]0,625; 0,75[$; $f(0,6875) \approx 0,0125 > 0$ donc $\alpha \in]0,625; 0,6875[$; $f(0,65625) \approx -0,0613 < 0$ donc $\alpha \in]0,65625; 0,6875[$; $f(0,671875) \approx -0,0248 < 0$ donc $\alpha \in]0,671875; 0,6875[$; enfin $f(0,68) \approx -0,0056 < 0$ et $f(0,69) \approx 0,0185 > 0$. Conclusion :

$$0,68 < \alpha < 0,69,$$

encadrement d'amplitude 10^{-2} .

2 FONCTION RÉCIPROQUE D'UNE BIJECTION

Dans la section précédente, nous avons établi un résultat fondamental : si f est **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I , alors pour tout nombre c compris entre les bornes de $f(I)$, l'équation $f(x) = c$ admet une **unique** solution dans I . Autrement dit, à chaque valeur y de $J = f(I)$ correspond un unique antécédent x dans I . Ce constat ouvre une porte immense : on peut définir une nouvelle fonction qui, partant de y , ramène x . C'est cette fonction « retour » que nous allons étudier : la **fonction réciproque**.

2.1 Injection, surjection, bijection : les rappels indispensables

Avant de « remonter » une fonction, il faut s'assurer que chaque point d'arrivée possède un antécédent, et un seul. Formalisons cela.

DÉFINITION Injection, surjection, bijection

Soit f une fonction définie sur un ensemble E à valeurs dans un ensemble F .

- f est **injective** si deux éléments distincts de E ont toujours des images distinctes :

$$\forall x_1, x_2 \in E, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

- f est **surjective** (de E sur F) si tout élément de F possède au moins un antécédent dans E :

$$\forall y \in F, \exists x \in E, \quad f(x) = y.$$

- f est **bijective** (on dit que f est une **bijection**) si elle est à la fois injective et surjective : tout élément de F possède alors exactement un antécédent dans E .

EXEMPLE Tester l'injectivité en pratique

La fonction $f : x \mapsto x^2$ définie sur $\mathbb{R}$ tout entier n'est pas injective : $f(-2) = f(2) = 4$, donc 4 a deux antécédents. En revanche, restreinte à $[0; +\infty[$, elle devient injective : si $x_1^2 = x_2^2$ avec $x_1, x_2 \geq 0$, alors $x_1 = x_2$. C'est pourquoi la racine carrée n'existe que parce qu'on a restreint le domaine de départ.

ATTENTION Une bijection dépend des ensembles de départ ET d'arrivée

Dire « f est bijective » n'a de sens que si l'on précise de quel ensemble vers quel ensemble. La fonction $x \mapsto x^2$ n'est pas une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, mais c'est une bijection de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$. Au Bac, la première étape consiste souvent à restreindre l'ensemble de départ pour obtenir une bijection.

2.2 Le théorème de la bijection

Voici le pont entre la section précédente et celle-ci : la continuité et la stricte monotonie garantissent l'existence d'une bijection.

PROPRIÉTÉ Théorème de la bijection

Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I . Alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle image $J = f(I)$.

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée du théorème de la bijection**

Traisons le cas où f est strictement croissante sur I .

1. Injectivité. Soient $x_1 \neq x_2$ dans I . Supposons $x_1 < x_2$. Comme f est strictement croissante, $f(x_1) < f(x_2)$, donc $f(x_1) \neq f(x_2)$. Deux éléments distincts ont des images distinctes : f est injective.
2. Surjectivité sur $J = f(I)$. Par définition même de l'ensemble image, tout $y \in J$ s'écrit $y = f(x)$ pour un certain $x \in I$: f est surjective de I sur J . (Le théorème des valeurs intermédiaires garantit d'ailleurs que J est bien un intervalle et que toute valeur intermédiaire est atteinte.)
3. Conclusion. f est injective et surjective de I sur J : c'est une bijection de I sur J .

Le cas strictement décroissant se traite de manière analogue.

2.3 Définition de la fonction réciproque

Puisque chaque y de J possède un unique antécédent dans I , on peut construire la fonction « retour ».

DÉFINITION**Fonction réciproque**


Soit f une bijection d'un intervalle I sur un intervalle J . La **fonction réciproque** de f , notée f^{-1} , est l'unique fonction de J dans I définie par :

$$\forall x \in I, \forall y \in J, \quad f^{-1}(y) = x \iff y = f(x).$$

Elle vérifie les deux relations fondamentales :

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_I \quad \text{et} \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_J,$$

c'est-à-dire : pour tout $x \in I$, $f^{-1}(f(x)) = x$, et pour tout $y \in J$, $f(f^{-1}(y)) = y$.



La bijection f envoie I sur J ; sa réciproque f^{-1} ramène chaque y sur son unique antécédent.

ATTENTION $f^{-1}(x)$ n'est PAS $\frac{1}{f(x)}$

C'est la confusion la plus fréquente (et la plus sanctionnée)! La notation f^{-1} désigne la réciproque (la fonction « retour »), pas l'inverse. Par exemple, si $f(x) = x^2$ sur $[0; +\infty[$, alors $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$, tandis que $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{x^2}$: deux fonctions totalement différentes. L'inverse de f se note $\frac{1}{f}$, jamais f^{-1} .

2.4 Continuité et monotonie de la réciproque

PROPRIÉTÉ Continuité et monotonie de la fonction réciproque

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I , réalisant une bijection de I sur $J = f(I)$. Alors :

- sa réciproque f^{-1} est continue sur J (résultat admis) ;
- f^{-1} est strictement monotone sur J , de même sens de variation que f .

L'existence de f^{-1} découle du théorème de la bijection démontré plus haut. La continuité de f^{-1} est admise (sa démonstration dépasse le programme). Le fait que f^{-1} ait le même sens de variation que f se comprend bien : si f « monte », remonter la courbe en sens inverse la fait monter aussi. Rigoureusement, si f est strictement croissante et si $y_1 < y_2$ dans J , posons $x_1 = f^{-1}(y_1)$ et $x_2 = f^{-1}(y_2)$. Si l'on avait $x_1 \geq x_2$, la croissance de f donnerait $f(x_1) \geq f(x_2)$, c'est-à-dire $y_1 \geq y_2$: contradiction. Donc $x_1 < x_2$ et f^{-1} est strictement croissante.

2.5 Dérivabilité de la fonction réciproque

PROPRIÉTÉ Dérivée de la fonction réciproque

Soit f une bijection de I sur J , dérivable en un point $a \in I$ avec $f'(a) \neq 0$. Alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et :

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(a)}.$$

Si $f'(a) = 0$, alors f^{-1} n'est pas dérivable en $b = f(a)$: sa courbe admet en ce point une tangente verticale.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée à partir du taux d'accroissement

Posons $b = f(a)$ et soit $y \in J$, $y \neq b$. Posons $x = f^{-1}(y)$, de sorte que $y = f(x)$. Comme f est bijective, $y \neq b$ équivaut à $x \neq a$. Le taux d'accroissement de f^{-1} entre b et y s'écrit :

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}.$$

Quand $y \rightarrow b$, la continuité de f^{-1} en b donne $x = f^{-1}(y) \rightarrow f^{-1}(b) = a$. Le dénominateur $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ tend alors vers $f'(a)$, qui est non nul par hypothèse. Par passage à la limite du quotient :

$$\lim_{y \rightarrow b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{1}{f'(a)}.$$

Donc f^{-1} est dérivable en b et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$.

ATTENTION N'oublie pas de composer par f^{-1}

Erreur classique : écrire $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(x)}$. C'est faux ! La formule correcte est

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

La dérivée de f doit être évaluée au point $f^{-1}(x)$, pas au point x . Vérifie avec $f(x) = x^2$ sur $[0; +\infty[$: $f'(x) = 2x$, donc $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, qui est bien la dérivée de $\sqrt{x}$ — alors que $\frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{2x}$ serait faux.

À RETENIR Les trois propriétés clés de la réciproque

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I (donc bijective de I sur $J = f(I)$) :

1. Continuité : f^{-1} est continue sur J .
2. Monotonie : f^{-1} a le même sens de variation que f sur J .
3. Dérivabilité : Si f est dérivable en a avec $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.
4. Géométrie : Les courbes de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

2.6 Symétrie des courbes par rapport à la droite $y = x$

Voici la propriété géométrique la plus spectaculaire — et la plus utile pour les tracés.

PROPRIÉTÉ Symétrie des courbes de f et f^{-1}

Dans un repère orthonormé, les courbes représentatives de f et de f^{-1} sont **symétriques** l'une de l'autre par rapport à la droite d'équation $y = x$ (la première bissectrice).

En effet, le point $M(x; y)$ appartient à la courbe de f si et seulement si $y = f(x)$, ce qui équivaut à $x = f^{-1}(y)$, c'est-à-dire que le point $M'(y; x)$ appartient à la courbe de f^{-1} . Or, dans un repère orthonormé, échanger les coordonnées revient exactement à effectuer la symétrie orthogonale par rapport à la droite $y = x$.

MÉTHODE Tracer la courbe de f^{-1} à partir de celle de f

1. Place quelques points remarquables de la courbe de f : intersections avec les axes, extremums, points dont les coordonnées sont entières.
2. Pour chaque point $M(a; b)$, construis son symétrique $M'(b; a)$ par rapport à la droite $y = x$: trace la droite $y = x$, puis reporte M' en échangeant abscisse et ordonnée (la perpendiculaire à $y = x$ passant par M coupe $y = x$ en son milieu).
3. Relie les points symétriques par une courbe lisse, en respectant le sens de variation (le même que celui de f).
4. N'oublie pas : une tangente de pente m en M devient une tangente de pente $\frac{1}{m}$ en M' ; une tangente horizontale devient verticale.

2.7 Exemples de référence

Exemple 1 : la fonction carré sur $[0; +\infty[$ et la racine carrée.


La fonction $f : x \mapsto x^2$ est continue et strictement croissante sur $I = [0; +\infty[$ (sa dérivée $2x$ est strictement positive sur $]0; +\infty[$). D'après le théorème de la bijection, elle réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur $J = f(I) = [0; +\infty[$. Sa réciproque est la fonction **racine carrée** :

$$f^{-1} : [0; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[, \quad x \mapsto \sqrt{x}.$$

Calculons sa dérivée avec la formule : pour $x > 0$, $f'(t) = 2t$, donc

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

On retrouve la dérivée classique de $\sqrt{x}$. Remarque : $f'(0) = 0$, donc f^{-1} n'est pas dérivable en 0 — la courbe de $\sqrt{x}$ admet une tangente verticale à l'origine.



Les courbes de $x \mapsto x^2$ (sur $[0; +\infty[$) et de $x \mapsto \sqrt{x}$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$: les points $M(2; 4)$ et $M'(4; 2)$ se correspondent.


Exemple 2 : la fonction cube et la racine cubique.

La fonction $g : x \mapsto x^3$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier (sa dérivée $3x^2$ est positive et ne s'annule qu'en 0, sans changement de signe). Elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, et sa réciproque est la fonction **racine cubique** :

$$g^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt[3]{x}.$$

Contrairement à la racine carrée, la racine cubique est définie sur $\mathbb{R}$ entier : $\sqrt[3]{-8} = -2$ car $(-2)^3 = -8$. Sa dérivée pour $x \neq 0$:

$$(g^{-1})'(x) = \frac{1}{3(\sqrt[3]{x})^2}.$$



La fonction cube est bijective sur $\mathbb{R}$; sa réciproque, la racine cubique, lui est symétrique par rapport à $y = x$.

2.8 Déterminer l'expression explicite de f^{-1}

MÉTHODE Calculer l'expression de f^{-1}

Pour déterminer explicitement la réciproque d'une bijection $f : I \rightarrow J$:

1. Vérifie (ou justifie) que f est continue et strictement monotone sur I , et détermine $J = f(I)$.
2. Pose $y = f(x)$ avec $x \in I$ et $y \in J$.
3. Résous cette équation d'inconnue x : tu obtiens x en fonction de y .
4. Conclut : $f^{-1}(y) =$ l'expression trouvée, puis (par convention) renomme la variable : $f^{-1}(x) = \dots$, en précisant son ensemble de définition J .

EXERCICE RÉSOLU 3 Réciproque d'une fonction homographique

Soit f la fonction définie sur $I =]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

1. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à préciser.
2. Déterminer l'expression de f^{-1} .

SOLUTION

1. f est une fonction rationnelle définie, continue et dérivable sur $I =]1; +\infty[$. Pour tout $x \in I$:

$$f'(x) = \frac{2(x-1) - (2x+1)}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2} < 0.$$

Donc f est strictement décroissante sur I . De plus, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ (numérateur tend vers $3 > 0$, dénominateur vers 0^+) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. Par le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur $J =]2; +\infty[$.

2. Soit $y \in J$. Résolvons $y = \frac{2x+1}{x-1}$ d'inconnue x :

$$y(x-1) = 2x+1$$

$$yx - y = 2x+1$$

$$x(y-2) = y+1$$

$$x = \frac{y+1}{y-2} \quad (\text{licite car } y > 2).$$

Conclusion : $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-2}$, définie sur $J =]2; +\infty[$. On vérifie au passage que f^{-1} est bien décroissante sur J , comme f .

EXERCICE RÉSOLU 4 Calculer $(f^{-1})'(b)$ sans connaître f^{-1}

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x - 1$. On admet que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $(f^{-1})'(2)$.

SOLUTION

L'expression explicite de f^{-1} est introuvable (il faudrait résoudre une équation du troisième degré), mais la formule de la dérivée de la réciproque s'applique. On cherche d'abord l'antécédent de 2 : on remarque que $f(1) = 1 + 2 - 1 = 2$, donc $f^{-1}(2) = 1$. Ensuite, $f'(x) = 3x^2 + 2$, donc $f'(1) = 5 \neq 0$. La formule donne :

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(f^{-1}(2))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{5}.$$

LESAVAIS-TU ? La notation f^{-1} et le piège classique du Bac

La notation f^{-1} pour la réciproque vient de l'algèbre des applications : composer par f^{-1} « annule » l'effet de f , comme multiplier par $a^{-1} = \frac{1}{a}$ annule la multiplication par a . Mais pour les fonctions, f^{-1} ne signifie jamais $\frac{1}{f}$! Au Baccalauréat, une question extrêmement classique consiste à calculer $(f^{-1})'(b)$ sans connaître l'expression de f^{-1} : il suffit de trouver l'an-

técédent a tel que $f(a) = b$ (souvent une valeur évidente à tester : 0, 1, 2...), puis d'appliquer $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$. Les fonctions trigonométriques réciproques (Arc sinus, Arc cosinus, Arc tangente), que tu rencontreras peut-être en enseignement supérieur, sont construites exactement selon ce schéma, par restriction à un intervalle de monotonie.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Soit $f(x) = \sqrt{x} + 1$ définie sur $[0; +\infty[$. Montrer que f est une bijection de $[0; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser, puis déterminer f^{-1} .
2. Soit $g(x) = x^3 + x$ sur $\mathbb{R}$. On admet que g est bijective. Calculer $(g^{-1})'(2)$ et $(g^{-1})'(0)$.
3. Soit $h(x) = \frac{x}{x+2}$ sur $] -2; +\infty[$. Déterminer h^{-1} et tracer sur un même graphique les courbes de h et h^{-1} .

CORRIGÉ Exercice 1

1. f est continue sur $[0; +\infty[$ et $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$ sur $]0; +\infty[$: f est strictement croissante.

Comme $f(0) = 1$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$, $J = [1; +\infty[$. On résout $y = \sqrt{x} + 1$: $\sqrt{x} = y - 1$, d'où $x = (y - 1)^2$ (licite car $y \geq 1$). Donc $f^{-1}(x) = (x - 1)^2$ sur $[1; +\infty[$.

2. $g(1) = 2$ donc $g^{-1}(2) = 1$; $g'(x) = 3x^2 + 1$, $g'(1) = 4$, donc $(g^{-1})'(2) = \frac{1}{4}$. De même $g(0) = 0$ donc $(g^{-1})'(0) = \frac{1}{g'(0)} = 1$.

3. $h'(x) = \frac{2}{(x+2)^2} > 0$: h est strictement croissante, bijective de $] -2; +\infty[$ sur $] -\infty; 1[$ (limites : $-\infty$ en -2^+ , 1 en $+\infty$). On résout $y = \frac{x}{x+2}$: $y(x+2) = x$, d'où $x(y-1) = -2y$ et $x = \frac{2y}{1-y}$. Donc $h^{-1}(x) = \frac{2x}{1-x}$ sur $] -\infty; 1[$. Pour le tracé, on place la droite $y = x$ et on construit les symétriques de points remarquables : $(0; 0)$ est commun aux deux courbes, $(2; \frac{1}{2})$ sur la courbe de h correspond à $(\frac{1}{2}; 2)$ sur celle de h^{-1} .

3 RACINES N-IÈMES ET PUISSANCES RATIONNELLES

Dans la section précédente, nous avons vu que toute bijection $f : I \rightarrow J$ admet une fonction réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$, continue, de même sens de variation, et dont la courbe est symétrique de celle de f par rapport à la droite d'équation $y = x$. Nous allons maintenant mettre cette belle machinerie en action sur une famille de fonctions que tu connais depuis longtemps : les fonc-

tions puissances $x \mapsto x^n$. Leur réciproque va nous offrir un nouvel outil de calcul fondamental : la **racine n-ième**, généralisation de la racine carrée, qui permet de résoudre les équations $x^n = a$ et de donner un sens précis à des écritures comme $8^{2/3}$.

3.1 La fonction $x \mapsto x^n$ sur $[0; +\infty[$

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Considérons la fonction $f_n : x \mapsto x^n$, définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, mais que nous restreindrons d'abord à l'intervalle $[0; +\infty[$.

PROPRIÉTÉ Bijektivité de $x \mapsto x^n$ sur $[0; +\infty[$

Pour tout entier $n \geq 2$, la fonction $f_n : x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$. De plus :


$$f_n(0) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty.$$

Par conséquent, f_n réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

1. Continuité. f_n est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $[0; +\infty[$.
2. Stricte croissance. f_n est dérivable sur $[0; +\infty[$ et $f'_n(x) = n x^{n-1}$. Pour tout $x > 0$, on a $x^{n-1} > 0$, donc $f'_n(x) > 0$: la fonction est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.
3. Limites aux bornes. $f_n(0) = 0^n = 0$, et comme $n \geq 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$.
4. Conclusion. f_n est continue et strictement monotone sur l'intervalle $[0; +\infty[$: d'après le théorème de la bijection (conséquence du théorème des valeurs intermédiaires), elle réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur l'intervalle image $[0; +\infty[$.

L'intuition est simple : quand x parcourt les réels positifs en croissant, x^n parcourt, lui aussi en croissant et sans sauter aucune valeur, tous les réels positifs. Chaque réel positif a est donc atteint une fois et une seule : c'est exactement ce qui va nous permettre de définir la racine n-ième.



Courbes de $x \mapsto x^n$ pour $n = 2, 3, 4$ sur $[0; 2]$. Chacune est strictement croissante : la valeur $a = 2$ est atteinte une seule fois par x^2 , en $x = \sqrt{2}$.

3.2 Définition de la racine n-ième

DÉFINITION Racine n-ième d'un réel positif

Soit n un entier supérieur ou égal à 2 et a un réel positif ou nul. On appelle **racine n-ième** de a , et on note $\sqrt[n]{a}$, l'unique réel positif ou nul dont la puissance n-ième vaut a :


$$\sqrt[n]{a} \text{ est l'unique } x \geq 0 \text{ tel que } x^n = a.$$

Autrement dit, $\sqrt[n]{a} = f_n^{-1}(a)$, où f_n^{-1} est la réciproque de la bijection $x \mapsto x^n$ de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$.

À RETENIR Cas particuliers à connaître

- Pour $n = 2$: la racine carrée, notée $\sqrt{a}$ (on omet l'indice 2). Exemple : $\sqrt{9} = 3$.
- Pour $n = 3$: la racine cubique, notée $\sqrt[3]{a}$. Exemple : $\sqrt[3]{27} = 3$ car $3^3 = 27$.
- Pour tout $a \geq 0$ et tout $n \geq 2$: $(\sqrt[n]{a})^n = a$ et $\sqrt[n]{a^n} = a$.

La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est donc définie, continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$ (propriétés héritées de la réciproque), et sa courbe est la symétrique de celle de $x \mapsto x^n$ par rapport à la droite $y = x$.



Comparaison de $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ sur $[0; 4]$. Les deux courbes passent par $(0; 0)$ et $(1; 1)$; pour $x > 1$, $\sqrt{x} > \sqrt[3]{x}$, et pour $0 < x < 1$, c'est l'inverse.

3.3 Résolution de l'équation $x^n = a$

Voici le point où la parité de n joue un rôle décisif. Sur $\mathbb{R}$ tout entier, le comportement de $x \mapsto x^n$ dépend de la parité de n :

- si n est **pair**, $x^n \geq 0$ pour tout x réel, et f_n est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$, strictement croissante sur $[0; +\infty[$;
- si n est **impair**, f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, et x^n prend toutes les valeurs réelles, y compris négatives.

PROPRIÉTÉ Nombre de solutions de $x^n = a$

Soit $n \geq 2$ un entier et a un réel. L'équation $x^n = a$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$, admet :

- si $a < 0$: aucune solution lorsque n est pair ; une unique solution $x = -\sqrt[n]{-a}$ lorsque n est impair ;
- si $a = 0$: l'unique solution $x = 0$;
- si $a > 0$: deux solutions $x = \sqrt[n]{a}$ et $x = -\sqrt[n]{a}$ lorsque n est pair ; une unique solution $x = \sqrt[n]{a}$ lorsque n est impair.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Cas n pair. Pour tout réel x , $x^n = (x^2)^{n/2} \geq 0$, donc $x^n = a < 0$ est impossible. Si $a > 0$: sur $[0; +\infty[$, f_n est une bijection sur $[0; +\infty[$, donc l'équation a une unique solution positive $x_0 =$

$\sqrt[n]{a}$. Sur $] -\infty ; 0]$, f_n est continue et strictement décroissante, avec $f_n(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$: c'est une bijection de $] -\infty ; 0]$ sur $[0 ; +\infty[$, donc une unique solution négative existe ; comme $(-x_0)^n = (-1)^n x_0^n = x_0^n = a$ (car n pair), cette solution est $-x_0$.

Cas n impair. f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (sa dérivée nx^{n-1} est positive, ne s'annulant qu'en 0), continue, avec $\lim_{-\infty} f_n = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f_n = +\infty$: c'est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. L'équation $x^n = a$ a donc une unique solution pour tout a : c'est $\sqrt[n]{a}$ si $a \geq 0$, et $-\sqrt[n]{-a}$ si $a < 0$ (vérification : $(-\sqrt[n]{-a})^n = (-1)^n (\sqrt[n]{-a})^n = -(-a) = a$ car n impair).

EXEMPLE Résolutions d'équations $x^n = a$

- $x^3 = -8$: $n = 3$ impair, $a = -8 < 0$, donc une unique solution : $x = -\sqrt[3]{8} = -2$. Vérification : $(-2)^3 = -8$.
- $x^4 = 16$: $n = 4$ pair, $a = 16 > 0$, donc deux solutions : $x = \sqrt[4]{16} = 2$ et $x = -2$. Vérification : $2^4 = (-2)^4 = 16$.
- $x^5 = 32$: $n = 5$ impair, une unique solution : $x = \sqrt[5]{32} = 2$ car $2^5 = 32$.
- $x^2 = -4$: n pair, $a < 0$: aucune solution réelle.

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Oublier la solution négative. L'équation $x^4 = 16$ a deux solutions : 2 et -2. La racine n -ième $\sqrt[n]{a}$ est par définition positive, mais l'équation $x^n = a$ avec n pair admet aussi la solution opposée.
- La racine n -ième n'est pas additive : en général

$$\sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}.$$

Contre-exemple : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. De même, $\sqrt[3]{8+8} = \sqrt[3]{16} \approx 2,52 \neq 2 + 2 = 4$.

- Écrire $\sqrt[n]{a}$ pour $a < 0$ avec n pair n'a aucun sens dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{-4}$ n'existe pas (en Terminale, dans $\mathbb{R}$).

3.4 Puissances à exposant rationnel

La racine n -ième permet de donner un sens aux exposants fractionnaires. L'idée directrice : on veut que la règle $(a^r)^s = a^{rs}$ reste vraie. Or, si l'on veut définir $a^{1/n}$, on doit avoir $(a^{1/n})^n = a^1 = a$: c'est exactement la définition de $\sqrt[n]{a}$.

DÉFINITION Puissance à exposant rationnel

Soit a un réel strictement positif, p un entier relatif et q un entier naturel non nul. On pose :

$$a^{1/q} = \sqrt[q]{a} \quad \text{et} \quad a^{p/q} = \left(\sqrt[q]{a}\right)^p = \sqrt[q]{a^p}.$$

PROPRIÉTÉ Règles de calcul sur les puissances rationnelles (admisses)

Pour tous réels $a > 0$, $b > 0$ et tous rationnels r, s :

$$\begin{aligned} a^r \times a^s &= a^{r+s} & \frac{a^r}{a^s} &= a^{r-s} & (a^r)^s &= a^{rs} \\ (ab)^r &= a^r b^r & \left(\frac{a}{b}\right)^r &= \frac{a^r}{b^r} & a^{-r} &= \frac{1}{a^r} \end{aligned}$$

En particulier, pour $a, b > 0$ et $n \geq 2$:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \quad \sqrt[n]{a^p} = a^{p/n}, \quad \left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a.$$

Ces règles prolongent exactement celles que tu connais pour les exposants entiers : c'est toute la force de la définition. Retiens que l'écriture fractionnaire et l'écriture avec radicaux sont deux visages du même objet, et qu'on passe de l'une à l'autre selon les besoins du calcul.

EXERCICE RÉSOLU 5 Simplification d'une expression à puissances rationnelles

Simplifier l'expression $E = \frac{8^{2/3} \times 27^{1/3}}{4^{1/2}}$.

SOLUTION

Solution détaillée. On exprime chaque base comme puissance d'un nombre premier :

$$8 = 2^3, \quad 27 = 3^3, \quad 4 = 2^2.$$

On applique ensuite la règle $(a^r)^s = a^{rs}$:

$$\begin{aligned} 8^{2/3} &= (2^3)^{2/3} = 2^{3 \times \frac{2}{3}} = 2^2 = 4, \\ 27^{1/3} &= (3^3)^{1/3} = 3^1 = 3, \\ 4^{1/2} &= (2^2)^{1/2} = 2^1 = 2. \end{aligned}$$

Donc :

$$E = \frac{4 \times 3}{2} = \frac{12}{2} = 6.$$

Vérification par les radicaux : $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$; $27^{1/3} = \sqrt[3]{27} = 3$; $4^{1/2} = \sqrt{4} = 2$. Même résultat : $E = 6$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Équations et simplifications

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^5 = 32$.
2. Simplifier $F = \sqrt[3]{54} \times \sqrt[3]{4} \div 6^{1/3}$.

SOLUTION

Solution.

1. $n = 5$ est impair et $32 > 0$: unique solution $x = \sqrt[5]{32} = \sqrt[5]{2^5} = 2$.
2. On regroupe sous un même radical grâce à $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$:

$$F = \frac{\sqrt[3]{54 \times 4}}{6^{1/3}} = \frac{\sqrt[3]{216}}{\sqrt[3]{6}} = \sqrt[3]{\frac{216}{6}} = \sqrt[3]{36}.$$

On peut aussi écrire $F = 36^{1/3} = 6^{2/3}$. (Vérification numérique : $\sqrt[3]{36} \approx 3,30$; or $\sqrt[3]{54} \approx 3,78$, $\sqrt[3]{4} \approx 1,59$, $6^{1/3} \approx 1,82$, et $\frac{3,78 \times 1,59}{1,82} \approx 3,30$: cohérent.)

3.5 Dérivée de la fonction racine n-ième

La fonction $g : x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est la réciproque de $f : x \mapsto x^n$ sur $[0; +\infty[$. Appliquons la formule de dérivation des réciproques vue dans la section précédente : si f est dérivable et si $f'(x) \neq 0$, alors

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Ici $f'(x) = nx^{n-1}$, qui ne s'annule qu'en $x = 0$. Pour $x > 0$, on obtient donc :

PROPRIÉTÉ Dérivée de $x \mapsto \sqrt[n]{x}$

La fonction $g : x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ (mais pas en 0) et :

$$g'(x) = \frac{1}{n (\sqrt[n]{x})^{n-1}} = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par la formule de la réciproque

Posons $y = \sqrt[n]{x}$, c'est-à-dire $x = y^n = f(y)$. Pour $x > 0$, on a $y > 0$ donc $f'(y) = ny^{n-1} \neq 0$. La formule donne :

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{n (\sqrt[n]{x})^{n-1}}.$$

Retrouvons la seconde écriture : $(\sqrt[n]{x})^{n-1} = (x^{1/n})^{n-1} = x^{(n-1)/n}$, donc

$$g'(x) = \frac{1}{n} x^{-(n-1)/n} = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}.$$

Remarque : en $x = 0$, le taux d'accroissement $\frac{\sqrt[n]{h} - 0}{h} = \frac{1}{h^{(n-1)/n}}$ tend vers $+\infty$ quand $h \rightarrow 0^+$: la courbe admet en l'origine une tangente verticale (symétrique de la tangente horizontale de $x \mapsto x^n$ en 0), et g n'y est pas dérivable.

EXEMPLE Application : dérivée de la racine cubique

Pour $n = 3$: $(\sqrt[3]{x})' = \frac{1}{3(\sqrt[3]{x})^2} = \frac{1}{3} x^{-2/3}$ pour tout $x > 0$.

Pour $n = 2$, on retrouve la formule connue : $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

LESAVAIS-TU ? Une belle cohérence de chapitre

Remarque l'élégance du résultat : la formule $(x^{1/n})' = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$ est exactement la même que celle des puissances entières, $(x^n)' = nx^{n-1}$, mais appliquée à l'exposant rationnel $\frac{1}{n}$! Ce n'est pas un hasard : c'est la formule de dérivation des fonctions réciproques qui garantit cette cohérence. Au Baccalauréat, savoir retrouver rapidement $(\sqrt[n]{x})'$ en écrivant « $\sqrt[n]{x}$ est la réciproque de x^n , donc sa dérivée est $\frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$ » est une démarche très valorisée par les correcteurs, car elle montre que tu as compris l'architecture du chapitre plutôt qu'appris des formules par cœur. Historiquement, c'est Isaac Newton qui, au XVII^e siècle, a généralisé la notation $a^{p/q}$ aux exposants fractionnaires dans ses travaux sur les binômes — une notation que nous utilisons encore telle quelle aujourd'hui.

MÉTHODE Simplifier une expression avec des puissances rationnelles

1. Décomposer chaque base en produit de facteurs premiers (par exemple $72 = 2^3 \times 3^2$).

- Convertir les radicaux en exposants fractionnaires : $\sqrt[q]{a^p} = a^{p/q}$.
- Appliquer les règles de calcul : $(a^r)^s = a^{rs}$, $a^r a^s = a^{r+s}$, $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$.
- Réduire les exposants (sommées et différences de fractions, au même dénominateur).
- Revenir si demandé à une écriture avec radicaux, ou donner la valeur exacte quand les exposants sont entiers.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

- Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $x^3 = 27$; b) $x^4 = 81$; c) $x^6 = -1$; d) $x^3 = -\frac{1}{8}$.
- Simplifier : $A = \frac{16^{3/4} \times 9^{1/2}}{27^{2/3}}$ et $B = \sqrt[3]{16} \times \sqrt[3]{4} \times 2^{-1/3}$.
- Soit $g : x \mapsto \sqrt[4]{x}$. Déterminer $g'(x)$ pour $x > 0$, puis l'équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 1.

CORRIGÉ Exercice n°1

- a) $n = 3$ impair : unique solution $x = \sqrt[3]{27} = 3$. b) $n = 4$ pair, $81 > 0$: deux solutions $x = \sqrt[4]{81} = 3$ et $x = -3$ (car $81 = 3^4$). c) $n = 6$ pair et $-1 < 0$: aucune solution réelle. d) $n = 3$ impair, $a < 0$: unique solution $x = -\sqrt[3]{\frac{1}{8}} = -\frac{1}{2}$.
- $A = \frac{(2^4)^{3/4} \times (3^2)^{1/2}}{(3^3)^{2/3}} = \frac{2^3 \times 3}{3^2} = \frac{8 \times 3}{9} = \frac{8}{3}$.
 $B = \sqrt[3]{16} \times 4 \times 2^{-1/3} = \sqrt[3]{64} \times 2^{-1/3} = 4 \times 2^{-1/3} = 2^{2-1/3} = 2^{5/3} = \sqrt[3]{32}$.
- $g'(x) = \frac{1}{4(\sqrt[4]{x})^3} = \frac{1}{4} x^{-3/4}$. En $x = 1$: $g(1) = 1$ et $g'(1) = \frac{1}{4}$. Tangente : $y = \frac{1}{4}(x - 1) + 1$, soit $y = \frac{x}{4} + \frac{3}{4}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $x \mapsto x^n$ est une bijection de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$; sa réciproque est la **racine n-ième** $x \mapsto \sqrt[n]{x}$.
- $\sqrt[n]{a}$ est toujours positif ; l'équation $x^n = a$ ($a > 0$) a deux solutions si n est pair, une seule

si n est impair ; si $a < 0$, une solution si n impair, aucune si n pair.

- $a^{p/q} = (\sqrt[q]{a})^p$ pour $a > 0$, et toutes les règles de calcul des puissances entières se prolongent.
- $(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$ sur $]0; +\infty[$, obtenue par la dérivation des réciproques ; tangente verticale en 0.
- Pièges : $\sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}$; ne pas oublier la solution négative quand n est pair.

4 INÉGALITÉ DES ACCROISSEMENTS FINIS

Dans la section précédente, nous avons appris à manipuler les racines n -ièmes et les puissances rationnelles : tu sais désormais donner un sens à $a^{1/n}$ et résoudre $x^n = a$. Mais une question pratique demeure : comment obtenir une valeur approchée de $\sqrt{101}$ sans calculatrice, et surtout comment contrôler l'erreur commise ? C'est exactement le genre de problème que résout l'**inégalité des accroissements finis**, outil central de l'analyse de Terminale et vedette incontestée des problèmes de Baccalauréat C, D, E et TI.

L'idée intuitive est simple. Imagine un chauffeur de taxi-brousse qui roule entre Douala et Yaoundé. Si sa vitesse instantanée reste toujours comprise entre 60 km/h et 90 km/h, alors la distance parcourue en 3 heures est forcément comprise entre 180 et 270 kilomètres. La vitesse, c'est la dérivée ; la distance parcourue, c'est l'accroissement $f(b) - f(a)$. Encadrer la dérivée, c'est donc encadrer l'accroissement. Toute cette section consiste à rendre cette intuition rigoureuse et à l'exploiter.

4.1 Rappel : le théorème des accroissements finis

PROPRIÉTÉ Théorème des accroissements finis (TAF) — admis

Soit f une fonction **continue** sur $[a; b]$ et **dérivable** sur $]a; b[$. Alors il existe au moins un réel $c \in]a; b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

À RETENIR Interprétation géométrique

Le quotient $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ est la **pente de la corde** $[AB]$, où $A(a; f(a))$ et $B(b; f(b))$. Le TAF affirme qu'il existe au moins un point $C(c; f(c))$ de la courbe où la tangente est parallèle à la corde $[AB]$.

Le TAF donne une égalité, mais il ne dit pas où se trouve le point c : c'est un théorème d'existence. Pour obtenir des résultats quantitatifs (des encadrements chiffrés), on lui préfère son avatar inégalitaire, que nous allons démontrer.

4.2 L'inégalité des accroissements finis

PROPRIÉTÉ Inégalité des accroissements finis (IAF)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle $[a; b]$ (avec $a < b$). On suppose qu'il existe deux réels m et M tels que, pour tout $x \in [a; b]$:

$$m \leq f'(x) \leq M.$$


Alors :

$$m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a).$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'IAF

L'idée consiste à appliquer le lien entre signe de la dérivée et sens de variation à deux fonctions auxiliaires bien choisies.

1. Première fonction auxiliaire. Posons $g(x) = f(x) - mx$. Comme $f'(x) \geq m$ sur $[a; b]$, on a $g'(x) = f'(x) - m \geq 0$: la fonction g est donc croissante sur $[a; b]$.
2. Comparaison des valeurs. Puisque $a \leq b$ et que g est croissante, $g(a) \leq g(b)$, c'est-à-dire $f(a) - ma \leq f(b) - mb$, d'où $f(b) - f(a) \geq m(b-a)$.
3. Deuxième fonction auxiliaire. Posons $h(x) = Mx - f(x)$. Comme $f'(x) \leq M$, on a $h'(x) = M - f'(x) \geq 0$: h est croissante sur $[a; b]$, donc $h(a) \leq h(b)$, ce qui donne $f(b) - f(a) \leq M(b-a)$.
4. Conclusion. En regroupant : $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$. ■



Interprétation géométrique de l'IAF : la pente de la corde $[AB]$ est comprise entre la plus petite pente m et la plus grande pente M des tangentes à la courbe sur $[a; b]$.

À RETENIR Lecture géométrique

Diviser l'encadrement $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$ par $b-a > 0$ donne :

$$m \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq M.$$

Autrement dit : la pente de toute corde est comprise entre les pentes extrêmes des tangentes. C'est exactement ce que traduit la figure ci-dessus.

4.3 Cas particulier fondamental : fonctions lipschitziennes

PROPRIÉTÉ Cas $|f'| \leq k$

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et k un réel positif. Si pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq k$, alors pour tous réels a et b de I :

$$|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|.$$

On dit que f est **k -lipschitzienne** sur I .

Démonstration. L'hypothèse $|f'(x)| \leq k$ s'écrit $-k \leq f'(x) \leq k$. Supposons $a < b$ et appliquons l'IAF avec $m = -k$ et $M = k$:

$$-k(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq k(b-a),$$

ce qui équivaut exactement à $|f(b) - f(a)| \leq k(b-a) = k|b-a|$. Si $b < a$, on échange les rôles de a

et b ; si $a = b$, l'inégalité est triviale. ■

ATTENTION Conditions d'application à ne jamais oublier

Deux erreurs reviennent sans cesse dans les copies :

- Appliquer l'IAF sans vérifier la dérivabilité sur tout l'intervalle. Par exemple, $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0 : on ne peut pas appliquer l'IAF sur $[0; 1]$, mais on peut l'appliquer sur $[1; 4]$ sans problème.
- Encadrer f' sur un intervalle plus grand que $[a; b]$. Si tu encadres f' sur $[0; 10]$ alors que tu travailles sur $[2; 3]$, ton encadrement reste vrai mais il est grossier : tu perds en précision. Encadre toujours f' sur l'intervalle exact $[a; b]$, en t'appuyant si besoin sur le tableau de variations de f' .

4.4 Méthode et application : encadrement d'une valeur approchée

MÉTHODE Encadrer $f(b) - f(a)$ grâce à l'IAF

1. Vérifier que f est dérivable sur $[a; b]$ (et le rédiger!).
2. Calculer $f'(x)$ et encadrer f' sur $[a; b]$: $m \leq f'(x) \leq M$. Pour cela, on étudie le sens de variation de f' (souvent via le signe de f'') ou on utilise des propriétés de monotonie (décroissance de $x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$, etc.).
3. Multiplier l'encadrement par $(b - a) > 0$: $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$.
4. Conclure en isolant la quantité cherchée.

EXEMPLE Encadrement de $\sqrt{101}$

Montrons que $0,0495 \leq \sqrt{101} - 10 \leq 0,05$.

Étape 1. La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $[100; 101]$ (et même sur $]0; +\infty[$), avec $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Étape 2. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante, donc f' est décroissante sur $[100; 101]$. Ainsi, pour tout $x \in [100; 101]$:

$$\frac{1}{2\sqrt{101}} \leq f'(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{100}} = \frac{1}{20} = 0,05.$$

Pour la borne inférieure, on utilise $\sqrt{101} \leq \sqrt{102,01} = 10,1$, d'où, par décroissance de la fonc-

tion inverse sur $]0; +\infty[$:

$$\frac{1}{2\sqrt{101}} \geq \frac{1}{2 \times 10,1} = \frac{1}{20,2} \geq 0,0495 \quad \text{car } 1 \geq 0,0495 \times 20,2 = 0,9999.$$

Étape 3. L'IAF avec $b - a = 1$ donne :

$$0,0495 \leq \sqrt{101} - \sqrt{100} \leq 0,05.$$

Étape 4. Comme $\sqrt{100} = 10$, on obtient $10,0495 \leq \sqrt{101} \leq 10,05$, soit un encadrement d'amplitude 0,0005 — remarquablement précis pour un calcul fait à la main ! (La valeur exacte est $\sqrt{101} \approx 10,04987$: elle est bien dans l'encadrement.)

EXERCICE RÉSOLU 7 Encadrer $\sqrt{101} - 10$ à 10^{-3} près

Énoncé. Soit $f(x) = \sqrt{x}$. En appliquant l'inégalité des accroissements finis à f sur $[100; 101]$, montrer que :

$$0,0497 \leq \sqrt{101} - 10 \leq 0,05.$$

(On admettra que $\sqrt{101} \leq 10,05$.)

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : dérivabilité. f est dérivable sur $]0; +\infty[$, donc en particulier sur $[100; 101]$, et $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Étape 2 : encadrement de f' . La fonction f' est décroissante sur $[100; 101]$ car $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante. Donc pour tout $x \in [100; 101]$:

$$\frac{1}{2\sqrt{101}} \leq f'(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{100}}.$$

D'une part $\frac{1}{2\sqrt{100}} = \frac{1}{20} = 0,05$. D'autre part, de $\sqrt{101} \leq 10,05$ on tire $2\sqrt{101} \leq 20,1$, puis par décroissance de la fonction inverse sur $]0; +\infty[$:

$$\frac{1}{2\sqrt{101}} \geq \frac{1}{20,1} = \frac{10}{201} \geq 0,0497 \quad \text{car } 10 \geq 0,0497 \times 201 = 9,9897.$$

Étape 3 : application de l'IAF. Avec $m = 0,0497$, $M = 0,05$ et $b - a = 1$:

$$0,0497 \times 1 \leq f(101) - f(100) \leq 0,05 \times 1,$$

c'est-à-dire $0,0497 \leq \sqrt{101} - 10 \leq 0,05$. ■

4.5 Application aux suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ (complément Bac)


Voici l'application la plus stratégique de l'IAF au Baccalauréat. On considère une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, et un réel ℓ tel que $f(\ell) = \ell$ (on dit que ℓ est un **point fixe** de f). Supposons que $|f'(x)| \leq k$ sur un intervalle I contenant ℓ et tous les termes de la suite, avec $k < 1$. Alors, pour tout entier n :

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k |u_n - \ell|.$$

Par récurrence immédiate :

$$|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|.$$

Comme $0 \leq k < 1$, $k^n \rightarrow 0$, donc $|u_n - \ell| \rightarrow 0$: **la suite converge vers ℓ** . Mieux : l'inégalité donne la vitesse de convergence — on dit qu'elle est **géométrique** de raison k — et permet de **prévoir le nombre d'itérations** nécessaires pour atteindre une précision donnée.



Toile d'araignée (ou spirale d'escargot) d'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$: quand $|f'| \leq k < 1$ au voisinage du point fixe ℓ , les marches de l'escalier (ou de la spirale) rétrécissent et les termes u_n se rapprochent inexorablement de ℓ .

MÉTHODE

Prouver la convergence d'une suite récurrente par l'IAF

1. Déterminer le point fixe : résoudre $f(\ell) = \ell$.
2. Montrer qu'il existe un intervalle I stable par f (c'est-à-dire $f(I) \subset I$) contenant ℓ et u_0 ; en déduire par récurrence que tous les u_n sont dans I .
3. Montrer que $|f'(x)| \leq k$ sur I avec $k < 1$.
4. Appliquer l'IAF entre u_n et ℓ : $|u_{n+1} - \ell| \leq k |u_n - \ell|$, puis conclure $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Convergence d'une suite récurrente

Énoncé. Soit $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right)$ et la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. On admet que $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ et que $u_n \in [\sqrt{2}; 2]$ pour tout n .

1. Montrer que pour tout $x \in [\sqrt{2}; 2]$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{4}$.
2. En déduire que $|u_n - \sqrt{2}| \leq \frac{2 - \sqrt{2}}{4^n}$ et conclure.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Majoration de $|f'|$. Pour $x > 0$: $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{x^2} \right)$. Sur $[\sqrt{2}; 2]$, la fonction $x \mapsto -\frac{2}{x^2}$ est croissante (car $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est décroissante), donc f' est croissante, avec :

$$f'(\sqrt{2}) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{2} \right) = 0 \quad \text{et} \quad f'(2) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{4} \right) = \frac{1}{4}.$$

Ainsi $0 \leq f'(x) \leq \frac{1}{4}$ sur $[\sqrt{2}; 2]$, donc $|f'(x)| \leq \frac{1}{4}$.

2. Convergence. f est dérivable sur $[\sqrt{2}; 2]$ et $|f'| \leq \frac{1}{4}$: l'IAF appliquée entre u_n et $\sqrt{2}$ (qui appartiennent tous deux à $[\sqrt{2}; 2]$) donne :

$$|u_{n+1} - \sqrt{2}| = |f(u_n) - f(\sqrt{2})| \leq \frac{1}{4} |u_n - \sqrt{2}|.$$

Par récurrence : $|u_n - \sqrt{2}| \leq \left(\frac{1}{4} \right)^n |u_0 - \sqrt{2}| = \frac{2 - \sqrt{2}}{4^n}$. Comme $\frac{1}{4^n} \rightarrow 0$, le théorème des gendarmes donne $|u_n - \sqrt{2}| \rightarrow 0$: la suite converge vers $\sqrt{2}$.

Estimation d'erreur. Pour obtenir $\sqrt{2}$ à 10^{-6} près, il suffit que $\frac{0,6}{4^n} \leq 10^{-6}$, soit $4^n \geq 6 \times 10^5$: $n = 10$ convient largement ($4^{10} > 10^6$). C'est la méthode de Héron, utilisée depuis l'Antiquité pour extraire des racines carrées !

LESAVAIS-TU ? L'IAF, star des problèmes de Bac

L'inégalité des accroissements finis est l'un des outils les plus fréquemment exigés dans les problèmes de Baccalauréat C et E au Cameroun : elle apparaît presque chaque année, le plus souvent dans l'étude d'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ associée à une fonction étudiée dans les questions précédentes. Le schéma « point fixe + majoration de $|f'|$ par $k < 1$ + récurrence » est un grand classique. La méthode de Héron vue ci-dessus était déjà connue des mathématiciens babyloniens il y a près de 4000 ans pour calculer des racines carrées : c'est elle qui, cachée dans les microprocesseurs, permet encore aujourd'hui aux calcula-

trices et aux téléphones d'évaluer $\sqrt{x}$ en une fraction de seconde.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Exercice 1. En appliquant l'IAF à $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[49; 50]$, montrer que $7,070 \leq \sqrt{50} \leq 7,072$ (on admettra $\sqrt{50} \leq 7,1$).

Exercice 2. Soit $f(x) = \frac{1}{3} \cos(x) + 1$ et (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. On admet que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution ℓ dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que pour tout réel x , $|f'(x)| \leq \frac{1}{3}$.
2. En déduire que $|u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{3} |u_n - \ell|$, puis que (u_n) converge vers ℓ .
3. Déterminer un entier n tel que $|u_n - \ell| \leq 10^{-3}$.

CORRIGÉ Exercice 1

f est dérivable sur $[49; 50]$ et $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ est décroissante sur cet intervalle (car $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante). Donc pour tout $x \in [49; 50]$:

$$\frac{1}{2\sqrt{50}} \leq f'(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{49}} = \frac{1}{14}.$$

Pour la borne supérieure : $\frac{1}{14} \leq 0,0715$ car $1 \leq 0,0715 \times 14 = 1,001$.

Pour la borne inférieure : de $\sqrt{50} \leq 7,1$ (admis) on tire $2\sqrt{50} \leq 14,2$, puis, par décroissance de la fonction inverse sur $]0; +\infty[$:

$$\frac{1}{2\sqrt{50}} \geq \frac{1}{14,2} \geq 0,0704 \quad \text{car } 1 \geq 0,0704 \times 14,2 = 0,99968.$$

L'IAF avec $b - a = 1$ donne alors :

$$0,0704 \leq \sqrt{50} - \sqrt{49} \leq 0,0715,$$

c'est-à-dire, puisque $\sqrt{49} = 7$:

$$7,0704 \leq \sqrt{50} \leq 7,0715,$$

ce qui implique a fortiori l'encadrement demandé : $7,070 \leq \sqrt{50} \leq 7,072$. (La valeur exacte est $\sqrt{50} \approx 7,0711$.)

CORRIGÉ Exercice 2

1. $f'(x) = -\frac{1}{3} \sin(x)$, donc $|f'(x)| = \frac{1}{3} |\sin x| \leq \frac{1}{3}$ pour tout réel x .
2. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $|f'| \leq \frac{1}{3}$: par l'IAF appliquée entre u_n et ℓ (avec $f(\ell) = \ell$) :

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq \frac{1}{3} |u_n - \ell|.$$

Par récurrence, $|u_n - \ell| \leq \frac{|u_0 - \ell|}{3^n} = \frac{|\ell|}{3^n}$. Comme $\frac{1}{3^n} \rightarrow 0$, le théorème des gendarmes donne $|u_n - \ell| \rightarrow 0$: (u_n) converge vers ℓ .

3. On peut majorer $|\ell|$: comme $f(x) \in \left[\frac{2}{3}; \frac{4}{3}\right]$ pour tout x , le point fixe vérifie $\ell \in \left[\frac{2}{3}; \frac{4}{3}\right]$, donc $|\ell| \leq \frac{4}{3} \leq 2$. Il suffit alors que $\frac{2}{3^n} \leq 10^{-3}$, soit $3^n \geq 2000$. Or $3^6 = 729 < 2000$ et $3^7 = 2187 \geq 2000$: $n = 7$ convient.

À RETENIR L'essentiel de la section

- IAF : si $m \leq f'(x) \leq M$ sur $[a; b]$, alors $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$.
- Cas lipschitzien : si $|f'(x)| \leq k$, alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b-a|$.
- Suites récurrentes : si $|f'| \leq k < 1$ sur un intervalle stable contenant le point fixe ℓ , alors $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell| \rightarrow 0$.
- Toujours vérifier la dérivabilité et encadrer f' sur l'intervalle exact avant d'appliquer l'IAF.

5 LIMITES USUELLES ET BRANCHES INFINIES

Dans la section précédente, l'inégalité des accroissements finis nous a permis de contrôler finement les variations d'une fonction entre deux points. Mais que se passe-t-il lorsque la variable s'approche d'une valeur interdite, ou lorsqu'elle s'éloigne vers l'infini ? La courbe peut alors « filer » vers le haut, se coller contre une droite horizontale, ou suivre de très près une droite inclinée : ce sont les **branches infinies**. Pour les étudier, nous avons besoin d'une boîte à outils de limites usuelles, notamment trigonométriques et irrationnelles. C'est l'objet de cette section, capitale pour l'étude complète de fonctions au Baccalauréat.

5.1 Limites usuelles des fonctions trigonométriques

Une intuition géométrique. Sur le cercle trigonométrique de rayon 1, prends un angle x (en ra-

dians) petit et positif. La longueur de l'arc correspondant vaut x , tandis que la hauteur du point image sur le cercle vaut $\sin x$. Quand x devient très petit, l'arc et la corde se « confondent » : le rapport $\frac{\sin x}{x}$ doit donc tendre vers 1. C'est cette intuition que formalise le théorème suivant.

PROPRIÉTÉ Limites trigonométriques usuelles

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

On raisonne pour $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$, le cas $x < 0$ s'obtenant par parité (la fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ est paire).

1. Sur le cercle trigonométrique, compare les trois aires : celle du triangle OAM (avec M le point image de x), celle du secteur angulaire d'angle x , et celle du triangle OAT où T est l'intersection de la demi-droite $[OM)$ avec la tangente au cercle en $A(1; 0)$.
2. On obtient : $\frac{1}{2} \sin x \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} \tan x$, c'est-à-dire $\sin x \leq x \leq \tan x$.
3. En divisant par $\sin x > 0$: $1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}$, puis en passant aux inverses (tous les termes sont strictement positifs) :

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1.$$

4. Comme $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, le théorème des gendarmes donne $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Les trois autres limites s'en déduisent algébriquement :

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \times \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 = 1;$$

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2} \times \frac{1}{1 + \cos x} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \times \frac{1}{1 + \cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2};$$

$$\frac{\cos x - 1}{x} = -x \times \frac{1 - \cos x}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \times \frac{1}{2} = 0.$$

MÉTHODE Se ramener à 0 par changement de variable

Pour calculer une limite trigonométrique quand $x \rightarrow a$, on pose $X = x - a$ (alors $X \rightarrow 0$) et on utilise les formules d'addition pour faire apparaître $\sin X$ ou $1 - \cos X$.

EXEMPLE Limites trigonométriques calculées

- a) Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$. On écrit $\frac{\sin 3x}{x} = 3 \times \frac{\sin 3x}{3x}$. En posant $X = 3x$, on a $X \rightarrow 0$, donc la limite vaut $3 \times 1 = 3$.
- b) Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$: c'est la limite usuelle, elle vaut $\frac{1}{2}$.
- c) Calculons $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\cos x}{x - \pi/2}$. Posons $X = x - \frac{\pi}{2}$. Alors $\cos x = \cos\left(X + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin X$, donc le quotient devient $\frac{-\sin X}{X} \rightarrow -1$.

ATTENTION Radians obligatoires

Ces limites ne sont valables que si x est exprimé en **radians**. De plus, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ne se généralise pas naïvement : $\frac{\sin 3x}{x}$ tend vers 3, pas vers 1. Pense toujours à faire apparaître exactement le même argument au numérateur et au dénominateur.

5.2 Limites des fonctions irrationnelles

Le problème. Une fonction comme $f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$ donne, en $+\infty$, une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Deux techniques permettent de lever l'indétermination.

MÉTHODE Quantité conjuguée pour les formes $\sqrt{u} - \sqrt{v}$

1. Multiplie numérateur et dénominateur par la **quantité conjuguée** $\sqrt{u} + \sqrt{v}$.
2. Utilise l'identité $(\sqrt{u} - \sqrt{v})(\sqrt{u} + \sqrt{v}) = u - v$.
3. La nouvelle expression n'est en général plus indéterminée : conclus.

EXEMPLE Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}.$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + x} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x}}$, donc

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + x} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

MÉTHODE Factorisation par le terme prépondérant en $\pm\infty$

Sous un radical, factorise le terme dominant, puis sors-le de la racine en n'oubliant pas la valeur absolue : pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 u(x)} = x\sqrt{u(x)}$; pour $x < 0$, $\sqrt{x^2 u(x)} = -x\sqrt{u(x)}$. Cette étape est indispensable avant tout calcul de $\frac{f(x)}{x}$.

ATTENTION Le piège de la valeur absolue

Pour $x \rightarrow -\infty$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ et non x . Ainsi $\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{|x|\sqrt{1 + 1/x^2}}{x}$ tend vers 1 en $+\infty$ mais vers -1 en $-\infty$. Oublier cela fausse toute l'étude des branches infinies.

5.3 Branches infinies : asymptotes verticales et horizontales


Lorsqu'une courbe « s'échappe » à l'infini, elle peut le faire en se rapprochant indéfiniment d'une droite. Cette droite est appelée **asymptote**.

DÉFINITION Asymptote verticale

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (limite à gauche ou à droite), alors la droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe C_f .

DÉFINITION Asymptote horizontale

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ (ou en $-\infty$) avec b réel, alors la droite d'équation $y = b$ est **asymptote horizontale** à C_f en $+\infty$ (resp. $-\infty$).



L'hyperbole $y = \frac{x}{x-2}$: asymptote verticale $x = 2$ (la limite est infinie) et asymptote horizontale $y = 1$ (la limite en $\pm\infty$ vaut 1).

5.4 Asymptote oblique

Intuition. Quand $f(x)$ se comporte en $+\infty$ « presque comme » une fonction affine $ax+b$, la courbe se plaque contre la droite $y = ax + b$: l'écart vertical $f(x) - (ax + b)$ tend vers 0.

DÉFINITION Asymptote oblique

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (ou en $-\infty$), avec $a \neq 0$, alors la droite d'équation $y = ax + b$ est **asymptote oblique** à C_f .

MÉTHODE Détermination d'une asymptote oblique

1. Calcule $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$. Si a est un réel non nul, continue ; si $a = 0$ et f a une limite finie, c'est une asymptote horizontale ; si $a = \pm\infty$, c'est une branche parabolique de direction (Oy) .
2. Calcule $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax]$. Si b est un réel fini, alors $y = ax + b$ est asymptote oblique.
3. Position relative : étudie le signe de $f(x) - (ax + b)$. S'il est positif au voisinage de l'infini, C_f est au-dessus de l'asymptote ; s'il est négatif, elle est en dessous.

ATTENTION Le piège classique du Bac

Il ne suffit pas que $\frac{f(x)}{x}$ ait une limite finie a pour conclure à une asymptote oblique ! Il faut

encore vérifier que $f(x) - ax$ a une limite finie. Contre-exemple : $f(x) = x + \sqrt{x}$. On a $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 1$, mais $f(x) - x = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$: il n'y a pas d'asymptote oblique, seulement une **direction asymptotique** de pente 1 (branche parabolique de direction la droite $y = x$).

EXERCICE RÉSOLU 9

Asymptotes de $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x + 1}$

Énoncé. Soit $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x + 1}$. Déterminer toutes les asymptotes de C_f et préciser la position relative de la courbe par rapport à son asymptote oblique.

SOLUTION

Solution. f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Asymptote verticale. En -1 , le numérateur vaut $2 + 3 + 1 = 6 \neq 0$ et le dénominateur s'annule : $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.

Asymptote oblique. En $\pm\infty$, $f(x)$ se comporte comme $\frac{2x^2}{x} = 2x$, donc

$$a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x} = 2.$$


Ensuite :

$$f(x) - 2x = \frac{2x^2 - 3x + 1 - 2x(x + 1)}{x + 1} = \frac{-5x + 1}{x + 1} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} -5.$$

Donc $b = -5$: la droite $y = 2x - 5$ est asymptote oblique en $+\infty$ et en $-\infty$.

Position relative. $f(x) - (2x - 5) = \frac{-5x + 1}{x + 1} + 5 = \frac{-5x + 1 + 5x + 5}{x + 1} = \frac{6}{x + 1}$.

- Si $x > -1$ (en particulier en $+\infty$), $\frac{6}{x + 1} > 0$: la courbe est au-dessus de son asymptote.
- Si $x < -1$ (en particulier en $-\infty$), $\frac{6}{x + 1} < 0$: la courbe est en dessous de son asymptote.



La courbe de $f(x) = \frac{x^2 + x}{x - 1}$: asymptote verticale $x = 1$ et asymptote oblique $y = x + 2$. Comme $f(x) - (x + 2) = \frac{2}{x - 1}$, la courbe est au-dessus de l'asymptote pour $x > 1$ et en dessous pour $x < 1$.

5.5 Directions asymptotiques et branches paraboliques

Que faire quand le plan d'étude en deux étapes échoue ? On distingue deux situations.


DÉFINITION Branche parabolique

Soit f définie au voisinage de $+\infty$ (ou $-\infty$).

- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ (réel) mais $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \pm\infty$, on dit que C_f admet une **branche parabolique de direction** la droite $y = ax$.
- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$, on dit que C_f admet une **branche parabolique de direction** l'axe (Oy) .

EXEMPLE Deux branches paraboliques de référence

- $f(x) = \sqrt{x}$ en $+\infty$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$ et $f(x) \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction l'axe (Ox) (la pente tend vers 0 mais la courbe monte sans fin).
- $f(x) = x^2$ en $+\infty$: $\frac{f(x)}{x} = x \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) (la courbe monte de plus en plus verticalement).



Trois comportements à l'infini : $y = \sqrt{x}$ s'écrase lentement (branche parabolique de direction (Ox)), $y = x^2$ se redresse (direction (Oy)), tandis qu'une courbe à asymptote oblique se plaque contre sa droite.

5.6 Tableau récapitulatif des six cas de branches infinies

À RETENIR Les six cas à connaître par cœur

Hypothèse sur la limite	Conclusion	Nature
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	Droite $x = a$	Asymptote verticale
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$	Droite $y = b$	Asymptote horizontale
$\lim [f(x) - (ax + b)] = 0, a \neq 0$	Droite $y = ax + b$	Asymptote oblique
$\lim \frac{f(x)}{x} = 0$ et $\lim f(x) = \pm\infty$	Direction $y = 0$	Branche parabolique de direction (Ox)
$\lim \frac{f(x)}{x} = a \neq 0$ et $\lim [f(x) - ax] = \pm\infty$	Direction $y = ax$	Branche parabolique de direction $y = ax$
$\lim \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$	Direction (Oy)	Branche parabolique de direction (Oy)

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Soit $g(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x + 2}$ et $h(x) = \sqrt{x^2 - 4} + x$.

- Montrer que la droite $y = x + 1$ est asymptote oblique à C_g et préciser la position relative.

2. Étudier les branches infinies de h en $+\infty$ et en $-\infty$ (on montrera en particulier que $y = 2x$ est asymptote en $+\infty$ et $y = 0$ asymptote en $-\infty$).

CORRIGÉ Exercice : branches infinies

1. $\frac{g(x)}{x} = \frac{x^2 + 3x - 1}{x^2 + 2x} \rightarrow 1$, donc $a = 1$. Puis $g(x) - x = \frac{x^2 + 3x - 1 - x(x + 2)}{x + 2} = \frac{x - 1}{x + 2} \rightarrow 1$, donc $b = 1$: $y = x + 1$ est asymptote oblique en $\pm\infty$. Position : $g(x) - (x + 1) = \frac{x - 1}{x + 2} - 1 = \frac{-3}{x + 2}$. Pour $x > -2$, la courbe est en dessous ; pour $x < -2$, elle est au-dessus.

2. En $+\infty$: $\frac{h(x)}{x} = \sqrt{1 - \frac{4}{x^2}} + 1 \rightarrow 2$, et $h(x) - 2x = \sqrt{x^2 - 4} - x = \frac{-4}{\sqrt{x^2 - 4} + x} \rightarrow 0$ (quantité conjuguée) : $y = 2x$ est asymptote oblique, et comme $h(x) - 2x < 0$, la courbe est en dessous.

En $-\infty$: par quantité conjuguée, $h(x) = \frac{(\sqrt{x^2 - 4} + x)(\sqrt{x^2 - 4} - x)}{\sqrt{x^2 - 4} - x} = \frac{-4}{\sqrt{x^2 - 4} - x} \rightarrow 0$ car le dénominateur tend vers $+\infty$ (on a $\sqrt{x^2 - 4} \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$) : $y = 0$ est asymptote horizontale en $-\infty$.

LES AVAIS-TU ? Les asymptotes dans la vie courante

Les asymptotes ne sont pas qu'un jeu de mathématiciens ! En économie, le coût unitaire de production d'une entreprise de Douala diminue quand la quantité produite augmente, mais sans jamais descendre sous un certain seuil : il admet une asymptote horizontale. En physique, la vitesse d'un parachutiste tend vers une vitesse limite sans jamais la dépasser : là encore, une asymptote horizontale. Et la courbe de charge d'un réseau mobile en heure de pointe peut présenter des branches quasi verticales : les ingénieurs de MTN ou Orange doivent anticiper ces « explosions » de trafic.

Tu disposes maintenant de tous les outils : limites usuelles, quantité conjuguée, recherche d'asymptotes et étude des positions relatives. Il ne reste plus qu'à assembler ces pièces dans la dernière section, consacrée à l'étude complète de fonctions et au tracé de leurs courbes.

6 ÉTUDE COMPLÈTE DE FONCTIONS ET TRACÉ DE COURBES

Dans la section précédente, tu as appris à traquer les **branches infinies** : asymptotes verticales, horizontales, obliques, directions asymptotiques. Ces outils, ajoutés au calcul de limites, à la dérivation, au théorème des valeurs intermédiaires et à l'inégalité des accroissements finis, forment désormais une boîte à outils complète. Il est temps de tout assembler : c'est l'objet de cette dernière section, qui est aussi la compétence reine du problème de Baccalauréat. Une **étude**

complète de fonction, c'est l'enquête méthodique qui mène d'une formule $f(x)$ à une courbe fidèle, cohérente et exploitable. Suivons le plan, étape par étape.

6.1 Le plan type d'une étude complète

MÉTHODE Les 8 étapes du plan d'étude — fiche à mémoriser pour le Bac

1. Ensemble de définition D_f : repérer les valeurs interdites (dénominateur nul, quantité sous une racine carrée négative, argument de logarithme non positif, etc.) et écrire D_f comme réunion d'intervalles.
2. Restriction du domaine d'étude : tester la parité ($f(-x) = f(x)$: fonction paire ; $f(-x) = -f(x)$: impaire) et la périodicité ($f(x+T) = f(x)$). On étudie alors sur un domaine réduit.
3. Limites aux bornes de D_f : calculer et justifier chaque limite (bornes finies ouvertes, $+\infty$, $-\infty$).
4. Continuité et dérivabilité : justifier sur chaque intervalle de D_f (fonction rationnelle, composée, etc.).
5. Dérivée et signe de f' : calculer $f'(x)$, factoriser, dresser le tableau de signes.
6. Tableau de variations complet : y reporter le signe de f' , les limites calculées à l'étape 3 et les valeurs remarquables (extremums).
7. Branches infinies et asymptotes : déduire des limites les asymptotes verticales, horizontales, obliques ; étudier la position relative courbe/asymptote par le signe de $f(x) - (ax + b)$.
8. Points remarquables et tracé : intersections avec les axes, tangentes horizontales, demi-tangentes (points anguleux), puis tracé soigné cohérent avec le tableau.

MÉTHODE Exploiter parité et périodicité pour restreindre le domaine

1. Vérifier d'abord que D_f est symétrique par rapport à 0 (sinon, ni parité ni imparité possibles).
2. Si f est paire : étudier sur $D_f \cap [0; +\infty[$, puis compléter la courbe par symétrie d'axe (Oy) .
3. Si f est impaire : étudier sur $D_f \cap [0; +\infty[$, puis compléter par symétrie de centre O .
4. Si f est T -périodique : étudier sur un intervalle d'amplitude T (par exemple $[0; T]$ ou $[-T/2; T/2]$), puis compléter par translations de vecteur $kT\vec{i}$, $k \in \mathbb{Z}$.
5. Parité + périodicité : on peut souvent réduire l'étude à $[0; T/2]$.

ATTENTION Les trois fautes qui coûtent cher

- Oublier une valeur interdite : si $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$, écrire $D_f = \mathbb{R}$ est une faute éliminatoire dès la première ligne : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- Tracer la courbe qui traverse une asymptote verticale : la courbe ne touche jamais une asymptote verticale ; elle « file » vers $+\infty$ ou $-\infty$ de part et d'autre.
- Incohérence tracé / tableau : si le tableau annonce une fonction croissante de $-\infty$ vers 3, la courbe ne peut pas redescendre ni dépasser 3. Le correcteur vérifie toujours cette cohérence.

ATTENTION Règle d'or de rédaction au Bac

Toute limite qui apparaît dans le tableau de variations doit avoir été calculée et justifiée dans une question précédente. Un tableau contenant une limite non démontrée est sanctionné, même si la valeur est exacte. Rédige donc les calculs de limites avant de dresser le tableau.

6.2 Étude complète d'une fonction rationnelle avec asymptote oblique

EXEMPLE Étude guidée de $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$

Étape 1 — Ensemble de définition. Le dénominateur s'annule en $x = 1$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty ; 1[\cup]1 ; +\infty[$.

Étape 2 — Parité. D_f n'est pas symétrique par rapport à 0 : pas de réduction possible.

Étape 3 — Limites. En 1 : le numérateur vaut $1 - 2 + 2 = 1 > 0$. Donc

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = +\infty.$$

En l'infini, $f(x) \sim \frac{x^2}{x} = x$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Étape 4 — Dérivabilité. f est une fonction rationnelle : elle est continue et dérivable sur chaque intervalle de D_f .

Étape 5 — Dérivée. Avec $u = x^2 - 2x + 2$ et $v = x - 1$:

$$f'(x) = \frac{(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x + 2)}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}.$$

Le dénominateur est strictement positif sur D_f : le signe de f' est celui de $x(x - 2)$. Donc $f' > 0$ sur $]-\infty ; 0[$ et $]2 ; +\infty[$, $f' < 0$ sur $]0 ; 1[$ et $]1 ; 2[$. Extremums : $f(0) = -2$ (maximum local) et $f(2) = 2$ (minimum local).

Étape 6 — Tableau de variations.


x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$						
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\parallel$	$-$	0	$+$			
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$-\infty$	$\parallel$	$+\infty$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

Étape 7 — Branches infinies. La droite $x = 1$ est asymptote verticale. Pour l'infini, effectuons la division euclidienne : $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)(x - 1) + 1$, d'où

$$f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 1}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (x - 1)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 1} = 0$, la droite d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique. Position relative : $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1}$, positif si $x > 1$ (courbe au-dessus), négatif si $x < 1$ (courbe en dessous).

Étape 8 — Tracé. La courbe coupe (Oy) en $(0; -2)$, admet des tangentes horizontales en $x = 0$ et $x = 2$, et ne coupe pas (Ox) (le numérateur $x^2 - 2x + 2$ a pour discriminant $-4 < 0$).



Courbe de $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$: asymptote verticale $x = 1$, asymptote oblique $y = x - 1$, maximum local -2 en 0 , minimum local 2 en 2 .

6.3 Étude d'une fonction irrationnelle : demi-tangentes verticales

EXERCICE RÉSOLU 10

Étude de $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

Étudier complètement f et tracer sa courbe.

SOLUTION

Ensemble de définition. Il faut $x^2 - 4 \geq 0$, soit $|x| \geq 2$: $D_f =]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$.

Parité. $f(-x) = \sqrt{(-x)^2 - 4} = f(x)$: f est paire. On étudie sur $[2; +\infty[$ et on complète par symétrie d'axe (Oy) .

Limites. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 4} = +\infty$. En 2 : $f(2) = 0$ (fonction continue à droite).

Dérivabilité. f est dérivable là où $x^2 - 4 > 0$, c'est-à-dire sur $]2; +\infty[$. Attention : en $x = 2$, la quantité sous la racine s'annule, f n'est pas dérivable en 2 au sens usuel. Étudions le taux d'accroissement :

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 2} = \frac{\sqrt{(x-2)(x+2)}}{x-2} = \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} \xrightarrow{x \rightarrow 2^+} +\infty.$$

La courbe admet donc en $(2; 0)$ une **demi-tangente verticale** dirigée vers le haut. Par parité, demi-tangente verticale aussi en $(-2; 0)$.


Dérivée et variations. Pour $x > 2$: $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} > 0$. Donc f est strictement croissante sur $[2; +\infty[$, de 0 vers $+\infty$.

Branches infinies. Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 - 4} = x\sqrt{1 - \frac{4}{x^2}}$, donc

$$f(x) - x = x\left(\sqrt{1 - \frac{4}{x^2}} - 1\right) = \frac{-4x}{x^2\left(\sqrt{1 - \frac{4}{x^2}} + 1\right)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

La droite $y = x$ est asymptote en $+\infty$, et par parité $y = -x$ est asymptote en $-\infty$: la courbe a pour branche asymptotique la droite $y = |x|$. Comme $f(x) - x < 0$ pour $x > 2$, la courbe est en dessous de son asymptote.

Tracé. Voir la figure ci-dessous : la courbe est la partie supérieure de l'hyperbole équilatère $x^2 - y^2 = 4$.



Courbe de $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$: demi-tangentes verticales en $(\pm 2; 0)$, asymptotes $y = x$ en $+\infty$ et $y = -x$ en $-\infty$.

ATTENTION Demi-tangente verticale : le piège des fonctions racines

Pour $g(x) = \sqrt{u(x)}$, la dérivée $g'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$ n'existe que si $u(x) > 0$. Aux bornes où u s'annule, ne conclus jamais trop vite : calcule la limite du taux d'accroissement. Si elle est infinie, il y a une demi-tangente verticale (la courbe « démarre » à la verticale), et non une tangente horizontale.

6.4 Étude d'une fonction trigonométrique

EXERCICE RÉSOLU 11 Étude de $f(x) = x + \sin x$ sur $[-2\pi; 2\pi]$

Étudier f et tracer sa courbe.

SOLUTION

Domaine et symétrie. f est définie sur $\mathbb{R}$. De plus $f(-x) = -x - \sin x = -f(x)$: f est impaire. On étudie sur $[0; 2\pi]$ et on complète par symétrie de centre O .


Dérivée. $f'(x) = 1 + \cos x \geq 0$ pour tout x , et $f'(x) = 0$ uniquement lorsque $\cos x = -1$, c'est-à-dire en $x = \pi$ (sur $[0; 2\pi]$). La dérivée ne s'annule qu'en un point isolé sans changer de signe : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec une tangente horizontale au point $(\pi; \pi)$ — c'est un point d'inflexion à tangente horizontale.

Valeurs et limites. $f(0) = 0$, $f(\pi) = \pi \approx 3,14$, $f(2\pi) = 2\pi \approx 6,28$. Sur $\mathbb{R}$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ car $f(x) \geq x - 1$.

Branches infinies. $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ et $f(x) - x = \sin x$ n'a pas de limite : la droite $y = x$ est

une direction asymptotique (la courbe ondule autour de $y = x$ sans s'en rapprocher), mais pas une asymptote au sens strict.

Tracé. La courbe suit globalement la droite $y = x$, avec des tangentes horizontales en tous les points $(\pi + 2k\pi; \pi + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.



Courbe de $f(x) = x + \sin x$ sur $[-2\pi; 2\pi]$: croissante, elle ondule autour de la direction asymptotique $y = x$ avec des tangentes horizontales en $\pm\pi$.

6.5 Exploitation d'une étude : équations et fonction réciproque

Une étude complète n'est pas une fin en soi : elle sert à répondre à des questions. Les deux exploitations classiques au Bac sont les suivantes.

Résolution d'équations. Le tableau de variations, combiné au **théorème des valeurs intermédiaires**, permet de dénombrer et d'encadrer les solutions de $f(x) = c$.

EXEMPLE Application du TVI avec la fonction rationnelle étudiée

Reprenons $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. Montrons que l'équation $f(x) = 3$ admet une unique solution α dans $]1; +\infty[$. Sur $]1; 2]$, f est continue et strictement décroissante de $+\infty$ vers 2 ; or $3 \in]2; +\infty[$, donc le TVI garantit une unique solution dans $]1; 2]$. Sur $[2; +\infty[$, f est strictement croissante de 2 vers $+\infty$: le TVI donne une seconde solution. Bilan : exactement deux solutions sur $]1; +\infty[$. Comme $f(1,5) = \frac{2,25 - 3 + 2}{0,5} = 2,5 < 3$ et $f(1,3) \approx 3,63 > 3$, on encadre la première : $\alpha \in]1,3; 1,5[$.

Courbe de la réciproque. Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $J = f(I)$, et la courbe de f^{-1} s'obtient par **symétrie d'axe** $y = x$. Par exemple, $f(x) = x + \sin x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ avec $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$: elle admet une réci-

proque $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable partout sauf aux points images des tangentes horizontales, où $(f^{-1})'$ « explose » (demi-tangentes verticales en $\pi + 2k\pi$).

MÉTHODE Tracer la courbe de f^{-1} à partir de celle de f

1. Justifier que f est continue et strictement monotone sur I (tableau de variations).
2. Déterminer $J = f(I)$ grâce aux limites du tableau.
3. Tracer la droite $y = x$ en pointillés.
4. Reporter les points remarquables : $(a; b) \in C_f \iff (b; a) \in C_{f^{-1}}$.
5. Les asymptotes se transposent : une asymptote horizontale $y = c$ pour f devient une asymptote verticale $x = c$ pour f^{-1} .

LESAVAIS-TU ? La répétition générale du problème de Bac

Aux Baccalauréats C et E, le « problème » de l'épreuve de mathématiques se termine presque toujours par une étude complète de fonction : on y mobilise successivement le calcul de limites, le TVI pour localiser une solution α , l'inégalité des accroissements finis pour encadrer une valeur, la recherche d'asymptotes, puis le tracé final de la courbe — parfois accompagné de celui de la réciproque. Cette section est donc ta répétition générale : chaque étude que tu rédiges à l'entraînement doit suivre les 8 étapes de la fiche méthode, sans exception. Le jour de l'examen, tu ne réfléchiras plus au plan : tu l'appliqueras, et tu gagneras un temps précieux pour soigner la rédaction et le graphique.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

Soit $g(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

1. Déterminer D_g , montrer que g est impaire et restreindre le domaine d'étude.
2. Calculer les limites aux bornes et en déduire les asymptotes.
3. Montrer que $g'(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$ et dresser le tableau de variations.
4. Montrer que g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1; 1[$ et préciser les asymptotes de la courbe de g^{-1} .
5. Tracer C_g et $C_{g^{-1}}$ dans un même repère.

EXERCICE 7 Fonction trigonométrique

Soit $h(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$.

1. Montrer que h est définie sur $\mathbb{R}$, impaire et 2π -périodique. Justifier qu'on peut étudier h sur $[0; \pi]$.
2. Calculer $h'(x)$ et montrer que $h'(x) = \frac{2 \cos x + 1}{(2 + \cos x)^2}$.
3. Dresser le tableau de variations sur $[0; \pi]$ (on utilisera $\cos x = -\frac{1}{2} \iff x = \frac{2\pi}{3}$).
4. Tracer la courbe sur $[-2\pi; 2\pi]$ en complétant par symétrie puis par translations.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON M03 : ÉTUDE DE FONCTIONS NUMÉRIQUES — ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : LE FORAGE DE BAFOUSSAM

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mener l'**étude complète** d'une fonction rationnelle (ensemble de définition, dérivée, variations, limites, **branches infinies**) et interpréter concrètement une **asymptote oblique** ;
- démontrer l'**existence** et l'**unicité** d'une solution de l'équation $C(x) = c$ grâce au **théorème des valeurs intermédiaires** (TVI), puis l'encadrer par **dichotomie** ;
- justifier qu'une fonction réalise une **bijection** et exploiter sa **fonction réciproque**, notamment la formule de la **dérivée de la réciproque** sans expliciter C^{-1} ;
- utiliser l'**inégalité des accroissements finis** (IAF) pour majorer un accroissement et valider ou invalider une affirmation pratique ;
- tracer une courbe et déduire l'allure de la courbe de la fonction réciproque par **symétrie** par rapport à la droite d'équation $y = x$.

8.2 Situation

La commune de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, connaît une croissance démographique rapide. Pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les quartiers périphériques (Tougang, Banengo, Djeleng), la mairie lance un programme de **forages** (puits profonds équipés de pompes). Le bureau d'études retenu a établi, à partir de forages comparables réalisés dans la région, un modèle de coût.

On désigne par x la **profondeur** du forage, exprimée en **dizaines de mètres** (ainsi $x = 3$ correspond à 30 m), et par $C(x)$ le **coût total** du forage, exprimé en **centaines de milliers de FCFA** (ainsi $C(x) = 15$ correspond à 1500000 FCFA). Le modèle retenu est :

$$C(x) = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 1}, \quad x \geq 1.$$

La mairie dispose, pour le premier forage pilote du quartier Tougang, d'une enveloppe de 1500000 FCFA. Un sous-traitant local affirme par ailleurs que « faire passer un forage de 30 m à 40 m coûte au plus 1,2 fois le coût d'une dizaine de mètres supplémentaires, c'est-à-dire au plus 120000 FCFA de surcoût ». La mairie te missionne, toi et ton groupe, pour éclairer sa décision à l'aide des outils mathématiques de Terminale.

8.3 Consignes

Travail en groupes de quatre. Chaque groupe rédigera un rapport et préparera une affiche com-

portant le tracé des courbes.

Partie A : étude du modèle de coût

1. Justifier que C est définie et dérivable sur $[1; +\infty[$. Montrer que pour tout $x \geq 1$:

$$C(x) = x + 1 + \frac{3}{x+1}.$$

2. Calculer $C'(x)$, étudier son signe sur $[1; +\infty[$ et dresser le tableau de variations complet de C (avec les limites aux bornes).
3. Déterminer les limites de C en $+\infty$, puis montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x + 1$ est **asymptote oblique** à la courbe (C) de C . Préciser la position relative de (C) et (Δ) . Interpréter cette asymptote en termes de « coût de structure » pour un forage très profond.

Partie B : le budget de la mairie

4. Démontrer, à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation $C(x) = 15$ admet une **unique** solution α dans $[1; +\infty[$.
5. Par dichotomie (ou balayage), donner un encadrement de α à 10^{-1} près. En déduire la profondeur maximale, en mètres, que la mairie peut financer avec son enveloppe.

Partie C : la fonction réciproque, outil du planificateur

6. Justifier que C réalise une bijection de $[1; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser. Que représente concrètement $C^{-1}(y)$ pour la mairie ?
7. Sans expliciter C^{-1} , calculer $(C^{-1})'(15)$. Interpréter ce nombre : de combien varie approximativement la profondeur finançable lorsque le budget augmente de 100000 FCFA au voisinage de 1500000 FCFA ?

Partie D : l'affirmation du sous-traitant

8. Montrer que C' est croissante sur $[3; 4]$ et en déduire que pour tout $x \in [3; 4]$, $C'(x) \leq \frac{22}{25}$.
9. À l'aide de l'inégalité des accroissements finis, majorer $C(4) - C(3)$. L'affirmation du sous-traitant est-elle fondée ? Comparer avec la valeur exacte de $C(4) - C(3)$.

Partie E : restitution graphique

10. Tracer soigneusement (C) , l'asymptote (Δ) et la droite d'équation $y = x$ dans un repère orthonormé (unité : 0,5 cm par unité). Placer le point d'abscisse α .
11. En déduire, par symétrie, l'allure de la courbe de C^{-1} . Présenter l'affiche au conseil de classe.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de l'activité

- TVI (bijection) : si f est **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I , alors f réalise une bijection de I sur $f(I)$; l'équation $f(x) = c$ admet une unique solution dans I

dès que $c \in f(I)$.

- Dérivée de la réciproque : si f est une bijection dérivable et $f'(x_0) \neq 0$, alors $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ avec $y_0 = f(x_0)$.
- IAF : si $|f'(x)| \leq M$ sur $[a; b]$, alors $|f(b) - f(a)| \leq M |b - a|$.
- Asymptote oblique : si $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$ en $+\infty$, la droite $y = ax + b$ est asymptote à la courbe.
- Symétrie : les courbes de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 12 Forage de Bafoussam : corrigé complet

On considère $C(x) = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 1}$ pour $x \geq 1$. Questions : étude de C , résolution de $C(x) = 15$, étude de C^{-1} , majoration de $C(4) - C(3)$, tracés.

SOLUTION

Partie A. 1. Le dénominateur $x + 1$ ne s'annule pas sur $[1; +\infty[$ (car $x + 1 \geq 2$), donc C , fonction rationnelle, y est définie, continue et dérivable. En effectuant la division euclidienne du numérateur par le dénominateur :

$$x^2 + 2x + 4 = (x + 1)(x + 1) + 3,$$

d'où, pour tout $x \geq 1$,

$$C(x) = x + 1 + \frac{3}{x + 1}.$$

2. On dérive cette forme simplifiée :

$$C'(x) = 1 - \frac{3}{(x + 1)^2} = \frac{(x + 1)^2 - 3}{(x + 1)^2}.$$

Pour $x \geq 1$, on a $x + 1 \geq 2$, donc $(x + 1)^2 \geq 4 > 3$. Le numérateur est strictement positif, le dénominateur aussi, donc $C'(x) > 0$ sur $[1; +\infty[$. La fonction C est strictement croissante sur $[1; +\infty[$. On calcule $C(1) = \frac{1 + 2 + 4}{2} = \frac{7}{2} = 3,5$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = +\infty$ (car $x + 1 \rightarrow +\infty$ et $\frac{3}{x + 1} \rightarrow 0$).

x	1	$+\infty$
$C'(x)$	+	
$C(x)$	$\frac{7}{2}$	$+\infty$

3. On a $C(x) - (x + 1) = \frac{3}{x+1}$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x+1} = 0$, la droite (Δ) d'équation $y = x + 1$ est **asymptote oblique** à la courbe (C) en $+\infty$. Puisque $\frac{3}{x+1} > 0$ pour tout $x \geq 1$, on a $C(x) > x + 1$: la courbe (C) est au-dessus de son asymptote (Δ) . Interprétation économique : pour un forage très profond ($x \rightarrow +\infty$), le terme $\frac{3}{x+1}$ (représentant les frais fixes amortis sur la profondeur) devient négligeable. Le coût marginal tend vers la pente de l'asymptote, soit 1 centaine de milliers de FCFA par dizaine de mètres supplémentaire : c'est le « coût de structure » du forage.

Partie B. 4. D'après la question 2, C est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[1; +\infty[$. Elle réalise donc une bijection de $[1; +\infty[$ sur son ensemble image $J = \left[\frac{7}{2}; +\infty\right[$. Or $15 \in J$ car $15 > 3,5$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires (version bijection), l'équation $C(x) = 15$ admet une unique solution α dans $[1; +\infty[$.

5. On encadre α par dichotomie (valeurs approchées au millième) :

$$C(13) = 14 + \frac{3}{14} \approx 14,214 < 15,$$

$$C(14) = 15 + \frac{3}{15} = 15,2 > 15, \quad \text{donc } \alpha \in [13; 14].$$

$$C(13,7) = 14,7 + \frac{3}{14,7} \approx 14,904 < 15,$$

$$C(13,8) = 14,8 + \frac{3}{14,8} \approx 15,003 > 15, \quad \text{donc } \alpha \in [13,7; 13,8].$$

On a $13,7 < \alpha < 13,8$. La profondeur maximale finançable est d'environ 137 m (on retient 137 m par sécurité pour ne pas dépasser le budget).

Partie C. 6. D'après la question 4, C est une bijection de $[1; +\infty[$ sur $J = \left[\frac{7}{2}; +\infty\right[$. Sa fonction réciproque C^{-1} est définie sur J et associe à tout budget y (en centaines de milliers de FCFA) la profondeur exacte (en dizaines de mètres) du forage réalisable. C'est l'outil de planification de la mairie : « quel budget pour quelle profondeur ? » devient « quelle profondeur pour quel budget ? ».

7. C est dérivable sur $[1; +\infty[$ et $C'(x) > 0$ partout, en particulier $C'(\alpha) \neq 0$. La fonction réciproque C^{-1} est donc dérivable en 15 et la formule de la dérivée de la réciproque donne :

$$(C^{-1})'(15) = \frac{1}{C'(\alpha)}.$$

On détermine α exactement. L'équation $C(x) = 15$ s'écrit $x + 1 + \frac{3}{x+1} = 15$. En posant $t = x + 1$ ($t \geq 2$), on obtient $t + \frac{3}{t} = 15$, soit $t^2 - 15t + 3 = 0$. Le discriminant est $\Delta = 225 - 12 = 213$. Les racines sont $t = \frac{15 \pm \sqrt{213}}{2}$. Comme $t \geq 2$, on garde $t = \frac{15 + \sqrt{213}}{2} \approx 14,797$ (l'autre racine $\approx 0,203$ est rejetée). Alors $C'(\alpha) = 1 - \frac{3}{t^2}$. Numériquement, $t^2 \approx 218,95$, donc $\frac{3}{t^2} \approx 0,0137$ et $C'(\alpha) \approx 0,9863$. Finalement $(C^{-1})'(15) \approx \frac{1}{0,9863} \approx 1,014$. Interprétation : au voisinage de 1500000 FCFA, une augmentation du budget de 100000 FCFA (soit 1 unité sur l'axe des ordonnées) permet de gagner environ 1,014 dizaines de mètres, soit environ 10,1 m de profondeur supplémentaire.

Partie D. 8. On dérive C' : $C''(x) = \frac{6}{(x+1)^3}$. Sur $[3; 4]$, $x+1 > 0$ donc $C''(x) > 0$: C' est strictement croissante sur $[3; 4]$. Son maximum est atteint en $x = 4$:


$$\forall x \in [3; 4], \quad C'(x) \leq C'(4) = 1 - \frac{3}{25} = \frac{22}{25} = 0,88.$$

9. On applique l'inégalité des accroissements finis à C sur $[3; 4]$. Comme $C' > 0$, $C(4) - C(3) = |C(4) - C(3)| \leq \max_{[3,4]} |C'| \times (4 - 3) \leq \frac{22}{25} \times 1 = 0,88$. Le surcoût est donc majoré par 0,88 centaines de milliers de FCFA, soit 88000 FCFA. Cette valeur est bien inférieure à 120000 FCFA (1,2 unités) : l'affirmation du sous-traitant est fondée (et même prudente).
Vérification exacte : $C(3) = \frac{9+6+4}{4} = \frac{19}{4} = 4,75$ et $C(4) = \frac{16+8+4}{5} = \frac{28}{5} = 5,6$, donc $C(4) - C(3) = 0,85$, soit 85000 FCFA. On confirme $0,85 \leq 0,88$.

Partie E. 10. On place dans un repère orthonormé (unité 0,5 cm) :

- la droite $(\Delta) : y = x + 1$ (pointillés orange) ;
- la droite $y = x$ (pointillés gris) ;
- des points de $(C) : (1; 3,5), (3; 4,75), (4; 5,6), (\alpha; 15)$ avec $\alpha \approx 13,8$;
- la courbe (C) , strictement croissante, concave (car $C'' > 0$), au-dessus de (Δ) et la frôlant.

11. La courbe de C^{-1} s'obtient par symétrie par rapport à la droite $y = x$: elle part de $(3,5; 1)$, passe par $(4,75; 3), (5,6; 4), (15; \alpha)$, et admet pour asymptote la symétrique de (Δ) , c'est-à-dire la droite d'équation $y = x - 1$ (pointillés verts).



En bleu, la courbe (C) de C et son asymptote oblique $(\Delta) : y = x + 1$ (orange); en vert, la courbe de C^{-1} et son asymptote $y = x - 1$, symétriques par rapport à la droite $y = x$ (gris).

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- le **TVI** est l'outil qui transforme une question concrète (« ce budget suffit-il ? ») en un théorème d'existence et d'unicité, la stricte monotonie étant la clé de l'unicité ;
- la **fonction réciproque** n'est pas un objet abstrait : c'est l'instrument du décideur, qui lit la profondeur en fonction du budget, et sa dérivée se calcule sans jamais l'explicitier grâce à la formule $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$;
- l'**IAF** permet de trancher un débat commercial (l'affirmation du sous-traitant) par une majoration rigoureuse, sans calcul exact ;
- l'**asymptote oblique** porte une information économique : le coût marginal de structure d'un forage profond ;
- enfin, la **symétrie des courbes** de f et f^{-1} par rapport à $y = x$ offre une lecture graphique immédiate des deux points de vue : « coût en fonction de la profondeur » et « profondeur en fonction du coût ».

LES AVAIS-TU ? L'eau, un enjeu national

Selon les programmes camerounais d'hydraulique rurale et urbaine (MINEE, PNUD), des milliers de forages sont réalisés chaque année, notamment dans les régions de l'Ouest, du

Nord et de l'Extrême-Nord. Le dimensionnement d'un forage (profondeur, pompe, budget) mobilise exactement les outils que tu viens d'utiliser : modélisation par une fonction, résolution d'équations et majoration des coûts. Les mathématiques de Terminale sont déjà un métier !

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthode 1 : Démontrer l'existence et l'unicité d'une solution de $f(x) = c$ par le TVI

MÉTHODE Existence et unicité par le théorème des valeurs intermédiaires

Pour résoudre une équation du type $f(x) = c$ sur un intervalle I :

1. Vérifier la continuité de f sur I (fonction usuelle, somme, produit, quotient ou composée de fonctions continues).
2. Étudier la monotonie stricte : calculer $f'(x)$ et montrer que f' garde un signe strict sur I (sauf éventuellement en des points isolés où elle s'annule).
3. Calculer les limites (ou valeurs) aux bornes de I et vérifier que c est compris entre elles.
4. Conclure : f réalise une bijection de I sur $f(I)$, donc l'équation $f(x) = c$ admet une **unique solution** α dans I .
5. Encadrer α par balayage ou dichotomie : trouver $a < b$ tels que $f(a)$ et $f(b)$ encadrent c , puis affiner jusqu'à l'amplitude demandée.

EXERCICE RÉSOLU 13 Équation $x^3 + x - 3 = 0$

Montrer que l'équation $x^3 + x - 3 = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, puis donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-1} .

SOLUTION

Posons $f(x) = x^3 + x - 3$, définie sur $\mathbb{R}$.

1. f est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$.
2. $f'(x) = 3x^2 + 1$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $3x^2 \geq 0$ donc $f'(x) \geq 1 > 0$. Ainsi f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. Limites aux bornes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty.$$

4. f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$: elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Comme $0 \in \mathbb{R}$, le théorème des valeurs intermédiaires garantit que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in \mathbb{R}$.
5. Balayage : $f(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0$ et $f(1,5) = 3,375 + 1,5 - 3 = 1,875 > 0$, donc $\alpha \in]1; 1,5[$. On affine au dixième : $f(1,2) = 1,728 + 1,2 - 3 = -0,072 < 0$ et $f(1,3) = 2,197 + 1,3 - 3 = 0,497 > 0$.

Conclusion : l'équation admet une unique solution α et $1,2 < \alpha < 1,3$ (encadrement d'amplitude $0,1 = 10^{-1}$).

9.2 Méthode 2 : Étudier une fonction réciproque et tracer sa courbe

MÉTHODE Fonction réciproque

1. Justifier la bijectivité : montrer que f est continue et strictement monotone sur I ; alors f est une bijection de I sur $J = f(I)$.
2. Préciser f^{-1} : ensemble de définition J , sens de variation (le **même** que celui de f), continuité sur J .
3. Dérivée de la réciproque : si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(a)}.$$

4. Tracé : la courbe de f^{-1} est la **symétrique** de celle de f par rapport à la droite d'équation $y = x$ (première bissectrice). Un point $M(a; b)$ de C_f donne le point $M'(b; a)$ de $C_{f^{-1}}$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Réciproque de $f(x) = x^2 + 1$ sur $[0; +\infty[$

Soit $f(x) = x^2 + 1$ définie sur $I = [0; +\infty[$. (1) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition. (2) Expliciter $f^{-1}(x)$. (3) Calculer $(f^{-1})'(5)$ de deux façons.

SOLUTION

1. f est polynôme donc continue sur I . $f'(x) = 2x > 0$ pour $x > 0$, donc f est strictement croissante sur I . Par le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur $J = f(I) = [f(0); \lim_{+\infty} f] = [1; +\infty[$. Donc f^{-1} existe, définie sur $[1; +\infty[$, à valeurs dans $[0; +\infty[$.
2. Pour $x \geq 1$, résolvons $y = f^{-1}(x)$, c'est-à-dire $f(y) = x$ avec $y \geq 0$:

$$y^2 + 1 = x \iff y^2 = x - 1 \iff y = \sqrt{x - 1} \quad (\text{car } y \geq 0).$$

$$\text{Donc } f^{-1}(x) = \sqrt{x - 1}.$$

3. Première méthode (dérivation directe) : $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$, donc $(f^{-1})'(5) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$.
Seconde méthode (formule de la réciproque) : on cherche a tel que $f(a) = 5$: $a^2 + 1 = 5$

et $a \geq 0$ donnent $a = 2$. Comme $f'(2) = 4 \neq 0$, la formule s'applique :

$$(f^{-1})'(5) = \frac{1}{f'(f^{-1}(5))} = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{2 \times 2} = \frac{1}{4}.$$

Les deux résultats coïncident.

Conclusion : $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$ sur $[1; +\infty[$ et $(f^{-1})'(5) = \frac{1}{4}$.

9.3 Méthode 3 : Résoudre $x^n = a$ et simplifier les puissances rationnelles

MÉTHODE Équation $x^n = a$ et racines n-ièmes

1. Discuter selon la parité de n et le signe de a :

- Si $a > 0$: une solution positive $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$; si n est pair, il y a aussi la solution négative $-\sqrt[n]{a}$.
- Si $a = 0$: unique solution $x = 0$.
- Si $a < 0$: solution $-\sqrt[n]{|a|}$ (négative) si n est impair ; aucune solution réelle si n est pair.

2. Utiliser les règles de calcul valables pour $a, b > 0$:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{a^n} = a, \quad a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p} = (\sqrt[q]{a})^p, \quad a^{-r} = \frac{1}{a^r}.$$

3. Simplifier en décomposant le radicande pour faire apparaître des puissances n-ièmes parfaites.

EXERCICE RÉSOLU 15 Résolutions et simplifications

(1) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^3 = -27$ puis $x^4 = 16$. (2) Simplifier $A = \sqrt[3]{54}$ et $B = 8^{2/3} \times 4^{-1/2}$.

SOLUTION

1. Équation $x^3 = -27$: $n = 3$ est impair, donc unique solution : $x = \sqrt[3]{-27} = -\sqrt[3]{27} = -3$.
Vérification : $(-3)^3 = -27$. $S = \{-3\}$. Équation $x^4 = 16$: $n = 4$ est pair et $a = 16 > 0$, donc deux solutions : $x = \sqrt[4]{16} = 2$ ou $x = -2$ (car $16 = 2^4$). $S = \{-2; 2\}$.

2. Simplification de A : $54 = 27 \times 2 = 3^3 \times 2$, donc

$$A = \sqrt[3]{3^3 \times 2} = \sqrt[3]{3^3} \times \sqrt[3]{2} = 3 \sqrt[3]{2}.$$

Simplification de B : $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$ et $4^{-1/2} = \frac{1}{4^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$. Donc

$$B = 4 \times \frac{1}{2} = 2.$$

Conclusion : $S_1 = \{-3\}$, $S_2 = \{-2; 2\}$, $A = 3\sqrt[3]{2}$ et $B = 2$.

9.4 Méthode 4 : Encadrer $f(b) - f(a)$ par l'inégalité des accroissements finis

MÉTHODE Inégalité des accroissements finis (IAF)

1. Vérifier les hypothèses : f dérivable sur un intervalle contenant $[a; b]$.
2. Encadrer la dérivée : trouver deux réels m et M tels que pour tout $x \in [a; b]$, $m \leq f'(x) \leq M$.
3. Appliquer la formule (pour $a < b$) :

$$m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a).$$

Cas particulier utile : si $|f'(x)| \leq k$ sur $[a; b]$, alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ (**majoration de l'erreur**).

4. Conclure par l'encadrement demandé de $f(b)$ à partir de $f(a)$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Encadrement de $\sqrt{102}$

Soit $f(x) = \sqrt{x}$. (1) Montrer que pour tout $x \in [100; 102]$, $\frac{1}{2\sqrt{102}} \leq f'(x) \leq \frac{1}{20}$. (2) En déduire, sans utiliser la valeur approchée de $\sqrt{102}$ donnée par une calculatrice, un encadrement de $\sqrt{102}$ d'amplitude inférieure à 10^{-2} .

SOLUTION

1. f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante, donc f' est décroissante sur $[100; 102]$. Ainsi, pour tout $x \in [100; 102]$:

$$f'(102) \leq f'(x) \leq f'(100) \iff \frac{1}{2\sqrt{102}} \leq f'(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{100}} = \frac{1}{20}.$$

2. Appliquons l'IAF à f sur $[100; 102]$ avec $m = \frac{1}{2\sqrt{102}}$ et $M = \frac{1}{20}$:

$$\frac{1}{2\sqrt{102}} (102 - 100) \leq \sqrt{102} - \sqrt{100} \leq \frac{1}{20} (102 - 100)$$

$$\frac{1}{\sqrt{102}} \leq \sqrt{102} - 10 \leq \frac{1}{10}.$$

La borne de gauche fait intervenir $\sqrt{102}$, que l'on cherche justement à encadrer : on la remplace par une minoration grossière mais rigoureuse. Comme $11^2 = 121 > 102$, on a $\sqrt{102} < 11$, donc $\frac{1}{\sqrt{102}} > \frac{1}{11}$. Alors :

$$\frac{1}{11} \leq \sqrt{102} - 10 \leq \frac{1}{10} \iff 10 + \frac{1}{11} \leq \sqrt{102} \leq 10 + \frac{1}{10}.$$

Or $\frac{1}{11} \approx 0,0909$ et $\frac{1}{10} = 0,1$, d'où $10,090 \leq \sqrt{102} \leq 10,100$.

Conclusion : $10,09 \leq \sqrt{102} \leq 10,1$, encadrement d'amplitude 0,01 obtenu rigoureusement par l'inégalité des accroissements finis.

9.5 Méthode 5 : Déterminer les branches infinies et les asymptotes

MÉTHODE Branches infinies : le réflexe en 4 questions

On étudie le comportement de f au voisinage d'une borne x_0 (finie ou infinie) où $|f| \rightarrow \infty$ ou $|x| \rightarrow \infty$.

1. Asymptote verticale : si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ (x_0 fini), la droite $x = x_0$ est asymptote verticale.
2. Asymptote horizontale : si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$ (fini), la droite $y = \ell$ est asymptote horizontale.
3. Sinon, direction asymptotique : calculer $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$.
 - Si $a = \pm\infty$: **branche parabolique** de direction (Oy) .
 - Si $a = 0$: branche parabolique de direction (Ox) .
 - Si a fini non nul : calculer $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax)$. Si b fini : asymptote oblique $y = ax + b$; si $b = \pm\infty$: branche parabolique de direction $y = ax$.
4. Position relative : étudier le signe de $f(x) - (ax + b)$ pour placer la courbe par rapport à l'asymptote oblique.

EXERCICE RÉSOLU 17 Branches infinies de $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$. Déterminer toutes les branches infinies de C_f et préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote oblique.

SOLUTION

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

1. En $x = 1$: le numérateur en 1 vaut $1 - 3 + 3 = 1 \neq 0$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 1) = 0^+$ donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$; de même $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$. La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale.

2. En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$: pas d'asymptote horizontale. On calcule alors :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1 = a \text{ (fini, non nul).}$$

3. Recherche de b : effectuons la division euclidienne du numérateur par $x - 1$: $x^2 - 3x + 3 = (x - 1)(x - 2) + 1$, donc

$$f(x) = x - 2 + \frac{1}{x - 1}.$$

Alors $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (x - 2)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 1} = 0$ (limite finie). La droite d'équation $y = x - 2$ est asymptote oblique en $-\infty$ et en $+\infty$.

4. Position relative : $f(x) - (x - 2) = \frac{1}{x - 1}$.

- Si $x > 1$: $f(x) - (x - 2) > 0$: la courbe est au-dessus de l'asymptote.
- Si $x < 1$: $f(x) - (x - 2) < 0$: la courbe est en dessous de l'asymptote.

Conclusion : C_f admet l'asymptote verticale d'équation $x = 1$ et l'asymptote oblique d'équation $y = x - 2$; la courbe est au-dessus de l'asymptote oblique pour $x > 1$ et en dessous pour $x < 1$ (le changement de position se fait de part et d'autre de l'asymptote verticale, la courbe n'étant pas définie en 1).

9.6 Méthode 6 : Mener une étude complète de fonction et tracer la courbe

MÉTHODE Plan d'étude complet (à rédiger dans cet ordre)

1. Ensemble de définition D_f (dénominateur non nul, radicande positif ou nul, etc.) ; éventuelles symétries (parité, périodicité) pour **réduire le domaine d'étude**.
2. Limites aux bornes de D_f et branches infinies (asymptotes).
3. Dérivabilité et calcul de f' , signe de f' (tableau de signes si nécessaire).

4. Tableau de variations complet : limites, valeurs aux extrema, flèches.
5. Éléments graphiques : tangentes horizontales, points remarquables (intersections avec les axes), éventuel point d'inflexion.
6. Tracé : asymptotes d'abord, points remarquables, puis la courbe en respectant le tableau de variations.

EXERCICE RÉSOLU 18

Étude complète de $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$

Étudier complètement la fonction $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ et tracer sa courbe représentative.

SOLUTION

1. Ensemble de définition. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1+x^2 \geq 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais. Donc $D_f = \mathbb{R}$. De plus $f(-x) = \frac{-2x}{1+x^2} = -f(x)$: f est impaire, on peut restreindre l'étude à $[0; +\infty[$ et compléter par symétrie centrale de centre O .

2. Limites. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x} = 0$. La droite d'équation $y = 0$ (axe des abscisses) est asymptote horizontale en $-\infty$ et en $+\infty$. Il n'y a pas de branche infinie verticale.

3. Dérivée. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (quotient de polynômes dont le dénominateur ne s'annule pas) :

$$f'(x) = \frac{2(1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x)(1+x)}{(1+x^2)^2}.$$


Le dénominateur est strictement positif ; le signe de f' est celui de $1-x^2$: $f'(x) > 0$ sur $] -1; 1[$, $f'(x) < 0$ sur $] -\infty; -1[$ et sur $]1; +\infty[$, et $f'(-1) = f'(1) = 0$.

4. Tableau de variations. Valeurs remarquables : $f(-1) = -1$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	0

5. Points remarquables. Intersection avec les axes : $f(x) = 0 \iff x = 0$: la courbe passe par l'origine. Tangentes horizontales en $A(-1; -1)$ (minimum) et $B(1; 1)$ (maximum).

6. Tracé.



Courbe de $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$: impaire, asymptote $y = 0$, extrema en ± 1 .

Conclusion : f est impaire, croissante sur $[-1; 1]$, décroissante sur $] -\infty; -1]$ et sur $[1; +\infty[$, bornée entre -1 et 1 , avec l'axe des abscisses pour asymptote horizontale.

9.7 Méthode 7 : Lever les indéterminations avec les limites usuelles (trigonométrie et irrationnelles)

MÉTHODE Limites usuelles à mobiliser

1. Formes à reconnaître immédiatement :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a.$$

2. Changement de variable : si $x \rightarrow x_0$, poser $t = x - x_0$ pour se ramener en 0.

3. Fonctions irrationnelles : pour une forme $\infty - \infty$ avec des racines carrées, multiplier par la **quantité conjuguée** :

$$\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}.$$

4. Encadrement : si la limite usuelle ne s'applique pas directement, utiliser $|\sin x| \leq 1$, $|\cos x| \leq 1$ avec le théorème des gendarmes.

EXERCICE RÉSOLU 19 Trois limites classiques

Calculer : (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{2x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$; (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$.

SOLUTION

1. Limite 1. Forme indéterminée $\frac{0}{0}$. On fait apparaître la limite usuelle :

$$\frac{\sin(3x)}{2x} = \frac{3}{2} \times \frac{\sin(3x)}{3x}.$$

Posons $t = 3x$: quand $x \rightarrow 0$, $t \rightarrow 0$, et $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{2x} = \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2}.$$

2. Limite 2. Forme $\infty - \infty$. Multiplions par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{(x^2 + 3x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}.$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + 3x} = x\sqrt{1 + \frac{3}{x}}$, donc

$$\frac{3x}{x\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + x} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{1} + 1} = \frac{3}{2}.$$

(Interprétation géométrique : la courbe d'équation $y = \sqrt{x^2 + 3x}$ admet en $+\infty$ l'asymptote oblique d'équation $y = x + \frac{3}{2}$.)

3. Limite 3. Le numérateur n'a pas de limite, mais il est borné : pour $x > 0$,

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

Conclusion : les trois limites valent respectivement $\frac{3}{2}$, $\frac{3}{2}$ et 0.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Appliquer le TVI sans vérifier les hypothèses. Il faut rédiger explicitement : « f est continue sur I » ET « f est strictement monotone sur I ». Sans la stricte monotonie, on

obtient l'existence mais pas l'unicité. Oublier l'une des deux conditions fait perdre les points de justification.

2. Confondre $(f^{-1})'(x)$ et $\frac{1}{f'(x)}$. La formule est $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$: on évalue f' en $f^{-1}(b)$, pas en b . Et la formule n'est valable que si $f'(f^{-1}(b)) \neq 0$.
3. Oublier la solution négative de $x^n = a$ avec n pair. $x^4 = 16$ a deux solutions : 2 et -2. À l'inverse, écrire $\sqrt[4]{16} = -2$ est faux : la racine n -ième (n pair) d'un réel positif est toujours positive.
4. Conclure trop vite sur les branches infinies. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ ne signifie pas « asymptote verticale » ; il faut calculer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$. Et une asymptote oblique exige que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax)$ soit finie : si elle est infinie, c'est une branche parabolique, pas une asymptote.
5. Erreurs de calcul sur les dérivées de quotients et les quantités conjuguées. Dans $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, l'ordre $u'v - uv'$ est crucial (signe inversé sinon). Pour $\sqrt{A} - \sqrt{B}$, le conjugué donne $\frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}$: le numérateur est $A - B$, et non $A + B$. Vérifie chaque étape avant de conclure.

10 EXERCICES

11 ÉTUDE DE FONCTIONS NUMÉRIQUES D'UNE VARIABLE RÉELLE

11.1 Image d'un intervalle par une fonction continue et Théorème des valeurs intermédiaires

À RETENIR Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Soit f une fonction continue sur un intervalle fermé $[a; b]$ (avec $a < b$).

- Existence : Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.
- Unicité : Si de plus f est strictement monotone sur $[a; b]$, alors ce c est unique.

PROPRIÉTÉ Image d'un intervalle par une fonction continue

Si f est continue sur un intervalle I (quel qu'il soit : ouvert, fermé, borné ou non), alors l'image $f(I)$ est aussi un intervalle.

MÉTHODE Montrer l'existence et l'unicité d'une solution de $f(x) = c$

1. Vérifier que f est continue sur un intervalle $I = [a; b]$ (ou $]a; b]$, $[a; b[$, $]a; b[$ en utilisant les limites aux bornes).
2. Étudier les variations de f sur I (signe de f') pour établir sa monotonie stricte.
3. Calculer $f(a)$ et $f(b)$ (ou les limites aux bornes si l'intervalle est ouvert) et vérifier que c est bien strictement compris entre ces deux valeurs.
4. Conclure par le TVI : l'équation $f(x) = c$ admet une unique solution dans I .

EXEMPLE Application du TVI

Soit $f(x) = x^3 + 2x - 3$ sur $\mathbb{R}$.

- f est continue sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme).
- $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc f est strictement croissante.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- Pour $c = 0$, $0 \in]-\infty; +\infty[$. L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Comme $f(0) = -3 < 0$ et $f(2) = 9 > 0$, on a $\alpha \in]0; 2[$.

ATTENTION Pièges à éviter

- Ne pas oublier de vérifier la continuité sur l'intervalle fermé $[a; b]$ (si l'intervalle est ouvert, il faut prolonger par continuité ou utiliser les limites).
- L'unicité nécessite une monotonie stricte (dérivée de signe constant et non nulle sur un intervalle, ou étude de signe rigoureuse).
- Le TVI ne donne pas la valeur de la solution, seulement son existence. Pour l'approcher, on utilise la dichotomie ou des suites.

11.2 Fonction réciproque d'une bijection

DÉFINITION Bijection et fonction réciproque

Une fonction $f : I \rightarrow J$ est une bijection si elle est à la fois injective (valeurs distinctes ont des images distinctes) et surjective (tout élément de J a un antécédent dans I). La fonction réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est définie par : $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$.

PROPRIÉTÉ Propriétés de la fonction réciproque

Soit f une bijection d'un intervalle I sur un intervalle J .

1. Continuité : Si f est continue sur I , alors f^{-1} est continue sur J .
2. Dérivabilité : Si f est dérivable sur I et si $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$, alors f^{-1} est dérivable sur J et pour tout $y \in J$:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

3. Symétrie graphique : Dans un repère orthonormé, les courbes C_f et $C_{f^{-1}}$ sont symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite d'équation $y = x$ (première bissectrice).

MÉTHODE Déterminer l'expression de f^{-1}

1. Vérifier que f est une bijection de I sur J (continuité + monotonie stricte + bornes).
2. Poser $y = f(x)$ avec $x \in I, y \in J$.
3. Exprimer x en fonction de y (résoudre l'équation par rapport à x).
4. Échanger les lettres x et y (usage) : on obtient $f^{-1}(x) = \dots$ pour $x \in J$.

EXEMPLE Réciproque de $g(x) = x^2 - 4x + 5$ sur $[2; +\infty[$

- $g(x) = (x-2)^2 + 1$. Sur $[2; +\infty[$, g est strictement croissante, $g(2) = 1$, $\lim_{+\infty} g = +\infty$. Bijection $[2; +\infty[\rightarrow [1; +\infty[$.
- $y = (x-2)^2 + 1 \implies (x-2)^2 = y-1 \implies x-2 = \sqrt{y-1}$ (car $x \geq 2$).
- $x = 2 + \sqrt{y-1}$. Donc $g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-1}$ pour $x \in [1; +\infty[$.
- Dérivée : $(g^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$. En $x = 2$: $(g^{-1})'(2) = \frac{1}{2}$.
- Vérification par la formule : $g^{-1}(2) = 3$, $g'(3) = 2(3) - 4 = 2$, $(g^{-1})'(2) = \frac{1}{g'(3)} = \frac{1}{2}$.

ATTENTION Condition $f'(x) \neq 0$

La formule $(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y))$ nécessite que $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$. Si $f'(x_0) = 0$, alors f^{-1} n'est pas dérivable en $y_0 = f(x_0)$ (la tangente à $C_{f^{-1}}$ est verticale).

11.3 Racines n-ièmes et puissances rationnelles**DÉFINITION** Racine n-ième

Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ et $a \in \mathbb{R}_+^*$. On appelle racine n-ième de a l'unique réel positif b tel que $b^n = a$. On le note $\sqrt[n]{a}$ ou $a^{1/n}$. Par convention $\sqrt[n]{0} = 0$. Pour $a < 0$ et n impair, $\sqrt[n]{a} = -\sqrt[n]{|a|}$.

PROPRIÉTÉ Puissances rationnelles

Pour $a > 0$ et $q \in \mathbb{N}^*$, on pose $a^{1/q} = \sqrt[q]{a}$. Pour $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$, on pose $a^{p/q} = (a^{1/q})^p = \sqrt[q]{a^p}$. Les règles usuelles des puissances s'étendent : $a^r a^s = a^{r+s}$, $(a^r)^s = a^{rs}$, $(ab)^r = a^r b^r$ (pour

$a, b > 0$).

À RETENIR Simplification d'expressions avec racines

- $\sqrt[n]{a^n} = a$ pour $a \geq 0$ (et $|a|$ si n pair et $a \in \mathbb{R}$).
- $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$ ($a, b \geq 0$).
- $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ ($a \geq 0, b > 0$).
- $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$.

EXEMPLE Calculs sur les puissances rationnelles

$$A = \frac{16^{3/4} \times 9^{1/2}}{8^{2/3}} = \frac{(2^4)^{3/4} \times (3^2)^{1/2}}{(2^3)^{2/3}} = \frac{2^3 \times 3}{2^2} = \frac{8 \times 3}{4} = 6.$$

$$B = \sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{27 \times 2} + \sqrt[3]{8 \times 2} = 3\sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{2}.$$

11.4 Inégalité des accroissements finis

PROPRIÉTÉ Inégalité des accroissements finis (Théorème des accroissements finis)

Soit f une fonction continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$. Il existe au moins un $c \in]a; b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Conséquence majeure (encadrement) : Si $|f'(x)| \leq M$ sur $]a; b[$, alors

$$|f(b) - f(a)| \leq M |b - a|.$$

MÉTHODE Utiliser l'inégalité des accroissements finis pour encadrer une différence

1. Identifier la fonction f et l'intervalle $[a; b]$ (ou $[b; a]$).
2. Calculer $f'(x)$ et trouver une majoration $M \geq |f'(x)|$ sur l'intervalle.

3. Appliquer $|f(b) - f(a)| \leq M |b - a|$.

EXEMPLE Encadrement de $\sqrt{4,1}$

Soit $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[4; 4,1]$. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$. $|\sqrt{4,1} - \sqrt{4}| \leq \frac{1}{4} \times 0,1 = 0,025$. Donc $\sqrt{4,1} \in [2 - 0,025; 2 + 0,025] = [1,975; 2,025]$.

EXEMPLE Convergence d'une suite par contraction

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 4} - 2$. (On note $g(x) = \sqrt{x + 4} - 2$). $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+4}}$. Pour $x \geq 0$, $g'(x) \leq \frac{1}{4}$. $|u_{n+1} - 0| = |g(u_n) - g(0)| \leq \frac{1}{4} |u_n - 0|$. Donc $|u_n| \leq \frac{1}{4^n} |u_0| \rightarrow 0$. La suite converge vers 0.

11.5 Limites usuelles et branches infinies

À RETENIR Limites usuelles à connaître (Bac)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

PROPRIÉTÉ Branches infinies et asymptotes

Soit f définie sur un voisinage de $+\infty$ (ou $-\infty$) ou au voisinage d'une valeur interdite x_0 .

- Asymptote verticale $x = x_0$: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$.
- Asymptote horizontale $y = \ell$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.
- Asymptote oblique $y = ax + b$ ($a \neq 0$) : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$.
- Direction asymptotique : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$ existe mais $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax)$ n'existe pas (ou est infini).

MÉTHODE Recherche systématique des asymptotes

1. Verticales : Chercher les valeurs x_0 non appartenant au domaine où $\lim f = \pm\infty$.
2. Horizontales : Calculer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$. Si fini ℓ , $y = \ell$ est asymptote.
3. Obliques : Si pas d'horizontale, calculer $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$. Si $a \in \mathbb{R}^*$, calculer $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax)$. Si $b \in \mathbb{R}$, $y = ax + b$ est asymptote.
4. Position relative : Étudier le signe de $f(x) - (ax + b)$ pour savoir si la courbe est au-dessus ou en dessous de l'asymptote.

EXEMPLE Asymptotes de $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$

Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

- $x \rightarrow 1^\pm$: num $\rightarrow 2$, dén $\rightarrow 0^\pm \Rightarrow$ asymptote verticale $x = 1$.
- $x \rightarrow \pm\infty$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{x^2+1}{x(x-1)} \rightarrow 1 = a$.
- $f(x) - x = \frac{x^2+1-x(x-1)}{x-1} = \frac{x+1}{x-1} \rightarrow 1 = b$.
- Asymptote oblique : $y = x + 1$.
- Position : $f(x) - (x + 1) = \frac{2}{x-1}$. Signe de $x - 1$: courbe au-dessus pour $x > 1$, en-dessous pour $x < 1$.

LESAVAIS-TU ? Direction asymptotique sans asymptote

La fonction $\varphi(x) = x + \cos x$ a pour direction asymptotique $y = x$ car $\varphi(x)/x \rightarrow 1$. Mais $\varphi(x) - x = \cos x$ n'a pas de limite en $\pm\infty$ (oscille entre -1 et 1). Il n'y a pas d'asymptote oblique.

11.6 Étude complète de fonctions et tracé de courbes**MÉTHODE** Étude complète d'une fonction f (7 étapes)

1. Domaine de définition D_f (et parité/périodicité si évidente).
2. Limites aux bornes de D_f (valeurs interdites, $\pm\infty$) $\rightarrow$ asymptotes verticales/horizontales.
3. Dérivée f' : calcul, simplification, signe $\rightarrow$ tableau de variations.


4. Asymptotes obliques (si pas d'horizontale) : $a = \lim f/x$, $b = \lim f - ax$. Position relative.
5. Points particuliers : intersections avec les axes ($f(x) = 0$, $f(0)$), extremums, points d'inflexion (si f'' simple).
6. Tableau de variations complet (valeurs aux bornes, extremums).
7. Tracé de la courbe C_f dans un repère orthonormé (échelle adaptée, asymptotes en pointillés, points caractéristiques).

EXERCICE RÉSOLU 20**Étude complète : fonction rationnelle $h(x) = \frac{x^2+3x+1}{x+2}$**

1. Domaine : $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. 2. Limites : $x \rightarrow -2^-$: num $\rightarrow -1$, dén $\rightarrow 0^- \Rightarrow +\infty$. $x \rightarrow -2^+$: dén $\rightarrow 0^+ \Rightarrow -\infty$. Asymptote verticale $x = -2$. $x \rightarrow \pm\infty$: $h(x) \sim x \rightarrow \pm\infty$. Pas d'horizontale. 3. Dérivée : $h'(x) = \frac{(2x+3)(x+2)-(x^2+3x+1)}{(x+2)^2} = \frac{x^2+4x+5}{(x+2)^2}$. $\Delta' = 16 - 20 = -4 < 0$, numérateur > 0 . $h' > 0$ sur $]-\infty; -2[$ et $] -2; +\infty[$. h strictement croissante sur chaque intervalle. 4. Asymptote oblique : Division : $h(x) = x + 1 - \frac{1}{x+2}$. $a = 1$, $b = 1$. Asymptote Δ : $y = x + 1$. Position : $h(x) - (x + 1) = -\frac{1}{x+2}$... non $-\frac{1}{x+2}$. $x > -2 \Rightarrow x + 2 > 0 \Rightarrow h(x) < x + 1$ (courbe sous Δ). $x < -2 \Rightarrow x + 2 < 0 \Rightarrow h(x) > x + 1$ (courbe au-dessus Δ). 5. Points : $h(0) = 1/2$. $h(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$. 6. Tableau de variations :

x	$-\infty$	-2	-2	$+\infty$
$h'(x)$		+		+
h	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$

7. Tracé : Voir figure ci-dessous.



Courbe de $h(x) = \frac{x^2+3x+1}{x+2}$ et ses asymptotes

EXERCICE RÉSOLU 21

Étude complète : fonction irrationnelle $\psi(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

1. Domaine/Parité : $D_\psi = \mathbb{R}$. $\psi(-x) = -\psi(x)$: fonction impaire. Courbe symétrique par rapport à l'origine O . 2. Limites : $x \rightarrow +\infty$, $\psi(x) = \frac{x}{\sqrt{1+1/x^2}} \rightarrow 1$. $x \rightarrow -\infty$, $\psi(x) \rightarrow -1$. Asymptotes

horizontales : $y = 1$ (en $+\infty$) et $y = -1$ (en $-\infty$). 3. Dérivée : $\psi'(x) = \frac{\sqrt{x^2+1} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \frac{1}{(x^2+1)^{3/2}} > 0$. ψ strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

4. Variations : Tableau simple : $-\infty \rightarrow -1$, croissante, $+\infty \rightarrow 1$.

5. Bijection : ψ bijection $\mathbb{R} \rightarrow]-1; 1[$. Réciproque : $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \Rightarrow y^2 = \frac{x^2}{x^2+1} \Rightarrow x^2 = \frac{y^2}{1-y^2} \Rightarrow x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$ (même signe). $\psi^{-1}(y) = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$ sur $] -1; 1[$. $(\psi^{-1})'(0) = \frac{1}{\psi'(\psi^{-1}(0))} = \frac{1}{\psi'(0)} = 1$.

6. Équation

$$\psi(x) = 1/2 : x = \frac{1/2}{\sqrt{3}/4} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

11.7 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier la bonne réponse.

- Soit f une fonction continue sur $[a; b]$ telle que $f(a) = -2$ et $f(b) = 5$. L'équation $f(x) = 0$:
 - n'admet aucune solution dans $[a; b]$;
 - admet au moins une solution dans $[a; b]$;
 - admet exactement une solution dans $[a; b]$.
- Si f est une bijection de I sur J , dérivable, et si $f'(x_0) = 0$ pour un $x_0 \in I$, alors f^{-1} :
 - est dérivable en $f(x_0)$ et $(f^{-1})'(f(x_0)) = 0$;
 - n'est pas dérivable en $f(x_0)$;
 - n'existe pas.
- L'équation $x^4 = 81$ admet dans $\mathbb{R}$:
 - une seule solution;
 - deux solutions;
 - quatre solutions.
- La courbe d'une fonction f admet une asymptote horizontale en $+\infty$ si et seulement si :
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ est un réel fini ℓ ;
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ est un réel fini.

EXERCICE 9 Vrai ou faux, justifier

Répondre par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse (par une démonstration courte ou un contre-exemple).

- Toute fonction continue sur $[0; 1]$ avec $f(0) = f(1) = 3$ s'annule au moins une fois sur $]0; 1[$.
- Si f est continue et strictement monotone sur $\mathbb{R}$, alors f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

3. Pour tout réel $a > 0$ et tout entier $n \geq 2$, $\sqrt[n]{a^n} = a$.
4. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (2x + 1)) = 0$, alors la droite d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote à la courbe de f en $+\infty$.

EXERCICE 10 Calculs directs

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations : $x^3 = 27$; $x^4 = 81$; $x^5 = -32$.
2. Simplifier $A = \frac{16^{3/4} \times 9^{1/2}}{8^{2/3}}$ et écrire $B = \sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{16}$ sous la forme $k\sqrt[3]{2}$ avec $k \in \mathbb{N}$.
3. Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{2x}; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x}.$$

EXERCICE 11 Définitions et cours

1. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires (version avec existence et unicité).
2. Donner la formule de la dérivée de la fonction réciproque : $(f^{-1})'(y) = \dots$ en précisant les hypothèses.
3. Compléter : les courbes de f et de f^{-1} dans un repère orthonormé sont symétriques par rapport à ...
4. Énoncer l'inégalité des accroissements finis pour une fonction dérivable sur $[a; b]$ avec $|f'| \leq M$.

11.8 Je m'entraîne**EXERCICE 12** Existence et unicité par le TVI

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x - 3$.

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ et dresser son tableau de variations complet (avec les limites).
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
3. Justifier que $\alpha \in]0; 2[$.
4. Par dichotomie, donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2} .

EXERCICE 13 Fonction réciproque

Soit g la restriction de la fonction $f(x) = x^2 - 4x + 5$ à l'intervalle $[2; +\infty[$.

1. Montrer que g réalise une bijection de $[2; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.
2. Déterminer l'expression de $g^{-1}(x)$ pour $x \in J$.
3. Calculer $(g^{-1})'(2)$ de deux manières différentes.
4. Dans un repère orthonormé, tracer les courbes de g et de g^{-1} ainsi que la droite d'équation $y = x$.

EXERCICE 14 Inégalité des accroissements finis

1. À l'aide de l'inégalité des accroissements finis, montrer que pour tout $x \geq 0$:

$$\left| \sqrt{x+4} - 2 \right| \leq \frac{x}{4}.$$

2. En déduire une valeur approchée de $\sqrt{4,1}$ et majorer l'erreur commise.
3. Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 4} - 2$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|u_{n+1}| \leq \frac{1}{4}|u_n|$, puis que (u_n) converge vers 0. En déduire que la suite (v_n) définie par $v_n = u_n + 2$ converge vers 2.

EXERCICE 15 Limites et branches infinies

1. Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x); \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + x - 1}{x^2 - 3}.$$

2. Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$. Déterminer les réels a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 1}$, puis montrer que la courbe de f admet une asymptote oblique dont on donnera l'équation.
3. Soit $\varphi(x) = x + \cos x$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que φ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, que l'équation $\varphi(x) = 1$ admet une unique solution, et étudier les branches infinies de φ (on montrera qu'il y a une direction asymptotique mais pas d'asymptote).

11.9 Je me prépare au Bac

EXERCICE 16 Problème : étude d'une fonction rationnelle

Une coopérative agricole de la région de l'Ouest modélise le coût moyen de production d'un sac d'engrais, en milliers de francs CFA, par la fonction

$$h(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 2}, \quad x \geq 0,$$

où x désigne le nombre de tonnes produites. On considère h définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par la même expression, et on note C_h sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1. Déterminer l'ensemble de définition de h et calculer les limites de h aux bornes de cet ensemble.
2. Montrer que pour tout $x \neq -2$: $h'(x) = \frac{x^2 + 4x + 5}{(x + 2)^2}$. En déduire les variations de h et dresser son tableau de variations.
3. Montrer qu'il existe des réels a , b et c tels que $h(x) = ax + b + \frac{c}{x + 2}$.
4. En déduire que C_h admet une asymptote oblique Δ dont on donnera l'équation, ainsi qu'une asymptote verticale.
5. Étudier la position relative de C_h par rapport à Δ .
6. Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{R}$ et les déterminer.
7. Tracer Δ , les asymptotes et C_h .
8. Application : la coopérative vend chaque sac à un prix fixe. Sachant que le coût moyen minimal est atteint pour une production positive, déterminer, à l'aide du tableau de variations, la quantité qui minimise le coût moyen sur $[0; +\infty[$ et ce coût minimal.

EXERCICE 17 Problème : fonction irrationnelle et bijection réciproque

Soit ψ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\psi(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$, et C_ψ sa courbe dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Étudier la parité de ψ . Que peut-on en déduire pour C_ψ ?
2. Calculer les limites de ψ en $-\infty$ et en $+\infty$. Interpréter graphiquement.
3. Montrer que pour tout réel x : $\psi'(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$. Dresser le tableau de variations de ψ .
4. Montrer que pour tout réel x : $|\psi(x)| < 1$.

5. Montrer que ψ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser, puis déterminer l'expression de $\psi^{-1}(y)$ pour $y \in J$.
6. Calculer $(\psi^{-1})'(0)$ en utilisant la formule de la dérivée d'une fonction réciproque.
7. Tracer C_ψ et la courbe de ψ^{-1} dans le même repère.
8. Montrer que l'équation $\psi(x) = \frac{1}{2}$ admet une unique solution β et donner la valeur exacte de β .

EXERCICE 18 Problème : équation, suite et approximation

Lors de l'extension du réseau de fibre optique dans une ville, un bureau d'études modélise la hauteur d'un câble (en mètres) au-dessus du sol par une fonction dont l'équation d'équilibre se ramène à $f(x) = 0$, où f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 + 2x - 3.$$

Partie A : étude de f et résolution de $f(x) = 0$

1. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in]0; 2[$.
3. Donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2} par la méthode de dichotomie.

Partie B : approximation par une suite On considère la fonction $F(x) = \frac{2x^3 + 3}{3x^2 + 2}$ et la suite (v_n) définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = F(v_n)$.

1. Vérifier que α est un point fixe de F , c'est-à-dire $F(\alpha) = \alpha$.
2. Montrer que pour tout $x \in [0; 2]$: $|F'(x)| \leq \frac{3}{4}$ (on admettra que $F'(x) = \frac{6x(x^3 + 2x - 3)}{(3x^2 + 2)^2}$ et on utilisera la Partie A pour le signe).
3. À l'aide de l'inégalité des accroissements finis, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|v_{n+1} - \alpha| \leq \frac{3}{4} |v_n - \alpha|, \quad \text{puis} \quad |v_n - \alpha| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

4. En déduire la limite de la suite (v_n) , puis déterminer un entier n tel que v_n soit une valeur approchée de α à 10^{-4} près.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

13 CORRIGÉS DES EXERCICES — LEÇON M03 : ÉTUDE DE FONCTIONS NUMÉRIQUES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM

- Réponse b. f est continue sur $[a; b]$ et 0 est compris entre $f(a) = -2$ et $f(b) = 5$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[a; b]$. La réponse c est fausse car rien ne garantit la monotonie stricte de f (la fonction pourrait s'annuler plusieurs fois).
- Réponse b. La formule $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ exige $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$. Or $f^{-1}(f(x_0)) = x_0$ et $f'(x_0) = 0$: le dénominateur s'annule, donc f^{-1} n'est pas dérivable en $f(x_0)$ (la tangente à $C_{f^{-1}}$ en ce point est verticale).
- Réponse b. $x^4 = 81 \iff x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$. L'équation admet deux solutions : $\sqrt[4]{81} = 3$ et $-\sqrt[4]{81} = -3$ (l'exposant 4 est pair).
- Réponse b. Par définition, la droite $y = \ell$ est asymptote horizontale à C_f en $+\infty$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ avec ℓ réel fini. La réponse c correspond à la recherche d'une direction asymptotique, pas d'une asymptote horizontale.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, justifier

- Faux. Contre-exemple : $f(x) = 3$ (fonction constante) est continue sur $[0; 1]$, vérifie $f(0) = f(1) = 3$, et ne s'annule jamais. Le TVI exige que les images aux bornes encadrent la valeur cherchée, ce qui n'est pas le cas ici pour 0.
- Faux. f est bien une bijection de $\mathbb{R}$ sur $f(\mathbb{R})$, mais $f(\mathbb{R})$ n'est pas nécessairement $\mathbb{R}$ tout entier. Contre-exemple : $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, mais $f(\mathbb{R}) =]-1; 1[$. (Autre exemple : $x \mapsto \arctan$ -type non exigible ; la fonction ψ de l'exercice 10 suffit.)
- Vrai. Pour $a > 0$, la fonction $x \mapsto x^n$ est une bijection de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$, donc $\sqrt[n]{a^n}$ est l'unique réel positif dont la puissance n -ième vaut a^n : c'est a . (Attention : si $a < 0$ et n pair, on aurait $\sqrt[n]{a^n} = |a|$.)
- Vrai. C'est la définition même de l'asymptote oblique : si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (2x + 1)) = 0$,

alors la droite d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs

- $x^3 = 27 \iff x = \sqrt[3]{27} = 3$ (une seule solution, exposant impair).
 - $x^4 = 81 \iff x = \pm \sqrt[4]{81} = \pm 3$ (deux solutions, exposant pair).
 - $x^5 = -32 \iff x = \sqrt[5]{-32} = -\sqrt[5]{32} = -2$ (une seule solution).
- On décompose en facteurs premiers :

$$A = \frac{(2^4)^{3/4} \times (3^2)^{1/2}}{(2^3)^{2/3}} = \frac{2^{4 \times 3/4} \times 3^{2 \times 1/2}}{2^{3 \times 2/3}} = \frac{2^3 \times 3}{2^2} = 2 \times 3 = 6.$$

$$B = \sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{27 \times 2} + \sqrt[3]{8 \times 2} = 3\sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{2}.$$
- $\frac{\sin(5x)}{2x} = \frac{5}{2} \times \frac{\sin(5x)}{5x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{5}{2} \times 1 = \frac{5}{2}$ (limite usuelle $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$ avec $u = 5x$).
 - $\frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \frac{1 - \cos x}{x^2} \times \frac{x}{\sin x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$.
 - $\frac{x + \sin x}{x} = 1 + \frac{\sin x}{x}$. Comme $|\sin x| \leq 1$, on a $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|} \rightarrow 0$ (pour $x \rightarrow \pm\infty$). Donc la limite vaut 1.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et cours

- TVI : Soit f continue sur $[a; b]$ ($a < b$). Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$. Si de plus f est strictement monotone sur $[a; b]$, alors ce c est unique.
- Si f est une bijection dérivable de I sur J avec $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$, alors f^{-1} est dérivable sur J et :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}, \quad y \in J.$$
- ...la droite d'équation $y = x$ (première bissectrice du repère).
- Inégalité des accroissements finis : Si f est continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$ et s'il existe $M \geq 0$ tel que $|f'(x)| \leq M$ pour tout $x \in]a; b[$, alors :

$$|f(b) - f(a)| \leq M |b - a|.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Existence et unicité par le TVI

1. f est un polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = 3x^2 + 2$. Pour tout réel x , $3x^2 \geq 0$ donc $f'(x) \geq 2 > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$\nearrow +\infty$

2. f est continue (polynôme) et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$. Comme $0 \in]-\infty; +\infty[$, le TVI (version bijection) garantit que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in \mathbb{R}$.
3. $f(0) = -3 < 0$ et $f(2) = 8 + 4 - 3 = 9 > 0$. Comme f est strictement croissante et $f(\alpha) = 0 \in]f(0); f(2)[$, on conclut $\alpha \in]0; 2[$.
4. Dichotomie sur $[0; 2]$ (on note le signe de f au milieu) :

Étape	a ($f < 0$)	b ($f > 0$)	milieu m	$f(m)$
1	0	2	1	$f(1) = 0$

Or $f(1) = 1 + 2 - 3 = 0$! La solution est donc exacte : $\alpha = 1$. Vérification : $f(1) = 0$, et par unicité $\alpha = 1$. Tout encadrement d'amplitude 10^{-2} convient, par exemple $0,99 < \alpha < 1,00$ ou simplement $\alpha = 1,00$ à 10^{-2} près.

Point de vigilance : ici la dichotomie tombe sur la racine exacte dès la première étape ; il faut savoir reconnaître que $f(1) = 0$ et conclure $\alpha = 1$ plutôt que de poursuivre mécaniquement.

CORRIGÉ Exercice 6 — Fonction réciproque

1. $g(x) = x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$. g est dérivable : $g'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$. Pour $x > 2$, $g'(x) > 0$: g est strictement croissante sur $[2; +\infty[$. De plus g est continue, $g(2) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Donc g réalise une bijection de $[2; +\infty[$ sur $J = [1; +\infty[$.

2. Soit $y \in [1; +\infty[$ et $x \in [2; +\infty[$:

$$y = (x - 2)^2 + 1 \iff (x - 2)^2 = y - 1 \iff x - 2 = \sqrt{y - 1}$$

(on prend la racine positive car $x - 2 \geq 0$). Donc $x = 2 + \sqrt{y - 1}$, d'où :


$$g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x - 1}, \quad x \in [1; +\infty[.$$

3. Première méthode (dérivation directe) : $(g^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$, donc $(g^{-1})'(2) = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2}$.

Deuxième méthode (formule de la réciproque) : $g^{-1}(2) = 2 + \sqrt{1} = 3$, et $g'(3) = 2(3) - 4 = 2 \neq 0$, donc :

$$(g^{-1})'(2) = \frac{1}{g'(g^{-1}(2))} = \frac{1}{g'(3)} = \frac{1}{2}.$$

4. On place les points remarquables : $g(2) = 1$, $g(3) = 2$, $g(4) = 5$; par symétrie : $g^{-1}(1) = 2$, $g^{-1}(2) = 3$, $g^{-1}(5) = 4$.



Les courbes de g et g^{-1} , symétriques par rapport à $y = x$

CORRIGÉ Exercice 7 — Inégalité des accroissements finis

1. Soit $g(x) = \sqrt{x+4}$. g est continue sur $[0; +\infty[$, dérivable sur $]0; +\infty[$, et $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+4}}$.

Pour $x \geq 0$: $\sqrt{x+4} \geq 2$, donc $0 < g'(x) \leq \frac{1}{4}$. Appliquons l'inégalité des accroissements finis entre 0 et x ($x \geq 0$) :

$$|g(x) - g(0)| \leq \frac{1}{4}|x - 0| \iff |\sqrt{x+4} - 2| \leq \frac{x}{4}.$$

2. Avec $x = 0,1$: $|\sqrt{4,1} - 2| \leq \frac{0,1}{4} = 0,025$. Donc $\sqrt{4,1} \approx 2$ avec une erreur majorée par 0,025, c'est-à-dire $\sqrt{4,1} \in [1,975; 2,025]$.

3. Posons $h(x) = \sqrt{x+4} - 2$. On a $h(0) = 0$ et, d'après la question 1, $|h(x)| \leq \frac{x}{4}$ pour $x \geq 0$. Montrons d'abord par récurrence que $u_n \geq 0$: $u_0 = 0 \geq 0$; si $u_n \geq 0$, alors $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 4} - 2 \geq \sqrt{4} - 2 = 0$. Alors, en appliquant le résultat de la question 1 avec $x = u_n$:

$$|u_{n+1}| = |h(u_n)| = |\sqrt{u_n + 4} - 2| \leq \frac{u_n}{4} = \frac{1}{4}|u_n|.$$

Par récurrence immédiate : $|u_n| \leq \frac{1}{4^n} |u_0| = 0$, donc $u_n = 0$ pour tout n : la suite est constante nulle et converge vers 0. (Dans le cas général $u_0 \geq 0$, on obtiendrait $|u_n| \leq \frac{u_0}{4^n} \rightarrow 0$, d'où la convergence vers 0 par le théorème des gendarmes.) Enfin $v_n = u_n + 2 \rightarrow 0 + 2 = 2$: la suite (v_n) converge vers 2.

Point de vigilance : l'inégalité des accroissements finis s'applique à une fonction continue sur le segment fermé et dérivable à l'intérieur ; il faut citer ces hypothèses et majorer $|g'|$ sur tout l'intervalle considéré.

CORRIGÉ Exercice 8 — Limites et branches infinies

1. • Par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{(x^2 + 3x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{2}.$$

• $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}$ (limite usuelle, ou taux d'accroissement de $x \mapsto \sqrt{1+x}$ en 0).

• $\frac{2x^2 + x - 1}{x^2 - 3} = \frac{2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{3}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2.$

2. On cherche a, b, c tels que $\frac{x^2 + 1}{x - 1} = ax + b + \frac{c}{x - 1}$. En réduisant au même dénominateur :

$$ax + b + \frac{c}{x - 1} = \frac{(ax + b)(x - 1) + c}{x - 1} = \frac{ax^2 + (b - a)x + (c - b)}{x - 1}.$$

Par identification : $a = 1$; $b - a = 0 \Rightarrow b = 1$; $c - b = 1 \Rightarrow c = 2$. Donc $f(x) = x + 1 + \frac{2}{x - 1}$.

Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x - 1} = 0$, on a $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (x + 1)) = 0$: la droite d'équation $y = x + 1$ est asymptote oblique à C_f en $-\infty$ et en $+\infty$.

3. $\varphi(x) = x + \cos x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$: $\varphi'(x) = 1 - \sin x \geq 0$, et φ' ne s'annule qu'en des points isolés ($x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$). Donc φ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Continue, avec $\lim_{-\infty} \varphi = -\infty$ et $\lim_{+\infty} \varphi = +\infty$ (car $x - 1 \leq \varphi(x) \leq x + 1$), φ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Comme $1 \in \mathbb{R}$, l'équation $\varphi(x) = 1$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$. Branches infinies : $\frac{\varphi(x)}{x} = 1 + \frac{\cos x}{x} \rightarrow 1$ en $\pm\infty$ (car $\left| \frac{\cos x}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|}$). La courbe a donc la direction asymptotique de la droite $y = x$. Mais $\varphi(x) - x = \cos x$ n'a pas de limite en $\pm\infty$ (elle oscille entre -1 et 1) : il n'y a pas d'asymptote oblique.

CORRIGÉ Exercice 9 — Problème : étude d'une fonction rationnelle

Barème indicatif (sur 10 pts) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 1 pt ; Q5 : 1 pt ; Q6 : 1,5 pt ; Q7 : 1,5 pt ; Q8 : 1 pt.

1. h est définie si et seulement si $x + 2 \neq 0$: $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Limites : en $\pm\infty$, $h(x) \sim \frac{x^2}{x} = x$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} h = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} h = -\infty$. En -2 : le numérateur vaut $(-2)^2 + 3(-2) + 1 = -1 < 0$.
 $x \rightarrow -2^- : x + 2 \rightarrow 0^-$, donc $h(x) \rightarrow \frac{-1}{0^-} = +\infty$. $x \rightarrow -2^+ : x + 2 \rightarrow 0^+$, donc $h(x) \rightarrow -\infty$.
2. Pour $x \neq -2$, avec $u = x^2 + 3x + 1$ et $v = x + 2$:

$$h'(x) = \frac{(2x+3)(x+2) - (x^2+3x+1)}{(x+2)^2} = \frac{2x^2+7x+6 - x^2-3x-1}{(x+2)^2} = \frac{x^2+4x+5}{(x+2)^2}.$$

Le discriminant de $x^2 + 4x + 5$ est $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$: ce trinôme est strictement positif pour tout x . Comme $(x+2)^2 > 0$, on a $h'(x) > 0$ sur $]-\infty; -2[$ et sur $] -2; +\infty[$: h est strictement croissante sur chacun de ces intervalles.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$h'(x)$	+		+
h	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$

3. On procède par identification : $ax + b + \frac{c}{x+2} = \frac{ax^2 + (2a+b)x + (2b+c)}{x+2}$. $a = 1$; $2a + b = 3 \Rightarrow b = 1$; $2b + c = 1 \Rightarrow c = -1$. Donc :


$$h(x) = x + 1 - \frac{1}{x+2}.$$

4. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (h(x) - (x+1)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-1}{x+2} = 0$: la droite Δ d'équation $y = x + 1$ est asymptote oblique en $-\infty$ et $+\infty$. D'après la question 1, $\lim_{x \rightarrow -2^\pm} h(x) = \pm\infty$: la droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale.
5. $h(x) - (x+1) = -\frac{1}{x+2}$. Si $x > -2$: $x+2 > 0$, donc $h(x) - (x+1) < 0$: C_h est en dessous de Δ .
 Si $x < -2$: $h(x) - (x+1) > 0$: C_h est au-dessus de Δ .
6. $h(x) = 0 \iff x^2 + 3x + 1 = 0$ (et $x \neq -2$). $\Delta = 9 - 4 = 5 > 0$: deux solutions

$$\alpha_1 = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} \approx -2,62, \quad \alpha_2 = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} \approx -0,38.$$

Aucune ne vaut -2 : l'équation admet exactement deux solutions dans $\mathbb{R}$. (Cohérent avec le TVI : h est strictement monotone sur chaque intervalle et 0 appartient aux intervalles images.)

7. Tracé : asymptotes $x = -2$ et $y = x + 1$ en pointillés, deux branches croissantes passant par $(0; \frac{1}{2})$, α_1 et α_2 .

Courbe C_h et ses deux asymptotes

8. Sur $[0; +\infty[$, h est strictement croissante (question 2), donc le coût moyen est minimal pour la plus petite production, soit $x = 0$: $h(0) = \frac{1}{2}$, c'est-à-dire un coût moyen minimal de 0,5 millier de francs CFA, soit 500 FCFA par sac, atteint en début de production ($x = 0$ tonne). (Économiquement : dans ce modèle, toute augmentation de production au-delà de 0 augmente le coût moyen.)

Points de vigilance : citer la continuité et la stricte monotonie avant tout usage du TVI ; pour l'asymptote oblique, écrire explicitement $\lim (h(x) - (x + 1)) = 0$; ne pas oublier la double barre dans le tableau de variations en $x = -2$.

CORRIGÉ**Exercice 10 — Problème : fonction irrationnelle et bijection réciproque**

Barème indicatif (sur 10 pts) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1 pt ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 1 pt ; Q7 : 1 pt ; Q8 : 1 pt.

1. $D_\psi = \mathbb{R}$ (car $x^2 + 1 > 0$ pour tout x), ensemble symétrique par rapport à 0, et

$$\psi(-x) = \frac{-x}{\sqrt{(-x)^2 + 1}} = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = -\psi(x).$$

ψ est impaire : C_ψ est symétrique par rapport à l'origine O du repère.

2. Pour $x > 0$: $\psi(x) = \frac{x}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$. Par imparité : $\lim_{-\infty} \psi = -1$. Interprétation : les droites $y = 1$ (en $+\infty$) et $y = -1$ (en $-\infty$) sont asymptotes horizontales à C_ψ .

3. $\psi = \frac{u}{v}$ avec $u = x$, $v = \sqrt{x^2 + 1}$, $v' = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$:

$$\psi'(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{\frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}}.$$

$\psi'(x) > 0$ pour tout x : ψ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$\psi'(x)$	+	
ψ	-1	1

4. Pour tout réel x : $x^2 < x^2 + 1$, donc $|x| < \sqrt{x^2 + 1}$ (les deux membres sont positifs), d'où $|\psi(x)| = \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + 1}} < 1$.

5. ψ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{-\infty} \psi = -1$ et $\lim_{+\infty} \psi = 1$: elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]-1; 1[$. Soit $y \in]-1; 1[$: $y = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$. Alors y a le signe de x , et

$$y^2 = \frac{x^2}{x^2 + 1} \iff y^2(x^2 + 1) = x^2 \iff x^2(1 - y^2) = y^2 \iff x^2 = \frac{y^2}{1 - y^2}.$$


Comme x et y ont même signe : $x = \frac{y}{\sqrt{1 - y^2}}$. Donc :

$$\psi^{-1}(y) = \frac{y}{\sqrt{1 - y^2}}, \quad y \in]-1; 1[.$$

6. $\psi^{-1}(0) = 0$ (car $\psi(0) = 0$) et $\psi'(0) = \frac{1}{1^{3/2}} = 1 \neq 0$. Donc :

$$(\psi^{-1})'(0) = \frac{1}{\psi'(\psi^{-1}(0))} = \frac{1}{\psi'(0)} = 1.$$

7. On trace C_ψ (passant par O , tangente de pente 1 en O , asymptotes $y = \pm 1$) puis $C_{\psi^{-1}}$ par symétrie par rapport à $y = x$.



Courbes de ψ et de ψ^{-1} , symétriques par rapport à $y = x$

8. ψ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1; 1[$ et $\frac{1}{2} \in] -1; 1[$: l'équation $\psi(x) = \frac{1}{2}$ admet une unique solution

$$\beta = \psi^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1 - \frac{1}{4}}} = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{3}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Points de vigilance : pour la question 5, justifier le choix du signe devant la racine (x et y ont même signe) ; pour la question 6, vérifier que $\psi'(0) \neq 0$ avant d'appliquer la formule de la dérivée réciproque.

CORRIGÉ Exercice 11 — Problème : équation, suite et approximation

Barème indicatif (sur 10 pts) : Partie A : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 1 pt. Partie B : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1,5 pt.

Partie A

1. Voir l'exercice 5 : $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ sur $\mathbb{R}$, f strictement croissante, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$+\infty$

2. f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et $0 \in]-\infty; +\infty[$: par le TVI, $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in \mathbb{R}$. Comme $f(0) = -3 < 0$ et $f(2) = 9 > 0$, on a $\alpha \in]0; 2[$.
3. Dès la première étape de dichotomie, le milieu de $[0; 2]$ est 1 et $f(1) = 1 + 2 - 3 = 0$. Donc $\alpha = 1$ exactement. Un encadrement d'amplitude 10^{-2} : $1,00 \leq \alpha \leq 1,01$ (ou $\alpha = 1,00$ à 10^{-2} près).

Partie B

1. $F(\alpha) = \alpha \iff \frac{2\alpha^3 + 3}{3\alpha^2 + 2} = \alpha \iff 2\alpha^3 + 3 = 3\alpha^3 + 2\alpha \iff 0 = \alpha^3 + 2\alpha - 3 = f(\alpha)$. Or $f(\alpha) = 0$, donc $F(\alpha) = \alpha$: α est bien un point fixe de F . (Vérification numérique : $F(1) = \frac{2+3}{3+2} = 1$.)
2. On admet $F'(x) = \frac{6x(x^3 + 2x - 3)}{(3x^2 + 2)^2} = \frac{6xf(x)}{(3x^2 + 2)^2}$. Pour $x \in [0; 2]$: $x \geq 0$, et f étant croissante avec $f(1) = 0$, on a $f(x) \leq 0$ sur $[0; 1]$ et $f(x) \geq 0$ sur $[1; 2]$. D'après l'énoncé, on admet que $|F'(x)| \leq \frac{3}{4}$ sur $[0; 2]$.
3. F est dérivable sur $[0; 2]$ avec $|F'| \leq \frac{3}{4}$. Comme $v_0 = 0 \in [0; 2]$ et $F([0; 2]) \subset [0; 2]$ (car $F(0) = \frac{3}{2}$, $F(2) = \frac{19}{14} \approx 1,36$, et F à valeurs dans $[1; 1,5] \subset [0; 2]$), tous les v_n sont dans $[0; 2]$, de même que $\alpha = 1$. L'inégalité des accroissements finis entre v_n et α donne :

$$|v_{n+1} - \alpha| = |F(v_n) - F(\alpha)| \leq \frac{3}{4} |v_n - \alpha|.$$

$$\text{Par récurrence : } |v_n - \alpha| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n |v_0 - \alpha| = \left(\frac{3}{4}\right)^n \times 1 = \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

4. Comme $0 < \frac{3}{4} < 1$, $\left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$, donc par le théorème des gendarmes $|v_n - \alpha| \rightarrow 0$: (v_n) converge vers $\alpha = 1$. Pour que $|v_n - \alpha| \leq 10^{-4}$, il suffit que $\left(\frac{3}{4}\right)^n \leq 10^{-4}$, c'est-à-dire $n \ln \frac{3}{4} \leq -4 \ln 10$, soit $n \geq \frac{4 \ln 10}{\ln(4/3)} = \frac{4 \times 2,3026}{0,2877} \approx 32,0$. On prend donc $n = 33$ (au-delà de 32,01) : v_{33} est une valeur approchée de α à 10^{-4} près.

Points de vigilance : dans la question B.3, il faut d'abord vérifier que tous les termes restent dans $[0; 2]$ (stabilité de l'intervalle) avant d'appliquer l'inégalité des accroissements finis ; la récurrence doit être rédigée proprement (initialisation $|v_0 - \alpha| = 1 \leq 1$, hérédité).

14 FICHE BILAN

15 IMAGE D'UN INTERVALLE PAR UNE FONCTION CONTINUE ET THÉORÈME DES VALEURS INTERMÉDIAIRES

DÉFINITION Image d'un ensemble

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $A \subset D$. L'**image de A par f** est l'ensemble

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}.$$

Si I est un intervalle, $f(I)$ est l'ensemble des valeurs prises par f sur I .

PROPRIÉTÉ Image d'un intervalle par une fonction continue

Si f est **continue** sur un intervalle I , alors $f(I)$ est un intervalle.

- Si $I = [a; b]$ est un segment (intervalle fermé et borné), alors $f(I) = [m; M]$ où $m = \min_{[a;b]} f$ et $M = \max_{[a;b]} f$ (existence garantie par le théorème des bornes).
- Si I est ouvert, semi-ouvert ou non borné, $f(I)$ est un intervalle de même nature (ouvert, semi-ouvert, non borné) que I relativement aux bornes atteintes ou non.

EXEMPLE Image d'un intervalle

Soit $f(x) = x^2 - 2x$ sur $I = [-1; 3]$. f est continue sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = 2x - 2$, s'annule en $x = 1$. $f(-1) = 3$, $f(1) = -1$, $f(3) = 3$. $f([-1; 3]) = [-1; 3]$. Sur $J =]0; +\infty[$, $f(J) = [-1; +\infty[$.

PROPRIÉTÉ Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) – Existence

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle I . Soient $a, b \in I$ avec $a < b$ et $c \in \mathbb{R}$ un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ (i.e. $f(a) \leq c \leq f(b)$ ou $f(b) \leq c \leq f(a)$). Alors il existe au moins un $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = c$.

PROPRIÉTÉ Théorème des valeurs intermédiaires – Unicité

Si, de plus, f est **strictement monotone** sur I (strictement croissante ou strictement décroissante), alors le α tel que $f(\alpha) = c$ est unique sur I .

ATTENTION Hypothèses du TVI : pièges à éviter

- Continuité sur tout l'intervalle $[a; b]$: une discontinuité (asymptote verticale, trou) invalide le théorème. Exemple : $f(x) = 1/x$ sur $[-1; 1]$, $f(-1) = -1$, $f(1) = 1$, 0 est entre les deux mais pas de solution à $1/x = 0$.
- c entre $f(a)$ et $f(b)$: si c est en dehors, le TVI ne dit rien (il peut y avoir une solution ou pas).
- Unicité : nécessite la stricte monotonie. Si f est constante par morceaux, il y a une infinité de solutions.

MÉTHODE Prouver qu'une équation $f(x) = c$ admet une unique solution sur un intervalle

1. Vérifier que f est continue sur l'intervalle I considéré.
2. Étudier la monotonie de f sur I (signe de f') pour prouver qu'elle est strictement monotone.
3. Calculer $f(a)$ et $f(b)$ (bornes de I ou limites aux bornes si I non fermé) et vérifier que $c \in [f(a); f(b)]$ (ou $]f(a); f(b)[$ selon la nature de I).
4. Conclure par le TVI : existence (continuité + c entre les bornes) et unicité (stricte monotonie).
5. (Optionnel) Encadrer la solution α par balayage (tableau de valeurs) ou dichotomie à la précision demandée (souvent 10^{-2} ou 10^{-3} au Bac).

EXERCICE RÉSOLU 22 Application du TVI : équation $x^3 + x - 1 = 0$

Énoncé : Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$. Encadrer α à 10^{-2} près.

SOLUTION

Solution : Posons $f(x) = x^3 + x - 1$ sur $[0; 1]$.

1. f est continue sur $[0; 1]$ (fonction polynôme).

2. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc f est strictement croissante sur $[0; 1]$.
3. $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$. Le réel 0 est bien entre $f(0)$ et $f(1)$.
4. Par le TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in [0; 1]$.
5. Encadrement à 10^{-2} près (balayage) :

x	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
f(x)	-1	-0,899	-0,792	-0,673	-0,536	-0,375	-0,184	0,043	0,312	0,629	1

$f(0,6) < 0$ et $f(0,7) > 0$, donc $\alpha \in [0,6; 0,7]$. Affinage : $f(0,68) \approx -0,024$, $f(0,69) \approx 0,009$. Donc $\alpha \in [0,68; 0,69]$.

16 FONCTION RÉCIPROQUE D'UNE BIJECTION

DÉFINITION Bijection et fonction réciproque

Une fonction $f : I \rightarrow J$ est une **bijection** si tout élément $y \in J$ admet un unique antécédent $x \in I$ tel que $f(x) = y$. La **fonction réciproque** $f^{-1} : J \rightarrow I$ est définie par : $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$. Elle vérifie : $f^{-1}(f(x)) = x$ pour tout $x \in I$ et $f(f^{-1}(y)) = y$ pour tout $y \in J$.

PROPRIÉTÉ Critère de bijection pour une fonction continue

Soit f continue sur un intervalle I . Si f est strictement monotone sur I , alors f réalise une bijection de I sur $f(I)$.

PROPRIÉTÉ Continuité et dérivabilité de la réciproque

Si $f : I \rightarrow J$ est une bijection, continue sur I et strictement monotone, alors :

1. f^{-1} est continue sur J .
2. Si f est dérivable sur I et $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$, alors f^{-1} est dérivable sur J et pour tout $y \in J$:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

(Démonstration exigible au Bac : dériver $f(f^{-1}(y)) = y$ par rapport à y).

PROPRIÉTÉ Symétrie des courbes

La courbe représentative $C_{f^{-1}}$ de la fonction réciproque est la symétrique de la courbe C_f par rapport à la droite d'équation $y = x$ (première bissectrice).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : dérivée de la réciproque

Soit f bijection de I sur J , dérivable, $f' \neq 0$. Soit $y_0 \in J$, $x_0 = f^{-1}(y_0)$.

1. Écrire la relation $f(f^{-1}(y)) = y$.
2. Dériver par rapport à y en utilisant la formule de dérivation des fonctions composées.
3. Isoler $(f^{-1})'(y_0)$.
4. Conclure.

MÉTHODE Étudier une fonction réciproque et tracer sa courbe

1. Prouver que f est une bijection de I sur J (continuité + stricte monotonie + $J = f(I)$).
2. Déterminer l'expression de f^{-1} si possible (résoudre $y = f(x)$ pour x), sinon travailler avec la définition.
3. Calculer $(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y))$ et en déduire les variations de f^{-1} .
4. Tracer C_f , puis tracer la droite $y = x$, et construire des points symétriques (au moins 3-4 points caractéristiques : intersections avec axes, extremums, points d'inflexion) pour obtenir $C_{f^{-1}}$.

EXERCICE RÉSOLU 23 Réciproque de $f(x) = 2x^3 + 3$ sur $\mathbb{R}$

Énoncé : Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer f^{-1} , son ensemble de définition, sa dérivée et tracer les deux courbes.

SOLUTION

Solution :

1. f continue sur $\mathbb{R}$ (polynôme). $f'(x) = 6x^2 \geq 0$ et $f'(x) = 0 \iff x = 0$. f' ne change pas de signe (positif sur $\mathbb{R}^*$), f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. f est bijection $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

3. Résolution : $y = 2x^3 + 3 \iff x^3 = \frac{y-3}{2} \iff x = \sqrt[3]{\frac{y-3}{2}}$. Donc $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{\frac{y-3}{2}}$, $D_{f^{-1}} = \mathbb{R}$.
4. Dérivée : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{6\left(\sqrt[3]{\frac{y-3}{2}}\right)^2} = \frac{1}{6} \left(\frac{2}{y-3}\right)^{2/3}$ pour $y \neq 3$. En $y = 3$, $f^{-1}(3) = 0$, $f'(0) = 0$, la dérivée n'existe pas (tangente verticale).
5. Variations : $(f^{-1})'(y) > 0$ pour $y \neq 3$, f^{-1} strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
6. Tracé : C_f passe par $(0,3)$, tangente horizontale en $(0,3)$. $C_{f^{-1}}$ passe par $(3,0)$, tangente verticale en $(3,0)$. Symétrie par rapport à $y = x$.

ATTENTION Pièges classiques sur la réciproque

- Confondre $f^{-1}(x)$ (réciproque) et $\frac{1}{f(x)}$ (inverse). Jamais écrire $f^{-1}(x) = 1/f(x)$.
- Oublier d'échanger ensemble de définition et ensemble d'arrivée : $D_{f^{-1}} = f(D_f)$.
- Appliquer la formule de la dérivée sans vérifier $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.
- Tracer la symétrie par rapport à $y = x$ sans respecter l'échelle (repère non orthonormé ou échelles différentes sur axes) : la symétrie n'est visuelle que si les échelles sont identiques.

17 RACINES N-IÈMES ET PUISSANCES RATIONNELLES

DÉFINITION Racine n -ième d'un réel positif

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{R}_+^*$. La **racine n -ième de a** , notée $\sqrt[n]{a}$ ou $a^{1/n}$, est l'unique réel strictement positif x tel que $x^n = a$. Par convention $\sqrt[n]{0} = 0$.

PROPRIÉTÉ Résolution de $x^n = a$ dans $\mathbb{R}$

- Si n est pair :
 - $a < 0$: aucune solution dans $\mathbb{R}$.
 - $a = 0$: solution unique $x = 0$.
 - $a > 0$: deux solutions $x = \sqrt[n]{a}$ et $x = -\sqrt[n]{a}$ (souvent notées $x = \pm \sqrt[n]{a}$).

- Si n est impair :
 - Pour tout $a \in \mathbb{R}$, une unique solution $x = \sqrt[n]{a}$ (le signe de x est celui de a).

DÉFINITION Puissance rationnelle

Pour $a > 0$ et $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ ($q > 0$), on définit

$$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p} = (\sqrt[q]{a})^p.$$

Pour $a = 0$, $0^r = 0$ si $r > 0$ (indéfini si $r \leq 0$). Pour $a < 0$, $a^{p/q}$ n'est défini dans $\mathbb{R}$ que si q est impair (alors $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$).

PROPRIÉTÉ Propriétés des puissances rationnelles

Pour $a, b > 0$ (ou $a, b \in \mathbb{R}$ si les expressions ont un sens) et $r, s \in \mathbb{Q}$:

$$a^r a^s = a^{r+s}, \quad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}, \quad (a^r)^s = a^{rs}, \quad (ab)^r = a^r b^r, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}.$$

MÉTHODE Simplifier une expression à puissances rationnelles

1. Écrire tous les radicaux sous forme de puissances ($\sqrt[q]{a^p} = a^{p/q}$).
2. Mettre au même dénominateur les exposants si nécessaire.
3. Appliquer les règles de calcul sur les puissances.
4. Revenir éventuellement à la notation radicale si l'énoncé le demande.
5. Vérifier le domaine de définition (base positive ou exposant à dénominateur impair).

EXEMPLE Simplification

Simplifier $E = \frac{\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x}}{x^{1/6}}$ pour $x > 0$. $E = \frac{x^{2/3} \cdot x^{1/2}}{x^{1/6}} = x^{2/3+1/2-1/6} = x^{4/6+3/6-1/6} = x^{6/6} = x$.

ATTENTION Erreurs fréquentes sur les puissances

- $\sqrt{a^2} = |a|$ et non a (sauf si $a \geq 0$ connu).
- $\sqrt[n]{a^n} = a$ si n impair, $= |a|$ si n pair.
- $(a^r)^s = a^{rs}$ n'est pas toujours vrai si $a < 0$ et dénominateurs pairs (ex : $((-1)^2)^{1/2} = 1 \neq -1 = (-1)^{2 \times 1/2}$). Toujours ramener à une base positive ou vérifier la parité des dénominateurs.

18 INÉGALITÉ DES ACCROISSEMENTS FINIS**PROPRIÉTÉ Inégalité des accroissements finis**

Soit f une fonction **continue** sur $[a; b]$ et **dérivable** sur $]a; b[$. Si il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in]a; b[$:

$$m \leq f'(x) \leq M,$$

alors

$$m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a).$$

EXPÉRIENCE Démonstration (Théorème des accroissements finis / MVT)

D'après le théorème des accroissements finis (Théorème de Lagrange), il existe $c \in]a; b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$. Comme $m \leq f'(c) \leq M$ et $b-a > 0$, on multiplie par $b-a$: $m(b-a) \leq f'(c)(b-a) \leq M(b-a)$, d'où le résultat.

MÉTHODE Encadrer $f(b) - f(a)$ à l'aide de l'inégalité des accroissements finis

1. Vérifier les hypothèses : f continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$.
2. Déterminer $f'(x)$.
3. Trouver des bornes m et M (min et max si possible, ou majorations/minorations simples) de f' sur $]a; b[$.
4. Appliquer la formule : $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$.

EXERCICE RÉSOLU 24 Encadrement de $\ln(1+x)$

Énoncé : Montrer que pour tout $x > 0$, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

SOLUTION

Solution : Posons $f(t) = \ln(1+t)$ sur $[0; x]$ ($x > 0$ fixé). f est continue sur $[0; x]$, dérivable sur $]0; x[$, $f'(t) = \frac{1}{1+t}$. Pour $t \in]0; x[$, $1 < 1+t < 1+x \implies \frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+t} < 1$. Donc $m = \frac{1}{1+x}$, $M = 1$. Inégalité : $\frac{1}{1+x}(x-0) < \ln(1+x) - \ln(1) < 1 \cdot (x-0)$. Soit $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$. $\square$

EXERCICE RÉSOLU 25 Encadrement de $\sin b - \sin a$

Énoncé : Montrer que $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ pour tous réels a, b .

SOLUTION

Solution : $f(x) = \sin x$ continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, $f'(x) = \cos x$, $|\cos x| \leq 1$. Si $a < b$, $-1 \leq f'(x) \leq 1$. Inégalité : $-1(b-a) \leq \sin b - \sin a \leq 1(b-a)$. Donc $|\sin b - \sin a| \leq b-a = |b-a|$. Si $b < a$, symétrie. Si $a = b$, égalité.

19 LIMITES USUELLES ET BRANCHES INFINIES**PROPRIÉTÉ** Limites usuelles à connaître par cœur

Forme	Limite (quand $x \rightarrow 0$)
$\frac{\sin x}{x}$	1
$\frac{\tan x}{x}$	1
$\frac{1 - \cos x}{x^2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\ln(1+x)}{x}$	1
$\frac{e^x - 1}{x}$	1
$\frac{a^x - 1}{x}$ ($a > 0$)	$\ln a$

Remarque : Ces limites valent aussi pour $x \rightarrow 0^\pm$ et s'utilisent en changement de variable

$(u \rightarrow 0)$.

DÉFINITION Branches infinies et asymptotes

Soit f définie au voisinage de l'infini ou d'une valeur interdite.

- **Asymptote verticale** : $x = x_0$ si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$.
- **Asymptote horizontale** : $y = \ell$ si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.
- **Asymptote oblique** : $y = ax + b$ ($a \neq 0$) si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$.
- **Direction asymptotique** : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$ mais $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = \pm\infty$, la courbe a une direction asymptotique de pente a (parallèle à $y = ax$).
- **Branche parabolique** : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$, on étudie $\frac{f(x)}{x^2}$ etc.

MÉTHODE Recherche systématique des asymptotes en $+\infty$ (idem $-\infty$)

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.
 - Si $\ell \in \mathbb{R}$: asymptote horizontale $y = \ell$. Stop.
 - Si $\ell = \pm\infty$: passer à l'étape 2.
2. Calculer $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.
 - Si $a = 0$: pas d'asymptote oblique, direction horizontale (déjà traité) ou courbe "verticale" à l'infini.
 - Si $a = \pm\infty$: direction asymptotique de pente infinie (branche parabolique ou supérieure). Stop.
 - Si $a \in \mathbb{R}^*$: passer à l'étape 3.
3. Calculer $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$.
 - Si $b \in \mathbb{R}$: asymptote oblique $y = ax + b$.
 - Si $b = \pm\infty$: direction asymptotique de pente a (pas d'asymptote oblique).

EXEMPLE Asymptotes de $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. $x \rightarrow 1^+ : f(x) \rightarrow \pm\infty \Rightarrow$ Asymptote verticale $x = 1$. $x \rightarrow \pm\infty : f(x) \sim x \rightarrow \pm\infty$.
 $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2+1}{x(x-1)} = 1$. $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2+1-x(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+1}{x-1} = 1$. Asymptote oblique

$y = x + 1$ (commune aux deux infinis).

EXEMPLE Direction asymptotique : $f(x) = \sqrt{x^2 + x}$

$D_f =] -\infty; -1] \cup [0; +\infty[$. $x \rightarrow +\infty : f(x) \sim x$. $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1+1/x} = 1$. $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+x} + x} = \frac{1}{2}$. Asymptote oblique $y = x + 1/2$ en $+\infty$. $x \rightarrow -\infty : f(x) = |x|\sqrt{1+1/x} = -x\sqrt{1+1/x}$ (car $x < 0$). $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{1+1/x} = -1$. $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x\sqrt{1+1/x} + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2(1+1/x)+x^2}{-x\sqrt{1+1/x}-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{-x(\sqrt{1+1/x}+1)} = \frac{1}{2}$. Asymptote oblique $y = -x + 1/2$ en $-\infty$.

ATTENTION Pièges sur les asymptotes

- Oublier d'étudier $-\infty$ et $+\infty$ séparément (asymptotes différentes possibles).
- Calculer $b = \lim(f(x) - ax)$ sans avoir vérifié que a est fini et non nul.
- Pour les fonctions irrationnelles ($\sqrt{\dots}$), attention au signe de x quand on factorise : $\sqrt{x^2} = |x|$.
- Confondre "direction asymptotique" et "asymptote oblique". Si b est infini, il n'y a pas d'asymptote oblique, seulement une direction.

20 ÉTUDE COMPLÈTE DE FONCTIONS ET TRACÉ DE COURBES

MÉTHODE Les 9 étapes de l'étude complète (la "Grande Étude")

1. Ensemble de définition D_f : Zéros de dénominateurs, radicaux d'indice pair (≥ 0), log (> 0), etc.
2. Parité / Périodicité : Pair ($f(-x) = f(x)$), Impair ($f(-x) = -f(x)$), Période T ($f(x+T) = f(x)$). Permet de réduire l'étude.
3. Limites aux bornes de D_f : Bornes finies (valeurs interdites $\rightarrow$ asymptotes verticales) et $\pm\infty$ (asymptotes H/O, directions).
4. Dérivée $f'(x)$: Calculer et simplifier (factoriser!). Déterminer $D_{f'}$ (souvent $= D_f$).

5. Signe de $f'(x)$: Tableau de signes $\rightarrow$ variations de f .
6. Tableau de variations : Avec les limites aux bornes, les valeurs remarquables ($f(0)$, extremums, zéros).
7. Asymptotes et positions relatives : Équations des asymptotes. Position de la courbe par rapport à son asymptote oblique (signe de $f(x) - (ax + b)$).
8. Points particuliers : Intersections avec les axes ($f(x) = 0$, $f(0)$), points d'inflexion (f''), tangentes remarquables.
9. Tracé de la courbe C_f : Repère orthonormé, même échelle, points précis, asymptotes en pointillés, flèches aux branches infinies.

EXERCICE RÉSOLU 26 Étude complète : Fonction rationnelle $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1}$ (un piège classique)

Énoncé : Étudier f et tracer C_f .

SOLUTION

Solution :

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
2. Réflexe : factoriser le numérateur avant tout calcul. -1 est racine de $x^2 - 2x - 3$ (car $1 + 2 - 3 = 0$), donc $x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$ et, pour tout $x \neq -1$:

$$f(x) = \frac{(x + 1)(x - 3)}{x + 1} = x - 3.$$

3. Limites : $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x - 3) = -4$: la limite en -1 est finie, il n'y a pas d'asymptote verticale. En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$.
4. Dérivée et variations : $f'(x) = 1 > 0$ sur $] -\infty; -1[$ et sur $] -1; +\infty[$: f est strictement croissante sur chacun de ces intervalles.
5. Tableau :

x	$-\infty$	-1	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$
$f(x)$	$-\infty \nearrow$	-4	$-4 \nearrow$	$+\infty$

(-4 est une limite, pas une valeur : $f(-1)$ n'existe pas.)

6. Tracé : C_f est la droite d'équation $y = x - 3$ privée du point $A(-1; -4)$, que l'on représente par un petit cercle vide. Pas d'asymptote : la droite $y = x - 3$ est la courbe.

Moralité : si le numérateur et le dénominateur ont une racine commune, simplifier d'abord ; sinon on « trouve » à tort une asymptote verticale.

EXERCICE RÉSOLU 27 Étude complète : Fonction irrationnelle $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$ Énoncé : Étudier f sur son ensemble de définition.**SOLUTION**

Solution :

1. $D_f : 4 - x^2 \geq 0 \iff x \in [-2; 2]$.
2. $f(-x) = -x\sqrt{4-x^2} = -f(x)$: fonction impaire. Étudier sur $[0; 2]$, déduire sur $[-2; 0]$ par symétrie centrale O .
3. Limites : $x \rightarrow 2^-$, $f(x) \rightarrow 0$. $x \rightarrow -2^+$, $f(x) \rightarrow 0$. Pas d'asymptote verticale (domaine borné). Pas d'infini.
4. Dérivée sur $]0; 2[$: $f'(x) = \sqrt{4-x^2} + x \frac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}} = \frac{4-x^2-x^2}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{4-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{2(2-x^2)}{\sqrt{4-x^2}}$.
5. Signe de f' : Dénominateur > 0 . Numérateur $2(2-x^2) \geq 0 \iff x^2 \leq 2 \iff x \in [0; \sqrt{2}]$.
 $f' \geq 0$ sur $[0; \sqrt{2}]$, $f' \leq 0$ sur $[\sqrt{2}; 2]$.
6. Variations sur $[0; 2]$: Croissante sur $[0; \sqrt{2}]$, décroissante sur $[\sqrt{2}; 2]$. Max en $x = \sqrt{2}$:
 $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}\sqrt{2} = 2$. $f(0) = 0$, $f(2) = 0$.
7. Tableau complet (parité) :

x	-2	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	2	
$f'(x)$	-	0	+	+	0	-
$f(x)$	0 ↘	-2 ↗	0 ↗	2 ↘	0	

8. Tangentes aux bornes : quand $x \rightarrow 2^-$, le numérateur $4 - 2x^2 \rightarrow -4$ et le dénominateur $\sqrt{4-x^2} \rightarrow 0^+$, donc $f'(x) \rightarrow -\infty$: tangente verticale en $A(2; 0)$ et, par imparité, en $A'(-2; 0)$.
9. Tracé : Courbe symétrique par rapport à O , passant par $(-2; 0)$, $(-\sqrt{2}; -2)$, $(0; 0)$, $(\sqrt{2}; 2)$ et $(2; 0)$. Tangentes verticales aux extrémités.

EXERCICE RÉSOLU 28 Étude complète : Fonction trigonométrique $f(x) = \sin x + \cos x$ sur $[0; 2\pi]$ Énoncé : Étudier f et tracer C_f .**SOLUTION**

Solution :

1. $D_f = [0; 2\pi]$.

2. $f(x) = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$ (transformation de $\cos x + \sin x$ en une seule sinusoïde). Période 2π . On étudie sur une période.
3. Limites : Bornes finies : $f(0) = 1, f(2\pi) = 1$.
4. Dérivée : $f'(x) = \cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$.
5. Signe de f' sur $[0; 2\pi]$: $\cos(x + \pi/4) \geq 0 \iff x + \pi/4 \in [-\pi/2; \pi/2] + 2k\pi \iff x \in [-3\pi/4; \pi/4] + 2k\pi$. Sur $[0; 2\pi]$ (avec $-3\pi/4 + 2\pi = 5\pi/4$) : $f' \geq 0$ sur $[0; \pi/4] \cup [5\pi/4; 2\pi]$, $f' \leq 0$ sur $[\pi/4; 5\pi/4]$.
6. Variations : Croissante $[0; \pi/4]$, Max $f(\pi/4) = \sqrt{2}$. Décroissante $[\pi/4; 5\pi/4]$, Min $f(5\pi/4) = -\sqrt{2}$. Croissante $[5\pi/4; 2\pi]$.
7. Zéros : $\sin x + \cos x = 0 \iff \tan x = -1 \iff x = 3\pi/4, 7\pi/4$.
8. Tableau :

x	0	$\pi/4$	$3\pi/4$	$5\pi/4$	$7\pi/4$	2π					
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+					
$f(x)$	1	$\nearrow$	$\sqrt{2}$	$\searrow$	0	$\searrow$	$-\sqrt{2}$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	1

9. Tracé : Onde sinusoïdale d'amplitude $\sqrt{2}$, décalée de $-\pi/4$.

À RETENIR

Checklist finale pour le Bac : Étude de fonctions

- ☐ TVI : Énoncer les 3 hypothèses (continuité, intervalle, c entre images). Conclure "Existence". Ajouter "stricte monotonie" pour "Unicité".
- ☐ Encadrement α : Balayage (tableau de valeurs) ou dichotomie. Précision 10^{-2} : donner l'intervalle $[a; b]$ tel que $b - a = 0,01$ et $f(a)f(b) < 0$.
- ☐ Bijection / Réciproque : Prouver bijection (continuité + stricte mono + ensemble d'arrivée = image). Déterminer $D_{f^{-1}} = f(D_f)$. Formule dérivée $(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y))$. Tracé par symétrie $y = x$ (échelles identiques!).
- ☐ Racines / Puissances : Résoudre $x^n = a$ (discussion parité de n). Simplifier $a^{p/q}$ (base > 0 ou q impair). $\sqrt{a^2} = |a|$.
- ☐ Accroissements finis : Hypothèses (CV sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$). Borner f' . Appliquer $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$.
- ☐ Limites usuelles : $\sin x/x, \tan x/x, (1 - \cos x)/x^2, (\sqrt{1+x} - 1)/x, \ln(1+x)/x, (e^x - 1)/x$. Changer de variable pour faire apparaître $u \rightarrow 0$.
- ☐ Asymptotes : Algorithme rigoureux (1. Limite finie $\rightarrow H$; 2. Limite $f/x = a$ fini non nul; 3. Limite $f - ax = b$ fini $\rightarrow O$, infini $\rightarrow$ Direction). Traiter $+\infty$ et $-\infty$ séparément. Factoriser $\sqrt{x^2} = |x|$.

- ☐ Grande Étude : Ordre immuable : $D_f \rightarrow$ Parité $\rightarrow$ Limites $\rightarrow f' \rightarrow$ Signe $f' \rightarrow$ TV $\rightarrow$ Asymptotes/Position $\rightarrow$ Points remarquables $\rightarrow$ Tracé.
- ☐ Rédaction : Phrases complètes. "Donc", "Par conséquent". Tableau de variations au format standard (flèches, valeurs, doubles barres pour interdits). Courbe soignée (règle, équerre, pointillés asymptotes).

LESAVAIS-TU ? Le TVI et la dichotomie : l'algorithme de base de l'informatique

Le théorème des valeurs intermédiaires est la justification mathématique de la méthode de dichotomie (ou recherche binaire), algorithme fondamental en informatique pour trouver un zéro de fonction ou trier/chercher dans un tableau ordonné.

1. On a un intervalle $[a, b]$ où $f(a)f(b) < 0$ (signe contraire).
2. On calcule le milieu $m = (a + b)/2$.
3. Si $f(m) = 0$, c'est gagné. Sinon, on regarde le signe de $f(m)$.
4. Si $f(a)f(m) < 0$, la solution est dans $[a, m]$, sinon dans $[m, b]$.
5. On recommence jusqu'à la précision voulue.

À chaque étape, l'intervalle est divisé par 2. Pour une précision 10^{-n} , il faut environ $n \times \log_2(10) \approx 3,3n$ itérations. C'est l'efficacité algorithmique $O(\log n)$. Au Cameroun, cette méthode est utilisée dans les logiciels de calcul scientifique (Scilab, Python `scipy.optimize.bisect`) pour résoudre des équations issues de la modélisation (écoulement dans les barrages, dimensionnement de poutres, traitement de signaux MTN/Orange).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+